

Die sprechenden papageien

Karl Russ

Digitized by Google



BIOLOGY LIBRARY

Digitized by Google

Die sprechenden Papageien.

Digitized by Google

Digitized by Google

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß.

Berlin, 1882.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung
(Gustav Goßmann).

Digitized by Google

QL696
P7R8
BIOLOGY
LIBRARY
G

UNIV. OF
CALIFORNIA

Uebersetzungsrecht vorbehalten.

BIOLOGY

Digitized by Google

Inhalt.

Seite

Vorwort XI

Allgemeines 1

Einkauf und Empfang 16

Die Wohnungen 28

Ernährung 39

Zähmung und Abrichtung 49

Gesundheitspflege 66

Krankheiten 75

Uebersicht der Arzneimittel nebst Angaben der Mischungsverhältnisse und Gaben 98

Die sprechenden Papageien 101

Das Geschlecht Eigentlicher Papagei [Psittacus, *L.*] 102

Der rothschwänzige graue Papagei [Psittacus erithacus, *L.*] . 103

Der braunschwänzige graue Papagei [Psittacus timneh, *Frs.*] . . . 120

Der große schwarze Papagei [Psittacus vaza, *Shw.*] . . . 121

Der kleine schwarze Papagei [Psittacus niger, *L.*] 125

Der rußbraune Papagei [Psittacus Barklyi, *Nwt.*] 125

Der schwarze Papagei von den Komoren [Psittacus comorensis, *Ptrs.*] . 125

Das Geschlecht Amazonenpapagei [Chrysótis, *Swns.*] 127

Der Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug [Psittacus aestivus, *Lth.*] 132

Der Amazonenpapagei mit grünem Flügelbug [Psittacus amazonicus, *L.*] 134

Der große gelbköpfige Amazonenpapagei [Psittacus Levaillanti, *Gr.*] 135

Der gelbscheitelige Amazonenpapagei [Psittacus ochrocéphalus, *Gml.*] 137

Der Panama-Amazonenpapagei [Psittacus panamensis, *Cb.*] 139

Hagenbeck's Amazonenpapagei [Psittacus Hagenbecki, *Rss.*] . . . 140

Der gelbschulterige Amazonenpapagei [Psittacus ochrópterus, *Gml.*] 141

Der bepuderte Amazonenpapagei [Psittacus farinosus, *Bdd.*] 143

957955

Digitized by Google

Seite
Der gelbnackige Amazonenpapagei [Psittacus auripalliatus, *Lss.*] 144
Natterer's Amazonenpapagei [Psittacus Nattereri, *Fnsch.*] . 145
Der Guatemala-Amazonenpapagei [Psittacus guatemalensis, (*Hrtl.*)] 146
Der Amazonenpapagei mit gelbem Daumenrand [Psittacus mercenarius, *Tschd.*] 147
Der graunackige Amazonenpapagei [Psittacus canipalliatus, *Cb.*] . . 148
Bouquet's Amazonenpapagei [Psittacus Bouqueti, *Bchst.*] 148
Der blaumaskirte Amazonenpapagei [Psittacus cyanops, *Vll.*] . . . 149
Der braunschwänzige Amazonenpapagei [Psittacus augustus, *Vgrs.*] . 150
Guilding's Amazonenpapagei [Psittacus Guildingi, *Vgrs.*] 150
Der gelbbäuchige Amazonenpapagei [Psittacus xanthops, *Spx.*] . . . 151
Der blaukehlige Amazonenpapagei [Psittacus festivus, *L.*] . 152
Bodinus' Amazonenpapagei [Psittacus Bodini, *Fnsch.*] 153
Sallé's Amazonenpapagei [Psittacus Salléi, *Scl.*] 154
Der rothstirnige Amazonenpapagei [Psittacus vittatus, *Bdd.*] 155
Der weißköpfige Amazonenpapagei mit rothem Bauchfleck [Psittacus leucocéphalus, *L.*] 156
Der weißköpfige Amazonenpapagei ohne rothen Bauchfleck [Psittacus collarius, *L.*] 158
Der weißstirnige Amazonenpapagei [Psittacus albifrons, *Sprrm.*] 159
Der weißstirnige Amazonenpapagei mit gelbem Zügel- und Kopfstreif [Psittacus xantholórus, *Gr.*] 161
Prêtre's Amazonenpapagei [Psittacus Prêtrei, *Tmm.*] 162
Der Amazonenpapagei mit rothen Flügeldecken [Psittacus ágilis, *L.*] . 162
Der rothmaskirte Amazonenpapagei [Psittacus brasiliensis, *L.*] 163
Der rothschwänzige Amazonenpapagei [Psittacus erythrúrus, *Khl.*] 165
Der weinrothe Amazonenpapagei [Psittacus vináceus, *Pr. Wd.*] 166
Der scharlachstirnige Amazonenpapagei [Psittacus coccinifrons, *Snc.*] 167
Finsch' Amazonenpapagei [Psittacus Finschi, *Scl.*] 168
Der gelbwangige Amazonenpapagei [Psittacus autumnalis, *L.*] 169
Der Diadem-Amazonenpapagei [Psittacus diadematus, *Shw.*] . 170
Dufresne's Amazonenpapagei [Psittacus Dufresnei, *(Lvll.) Khl.*] 171
Der blauwangige Amazonenpapagei [Psittacus coeligenus, *Lwrnc.*] . . 172
Das Geschlecht Langflügelpapagei [Pionias, *Wgl.*] 173
Der orangebäuchige Langflügelpapagei [Psittacus senegalus, *L.*] 175

Digitized by Google

Seite

Der blauköpfige Langflügelpapagei [Psittacus menstruus, *L.*] 177
Der Kragen-Langflügelpapagei [Psittacus accipitrinus, *L.*] . 179
Das Geſchlecht Edelpapagei [Eclectus, *Wgl.*] 181
Der Neuguinea-Edelpapagei [Psittacus Linnéi, *Rss.*] . . . 184
Der Halmahera-Edelpapagei [Psittacus grandis, *Rss.*] . . . 186
Der Ceram-Edelpapagei [Psittacus intermedius, *Rss.*] . . . 187
Westerman's Edelpapagei [Psittacus Westermani, *Rss.*] 188
Der ſchwarzſchulterige Edelpapagei [Psittacus megalorrhynchus, *Bdd.*] 189
Der grünſchulterige Edelpapagei [Psittacus affinis, *Wllc.*] 190
Der blauſcheitelige Edelpapagei [Psittacus luçonensis, *L.*]! 190
Müller's Edelpapagei [Psittacus Mülleri, *Tmm.*] 191
Der Zwerg-Edelpapagei [Psittacus incertus, *Shw.*] 193
Die Kakadus 196
Das Geſchlecht eigentlicher Kakadu [Plectólophus, *Vgrs.*] 202
Der kleine hellgelb gehäubte Kakadu [Psittacus sulfúreus, *Gml.*] 203
Buffon's gelbgehäubter Kakadu [Psittacus Buffoni, *Fnsch.*] 205
Der kleine dunkelgelb gehäubte Kakadu [Psittacus citrino-cristatus, *Frs.*] 205
Der große gelbgehäubte Kakadu [Psittacus galeritus, *Lth.*] . 206
Der Triton-Kakadu [Psittacus Triton, *Tmm.*] 207
Der große weißgehäubte Kakadu [Psittacus leucólophus, *Lss.*] 208
Der große weiße Kakadu mit gelber hängender Haube [Psittacus ophthalmicus, *Scl.*] 209
Der rothgehäubte Kakadu [Psittacus moluccensis, *Gml.*] . . 210
Der Inka-Kakadu [Psittacus Leadbeateri, *Vgrs.*] 212
Der Kakadu mit roſenrothem Stirn- und Zügelſtreif [Psittacus sanguineus, *Gld.*] 215
Goffin's Kakadu [Psittacus Goffini, *Fnsch.*] 216
Der Philippinen-Kakadu [Psittacus Philippinarum, *Gml.*] 216
Ducorps' Kakadu [Psittacus Ducorpsi, *Hmbr.* et *Jacq.*] . . 217
Der roſenrothe Kakadu [Psittacus roseicapillus, *Vll.*] . . . 219
Der langſchnäbelige Kakadu [Psittacus nasica, *Tmm.*] . . . 222
Der große langſchnäbelige Kakadu [Psittacus pastinator, *Gld.*] . . . 223
Der nacktäugige Kakadu [Psittacus gymnópis, *Scl.*] 224
Das Geſchlecht Langſchwanzkakadu [Calyptorrhynchus, *Vgrs.* et *Hrsf.*] . 226
Der rothköpfige Langſchwanzkakadu [Psittacus galeatus, *Lth.*] 227
Banks' Langſchwanzkakadu [Psittacus Banksi, *Lth.*] 229

Digitized by Google

Seite

Der großschnäbelige Langschwanzkakadu [Psittacus stellatus, *Wgl.*] . 230
Solander's Langschwanzkakadu [Psittacus Solandri, *Tmm.*] 230
Baudin's Langschwanzkakadu [Psittacus Baudini, *Vgrs.*] 230
Der gelbohrige Langschwanzkakadu [Psittacus funéreus, *Shw.*] 231
Das Geschlecht Arara-Kakadu [Microglossus, *Gffr.*] 232
Der schwarze Arara-Kakadu [Psittacus atérrimus, *Gml.*] . . 233
Das Geschlecht Keilschwanzkakadu [Callipsittacus, *Lss.*] 235
Der Keilschwanzkakadu [Psittacus Novae-Hollandiae, *Gml.*] . 235
Die Loris- oder Pinselzungen-Papageien 238
Das Geschlecht Breitschwanz- oder eigentliche Lori [Domicella, *Wgl.*] . . 243
Der schwarzkäppige Breitschwanzlori [Psittacus atricapillus, *Wgl.*] 245
Der Lonisade-Breitschwanzlori [Psittacus hypoenóchrous, *Gr.*] . . . 247
Der Breitschwanzlori mit schwarzem Halsfleck [Psittacus chlorocercus, *Gld.*] 248
Der blauschwänzige Breitschwanzlori [Psittacus lori, *L.*] . . 249
Der Breitschwanzlori mit gelbem Mantelfleck [Psittacus garrulus, *L.*] 251
Der blauschulterige Breitschwanzlori [Psittacus ruber, *Gml.*] . 254
Der blaugestrichelte Breitschwanzlori [Psittacus reticulatus, *Mll.* et *Schlg.*] 256
Der blaubrüstige Breitschwanzlori [Psittacus coccíneus, *Lth.*] 257
Der violettnackige Breitschwanzlori [Psittacus ricíniatus, *Bchst.*] . . . 259
Der weißbürzelige Breitschwanzlori [Psittacus fuscatus, *Blth.*] 260
Das Geschlecht Stumpfschwanzlori oder Nestorpapagei [Nestor, *Wgl.*] . . 262
Der braunbrüstige Stumpfschwanzlori [Psittacus meridionalis, *Gml.*] 262
Der olivengrüne Stumpfschwanzlori [Psittacus notabilis, *Gld.*] 263
Das Geschlecht Keilschwanzlori [Trichoglossus, *Vgrs.*] 267
Der blaubäuchige Keilschwanzlori [Psittacus Swainsoni, *Jard.* et *Slb.*] 269
Der blauohrige Keilschwanzlori [Psittacus ornatus, *L.*] . . . 273
Das Geschlecht Arara [Sittace, *Wgl.*] 276
Der hyazinthblaue Arara [Psittacus hyacinthinus, *Lth.*] . . 279
Der meerblaue Arara [Psittacus glaucus, *Vll.*] 280
Lear's blauer Arara [Psittacus Leari, *Bp.*] 280
Spix' blauer Arara [Psittacus Spixi, *Wgl.*] 281
Lafresnaye's rother Arara [Psittacus Lafresnayei, *Fnsch.*] 281
Der rothstirnige Arara [Psittacus militaris, *L.*] 281

Digitized by Google

Seite

Der hellrothe Arara [Psittacus macao, *L.*] 283
Der dunkelrothe Arara [Psittacus chloróptерus, *Gr.*] . . . 285
Der dreifarbige Arara [Psittacus tricolor, *Bchst.*] 286
Der blaue gelbbrüſtige Arara [Psittacus ararauna, *L.*] . . . 287
Der Caninde-Arara [Psittacus caninde, *Wgl.*] 288
Der rothbäuchige Arara [Psittacus macavuana, *Fnsch.*] 289
Der Arara mit rothem Handgelenk [Psittacus sevérus, *L.*] . 289
Der rothrückige Arara [Psittacus maracana, *Vll.*] 291
Der Arara mit gelbem Halsband [Psittacus auricollis, *Css.*] 292
Der kleine grüne Arara [Psittacus nobilis, *L.*] 293
Hahn's Arara [Psittacus Hahni, *Snc.*] 294
Der Arara mit gelben unterſeitigen Flügeldecken [Psittacus pachyrrhynchus, *Swns.*] 294
Das Geſchlecht Langſchnabelſittich [Henicognathus, *Gr.*] 294
Der Langſchnabelſittich [Psittacus leptorrhynchus, *Kng.*] . . 295
Das Geſchlecht Edelſittich [Palaeornis, *Vgrs.*] 296
Der Halsband-Edelſittich [Psittacus torquatus, *Bdd.*] . . . 300
Der Halsband-Edelſittich von Mauritius [Psittacus eques, *Bdd.*] . . 304
Der rothſchulterige Edelſittich mit roſenrothem Halsband [Psittacus eupatrius, *L.*] 305
Der rothſchulterige Edelſittich ohne rothes Halsband [Psitt. Wardi, *Nwtn.*] . 307
Hodgſon's Edelſittich [Psittacus Hodgsoni, *Fnsch.*] 308
Der blaubürzelige Edelſittich [Psittacus Cathropae, *Blth.*] 309
Der rothſchnäbelige Edelſittich mit rother Bruſt [Psittacus Alexandri, *L.*] 309
Der roth- und ſchwarzſchnäbelige Edelſittich mit rother Bruſt [Psittacus Lathami, *Fnsch.*] 312
Der ſchwarzſchnäbelige Edelſittich mit rother Bruſt [Psittacus melanorrhynchus, *Wgl.*] 313
Prinz Luzian's Edelſittich [Psittacus Luziani, *Vrrx.*] 314
Der rothnackige Edelſittich [Psittacus longicaudatus, *Bdd.*] . 315
Der rothſchnäbelige Edelſittich von den Nikobaren [Psittacus nicobaricus, *Gld.*] 317
Der ſchwarzſchnäbelige Edelſittich von den Nikobaren [Psittacus Tytleri, *Hume* (Psittacus affinis, *Tlr.*)] 317
Das Geſchlecht Keilſchwanzſittich [Conúrus, *Khl.*] 318
Der nordamerikaniſche Keilſchwanzſittich [Psittacus carolinensis, *L.*] 320

Digitized by Google

Seite

Der Pavua-Keilschwanzsittich [Psittacus pavua, *Bdd.*] . . . 324
Der Keilschwanzsittich von Kuba [Psittacus euops, *Wgl.*] . . 326
Der Keilschwanzsittich von Patagonien [Psittacus patagonus, *Vll.*] 327
Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn [Psittacus haemórrhous, *Spx.*] 330
Der orangegelbe Keilschwanzsittich [Psittacus solstitialis, *L.*] . 333
Der hyazinthrothe Keilschwanzsittich [Psittacus jendaya, *Gml.*] 334
Der orangestirnige Keilschwanzsittich [Psittacus aureus, *Gml.*] 336
Der Keilschwanzsittich mit gelbem Gesicht [Psittacus pertinax, *L.*] 340
Der Keilschwanzsittich mit ockerbräunlichem Gesicht [Psittacus aeruginosus, *L.*] 340
Der grünwangige Keilschwanzsittich [Psittacus cactorum, *Pr. Wd.*] 340
Das Geschlecht Dickschnabelsittich [Bolborrhynchus, *Bp.*] 344
Der Mönchs-Dickschnabelsittich [Psittacus mónachus, *Bdd.*] . 345
Der schwarzgefleckte Dickschnabelsittich [Psittacus lineolatus, *Brd.*] . . 349
Der Dickschnabelsittich mit gelbem Gesicht [Psittacus aurifrons, *Lss.*] . 351
Das Geschlecht Schmalschnabelsittich [Brotogérys, *Vgrs.*] 351
Der Tovi-Schmalschnabelsittich [Psittacus tovi, *Gml.*] 353
Der Tuipara-Schmalschnabelsittich [Psittacus tuipara, *Gml.*] . 355
Der Tirika-Schmalschnabelsittich [Psittacus tirica, *Gml.*] . . 356
Der Schmalschnabelsittich mit hochgelber Flügelbinde [Psittacus xanthópterus, *Spx.*] 359
Der Schmalschnabelsittich mit gelber und weißer Flügelbinde [Psittacus virescens, *Gml.*] 361
Das Geschlecht Plattschweifsittich [Platycercus, *Vgrs.*] 362
Der bunte Plattschweifsittich [Psittacus eximius, *Shw.*] . . . 366
Der blaßköpfige Plattschweifsittich [Psittacus pallidiceps, *Vgrs.*] 370
Der purpurrothe glänzende Plattschweifsittich [Psittacus splendens, *Pl.*] 372
Der braunrothe glänzende Plattschweifsittich [Psittacus tabuënsis, *Gml.*] 374
Der schwarzmaskirte Plattschweifsittich [Psittacus larvatus, *Rss.*] 376
Der rothstirnige neuseeländische Plattschweifsittich [Psittacus Novae-Zeelandiae, *Sprrm.*] 377
Das Geschlecht Wellensittich [Melopsittacus, *Gld.*] 380
Der Wellensittich [Psittacus undulatus, *Shw.*] 381
Sachregister 390

Digitized by Google

Vorwort.

Die Liebhaberei für sprechende Papageien ist nicht allein uralt, sondern auch in unsrer Gegenwart ungemein regsam und weit verbreitet. Der einzeln als Sprecher gehaltene Vogel wird ja in weit höherm Grade zum Freund und Genossen des Menschen als jeder andre.

Billigerweise dürfen die ihm sich zuwendenden Liebhaber — ebenso wie die Liebhaber und Züchter dieser oder jeder andern Vogelgruppe — verlangen, daß auch ihnen eine Quelle geboten werde, aus welcher sie Rathschläge für den Einkauf, die Verpflegung, Abrichtung u. drgl. schöpfen können. Eine solche zu gewähren habe ich in dem vorliegenden Werkchen unternommen. Die Beurtheilung, ob es mir gelungen ist, den Erwartungen und Anforderungen, welche die Freunde dieser Vögel stellen dürfen, zu genügen, muß ich einer berufnen Kritik überlassen.

Digitized by Google

Es sei mir nun aber gestattet, hier einerseits noch einige Hinweise anzufügen inbetreff der Gesichtspunkte, welche bei Abfassung dieses Lehrbuchs maßgebend waren und andrerseits einige Andeutungen, die für den Gebrauch desselben nothwendig erscheinen.

Wer an die Ausarbeitung einer solchen Schrift sich wagt, muß doch vor allem mit den entsprechenden, auf Erfahrungen begründeten Kenntnissen ausgerüstet sein, andernfalls würde er den Lesern nur Täuschungen bringen und sich selber ein arges Armuthszeugniß ausstellen.

Es ist wol allbekannt, daß ich mich seit Jahrzehnten ausschließlich mit praktischer Vogelpflege beschäftige und die beiweitem meisten Arten, welche ich beschreibe, im Lauf der Zeit selber gehalten habe; ich kenne sie daher aus Anschauung und zwar nicht blos nach ihrem Aeußern, sondern auch in ihrem ganzen Wesen, nach allen ihren Eigenthümlichkeiten, Bedürfnissen und Leistungen. Die Fülle von Mittheilungen sodann, welche ich für mein größres Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" rastlos gesammelt, ergab sich erklärlicherweise auch für dieses kleinre Buch als ungemein nutzbar. Praktische Anleitungen nach allen Seiten hin mußten für das letztre ja unter allen Umständen als Hauptsache gelten. Wer ferner die überaus reichen Schätze an Schilderungen und allerlei Aufzeichnungen, die im Lauf des letzten Jahrzehnts in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt" von fast unzähligen Pflegern sprechender Papageien niedergelegt worden, zu überblicken vermag und mir zutraut, daß ich dieselben neben den eigenen Erfahrungen

Digitized by Google

gewissenhaft und verständnißvoll benutzt habe, wird ermessen können, daß ich wol mit voller Berechtigung und gutem Muth an die Lösung der mir gestellten Aufgabe gehen durfte.

Das hervorragendste Werk, welches wir auf dem Gebiet der Papageienkunde haben, ist nach meiner Ueberzeugung die Monographie „Die Papageien" von Dr. Otto Finsch (Leyden 1867—1868). Seitdem dieselbe erschienen, hat die Forschung freilich viel Neues gebracht; wenn aber auf Grund dessen ein jüngrer Schriftsteller Finsch' Buch als veraltet bezeichnet, dessen Leistung herabsetzen und an Stelle derselben den eignen Versuch eines Conspectus psittacorum erheben will, so kann er sich dadurch in den Augen aller Sachverständigen nur lächerlich machen. Die vieljahrelangen Forschungen des erstgenannten Gelehrten, die sorgsamen Vergleichungen in fast allen Museen Europas und selbst in den zoologischen Gärten an lebenden Vögeln, die auf die gründlichsten und gediegensten Kenntnisse begründete Darstellung, werden Finsch' Monographie einen dauernden Werth sichern. In dieser Ueberzeugung habe ich mich in der wissenschaftlichen Beschreibung, ebenso wie in meinem größern Werk auch in dem vorliegenden, mit vollem Vertrauen auf Dr. Finsch gestützt und an seinem Buch immer einen Rathgeber gefunden, wie solchen keine andre Quelle gewähren kann. Ich habe, was ich auch hier ausdrücklich bemerken muß, die Beschreibung eines jeden der Papageien, die ich bis jetzt lebend vor mir gehabt, in der Weise gegeben, daß ich mit dem lebenden Vogel in der Hand die von Finsch aufgestellte Beschreibung durchging, Punkt für Punkt verglich und insbesondre die

Digitized by Google

Färbung des Schnabels, der Augen und Füße ergänzte und berichtigte; gleiches ist inbetreff der Geschlechtsverschiedenheiten und Jugendkleider geschehen, in allen Fällen, in denen die Züchtung oder anderweitige Erforschung im letzten Jahrzehnt Erfahrungen gebracht hat.

Dem Titel dieses Buchs entsprechend durften hier ausschließlich nur die Papageien berücksichtigt werden, von denen bis jetzt festgestellt worden, daß sie sprachbegabt sind; nur in wenigen Fällen habe ich eine noch nicht als Sprecher bekannte, aber einem solchen nahe verwandte Art mitgezählt, in der Ueberzeugung nämlich, daß sie sich über kurz oder lang gleichfalls als sprachfähig ergeben oder wol gar als übereinstimmend fortfallen werde. Bei den Gruppen, deren Angehörige von vornherein als Sprecher gelten — wie z. B. die Amazonen — mußte ich natürlich auch die bisher erst äußerst selten oder noch garnicht lebend eingeführten Arten anführen, denn die Erfahrung hat bei meinen vorhergegangenen Büchern, insbesondre dem „Handbuch für Vogelliebhaber", gelehrt, daß selbst Arten, welche voraussichtlich der Einführung sich nicht zugänglich zeigten, dennoch plötzlich im Handel erschienen und wol gar in kürzester Frist als gemeine Stubenvögel gelten durften.

Inanbetracht dessen, daß ein solches Werk wie das vorliegende doch unbedingt auch einen gewissen internationalen Werth erlangen muß, habe ich nicht allein auf die Verhältnisse des Vogelhandels nach seinem ganzen Umfange hin Rücksicht genommen, sondern auch die Namen der behandelten Papa-

Digitized by Google

geien in den Sprachen der vier Länder (Deutschland, England, Frankreich und Holland), in denen die Haupteinfuhr der Papageien stattfindet, so vollständig als möglich angefügt. Wie in allen meinen übrigen Werken habe ich es aber auch hier vermieden, Namen anzugeben, welche willkürlich und verständnißlos aufgestellt worden. Vor allem berücksichtige ich immer die bereits vorhandenen Benennungen, soweit sie irgend als zutreffend sich erweisen; wo ich neue bringen muß, übertrage ich stets in erster Linie die wissenschaftliche Benennung und erst, wenn dies nicht ausführbar ist, wähle ich eine solche, die den Eigenthümlichkeiten des Vogels möglichst entspricht oder ich stelle einen Widmungsnamen auf, durch welchen das Verdienst eines hervorragenden Forschers, Kenners, Pflegers oder Züchters geehrt wird.

Für den praktischen Gebrauch dieses Handbuchs bitte ich folgendes beachten zu wollen. Zunächst suche man im Sachregister den Namen des Vogels, unter welchem man ihn eben kennt, auf und dann lese man aber auch an allen Stellen, an welchen er unter demselben, sowie seinen übrigen Benennungen angeführt ist, nach; vornehmlich unterrichte man sich in den Abschnitten, ‚Einkauf und Empfang', ‚Wohnungen', ‚Ernährung', ‚Zähmung und Abrichtung', ‚Gesundheitspflege' und ‚Krankheiten' recht aufmerksam. Nur dann wird man Anleitungen und Rathschläge für alle Fälle in gewünschter Weise finden können.

Unter den vielen Büchern, welche in letztrer Zeit auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei, -Pflege und -Zucht erschienen sind,

Digitized by Google

steht das vorliegende allein da, denn es gibt kein andres, welches sich mit dem betreffenden Gegenstand ausschließlich und ausführlich beschäftigt. Um so dringender wünsche ich daher, daß es allen Erwartungen, welche die Liebhaber sprechender Papageien inbetreff seiner zu hegen berechtigt sind, voll entsprechen möge!

Berlin, im Spätherbst 1882.

Dr. **Karl Ruß.**

Digitized by Google

UNIV. OF CALIFORNIA

Allgemeines.

Viele Vorzüge sind es, die den Vogel vor allen anderen Thieren und selbst dem Menschen gegenüber auszeichnen.

Wir beneiden ihn vornehmlich um seines Fluges willen, der herrlichen Gabe, die ihm ein gütiges Schicksal verliehen, sich hinauf in den Aether zu schwingen und hoch über allem andern Leben dahinzuschweben.

Seine Genossen in der Thierwelt bleiben aber auch noch in mancher andern Beziehung hinter ihm zurück, so z. B. in der Befähigung, menschliche Worte nachzuahmen. Diese Sprachbegabung finden wir bekanntlich nirgends weiter als bei den Vögeln; sogar den am höchsten stehenden Vierfüßlern, Hund, Elephant, Pferd u. a., die ja nicht selten eine förmlich menschliche Klugheit entwickeln, ist sie versagt, während auch an geistiger Regsamkeit der sprechende Vogel jene zuweilen sämmtlich übertrifft. Freilich sind es beiweitem nicht alle Vögel, welche sprechen lernen, sondern nur aus einigen Familien im ganzen verhältnißmäßig wenige Arten.

Im allgemeinen sind wir daran gewöhnt, die Sprache als den bedeutungsvollsten Vorzug des Menschen vor seinen Mitgeschöpfen anzusehen. Sie ist es ja, welche ihn unter allen Umständen von jeglichem Gethier unterscheiden und selbst die ihm thatsächlich am nächsten verwandten Thiere bedeutsam unter ihm einreihen lassen soll.

Digitized by Google

Uebrigens haben ja aber auch die Thiere ihre Sprache: Laute und Zeichen klarbewußter Verständigung. Wer an der Richtigkeit dieser Behauptung zweifeln will, möge nur hinaus kommen in die freie Natur, um das wirkliche Leben zu schauen. Wenn ein Schwarm irgendwelcher Vögel, nehmen wir die allergewöhnlichsten an, also Sperlinge, harmlos vergnügt seinen Beschäftigungen nachgeht und futtersuchend sich umhertummelt, so bedarf es nur eines Warnungstons, um sie alle von einer herannahenden Gefahr zu benachrichtigen, und je nach der Art der Bedrohung sind ihre Rufe überaus verschieden. Kommt ein Sperber in Sicht, so bringt ein entsetztes terrr! die ganze Schar zur schleunigsten Flucht; beim Heranschleichen der Hauskatze veranlaßt das ganz anders klingende terr! nur eine Anzahl der ängstlichsten davon zu huschen; wenn es aber blos ein Bube mit dem Blasrohr oder einer Steinschleuder ist, so mahnt das ter! die Genossen nur zur Aufmerksamkeit und Vorsicht, und vorläufig sieht man keine Flüchtlinge forteilen. Dann wird drüben auf dem Hofe Wasser ausgegossen und ein fröhliches huit! huit! ruft die Schar herbei zum eifrigen Auslesen der mitgespülten Kartoffel- und Brotstückchen und anderen Brocken. Ein Flug Krähen hat sich in den Gipfeln der hohen Pappeln zur Nachtruhe niedergelassen, unterhalb den Weg entlang gehen und fahren zahlreiche Leute, ohne daß sich die Vögel darum kümmern, sogar ein Jäger mit der Flinte überm Rücken und einem Hunde an der Leine wird kaum beachtet, denn nur wenige der scheuesten fliegen hinweg. Dann aber kommt ein jugendlicher Schütz, der einen gezähmten Fuchs an der Kette hält und für denselben hin und wieder Vögel erlegen muß; sobald sich dieser selbst, hinter einem hohen Zaun gedeckt, nähert, ruft plötzlich eine alte erfahrene Krähe ihr entrüstetes schwart! und mit gewaltigem Geräusch erhebt sich der ganze Schwarm, um eiligst

Digitized by Google

von dannen zu ziehen. Dies sind Beispiele aus der Wirklichkeit des Naturlebens, Beweise von der Sprache, bzl. Verständigungsfähigkeit der Vögel. Ja, wir haben solche auch aus den Kreisen der kleinsten, niedersten Thiere vor uns. Wenn wir vermittelst eines Stocks am äußersten Rande eines Ameisenhaufens ein wenig scharren, so eilen nicht allein sofort zahlreiche Ameisen herbei, sondern wir sehen auch, daß plötzlich eine Bewegung von hier aus durch die gesammte Bewohnerschaft geht, sodaß dieselbe bis tief zum Mittelpunkt hinein und gleicherweise bis zur weitesten Grenze hin in Erregung geräth; die Thiere vermögen einander also das stattgehabte Ereigniß sogleich mitzutheilen.

Bedenken wir, wie verhältnißmäßig wenig verschieden beim Menschen, vom hochstehenden Gebildeten herab bis zum kaum der Kultur fähigen Wilden die Sprachbefähigung sich abstuft, so werden wir zugeben müssen, daß die angeführten Beispiele der Thiersprache — und der Naturkundige hat ihrer ja unzählige vor Augen — uns bei näherer Kenntniß mit Bewunderung erfüllen können; trotzdem darf uns aber die menschliche Sprache, die volltönende, wohllautende Aeußerung des Fühlens und Denkens, der klare Ausdruck wechselnder Empfindungen doch immerhin als das höchste gelten, — und wenn ein Thier diese Sprache des Menschen auch nur bedingungsweise nachzuahmen vermag, so gehört es entschieden zu den am höchsten stehenden, eben dem Menschen am ähnlichsten erscheinenden Geschöpfen.

Mit voller Berechtigung wendet sich daher eine überaus regsame, weit verbreitete Liebhaberei dem sprechenden Thier, d. h. also dem sprachbegabten, abgerichteten Vogel, zu.

Aus der Jugendzeit her erinnert sich Mancher wol als eines der wichtigsten Ereignisse in seiner Vaterstadt des Erscheinens eines sprechenden Vogels. Es war in der Regel ein

Digitized by Google

weißer Kakadu, der träge und schläfrig in dem Bügel hockte, an welchen er gekettet und in dem er umhergetragen wurde, der dann aber die prächtige farbige Haube sträubte und komisch kopfnickend und flügelschlagend mit schriller Stimme sein „Kakadu", „Kakadu" rief. Alt und Jung lief herbei, und wenn er dann bedeutsam hinzufügte „Kakadu hat Hunger", da wurden nicht allein Zucker, Kuchen, Mandeln und Rosinen massenhaft gebracht, sondern es öffneten sich auch die Börsen, und Dreier, ja selbst Groschen, regneten förmlich auf den fahrenden Künstler mit seinem Wundervogel herab. Einen Scherz vom sprechenden Vogel erzählten die Zeitungen. In Wien beschaut ein erst jüngst eingekleideter Soldat den großen in philosophischer Ruhe dasitzenden Arara, und als er denselben einigemal umkreist hat, sagt dieser plötzlich „Schafskopf!" Hurtig greift der junge Vaterlandsvertheidiger nach der Mütze, macht eine hastige Verbeugung und bittet: „Verzeih'n Euer Gnoden, i hab' halter g'meint, Sie sei'n a Vogerl." — So verknüpft gewissermaßen der gefiederte Sprecher die gesammte Welt der Vögel mit dem Menschenleben, und seine Bedeutung reicht gleicherweise in unsere fernen Jugenderinnerungen zurück, wie sie uns auf dem ganzen Lebenswege und in allen Verhältnissen folgt. Heutzutage ist der sprechende Vogel keine besondre Seltenheit mehr, denn wir sehen ja allenthalben, selbst in kleinen Städten und bei ländlichen Besitzern schon Papageien und noch dazu in förmlich unzähligen Arten verbreitet, unter denselben aber fast mehr Sprecher als Schmuckvögel.

Es sind jedoch nicht die Papageien allein, welche die Befähigung haben, menschliche Worte nachsprechen zu lernen, sondern noch eine beträchtliche Anzahl anderer fremdländischen und einheimischen Vögel ist es, die sich nach unsrer bisherigen Kenntniß freilich auf Angehörige bestimmter Familien beschränken; doch dürfen wir den letztern Ausspruch nicht etwa als un-

Digitized by Google

umstößliche Regel festhalten, denn in letztrer Zeit sind bedeutsame Ausnahmen vorgekommen. Bis vor kurzem kannte man als sprachbegabte Vögel solche aus den Reihen der Papageien, aber vorzugsweise nur der größeren Arten, ferner der krähenartigen oder Raben und der Stare, neuerdings sind nun auch die Finkenvögel hinzugekommen, indem bereits in mehreren Fällen der Kanarienvogel sprechen gelernt hat. Die vornehmsten und wichtigsten sprechenden Vögel bleiben indessen doch immer die Papageien, und zwar steht es als Thatsache fest, daß außer den längst bekannten großen Sprechern auch Angehörige der meisten übrigen Geschlechter bis zum Nymfensittich oder Keilschwanzkakadu und sogar bis zu einem der allerkleinsten, dem allbekannten Wellensittich, als sprachbegabt sich gezeigt haben.

Gern würde ich hier eine allgemeine Schilderung aller Papageien überhaupt geben, allein dazu reicht der Raum, über welchen ich in diesem Buche zu verfügen habe, beiweitem nicht aus, und ich muß mich also bescheiden, auf meine Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III („Die Papageien") und „Handbuch für Vogelliebhaber" I hinzuweisen. Nur die hauptsächlichsten Eigenthümlichkeiten dieser hochinteressanten Vögel will ich hervorheben, und selbstverständlich um so gründlicher werde ich auf die Verpflegung und Abrichtung in besonderen Abschnitten eingehen.

Bis jetzt sind bereits weit über 400 Arten Papageien bekannt; eine genaue, feststehende Zahl vermag ich nicht anzugeben, einerseits weil täglich neu entdeckte Arten hinzukommen können, andrerseits und hauptsächlich aber, weil es recht viele gibt, über welche die Vogelkundigen noch nicht einig sind, ob dieselben als wirkliche Arten oder nur als Spielarten, Lokalrassen oder bloße zufällige Abänderungen gelten dürfen. Die Heimat der Papageien erstreckt sich über alle Welttheile mit

Digitized by Google

Ausnahme Europas, doch sind sie vorzugsweise Tropenbewohner. Eine so große Familie überaus vielgestaltiger und hochinteressanter Vögel mußte erklärlicherweise den Gelehrten seit altersher vielfachen Anreiz gewähren, und daher ist es nicht verwunderlich, daß wir eine sehr reiche Literatur inbetreff ihrer vor uns sehen. Unter allen Schriften, welche sie behandeln, steht aber die Monographie „Die Papageien" von Dr. Otto Finsch (Leiden 1867—68) als wissenschaftliche Belehrungsquelle hoch obenan. In meinem vorhin genannten größern Werke habe ich mich auf die Forschungen des genannten hervorragendsten Schriftstellers auf diesem Gebiete, soweit es nöthig war, gestützt, und dies geschieht also auch hier.

Ueberblicken wir die außerordentlich große Mannigfaltigkeit nun von dem Gesichtspunkt aus, der hier vorzugsweise unsre Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, so muß ich zunächst die Erfahrung als Thatsache hervorheben, daß fast sämmtliche Papageien-Geschlechter Angehörige zeigen, bei denen Sprachbegabung erwiesen ist. Sprecher haben wir also vor uns aus den Geschlechtern: Eigentlicher Papagei (Psittacus, *L.*), Amazonenpapagei (Chrysotis, *Swns.*), Edelpapagei (Eclectus, *Wgl.*), Langflügelpapagei (Pionias, *Wgl.*), eigentlicher Kakadu (Plectolophus, *Vgrs.*), Langschwanzkakadu (Calyptorrynchus, *Vgrs.* et *Hrsf.*), Ararakakadu (Microglossus, *Gff.*), Keilschwanzkakadu (Callipsittacus, *Lss.*), Keilschwanzlori (Trichoglossus, *Vgrs.*), Breitschwanzlori (Domicella, *Wgl.*), Stumpfschwanzlori oder Nestor (Nestor, *Wgl.*), Arara (Sittace, *Wgl.*), Langschnabelsittich (Henicognathus, *Gr.*), Edelsittich (Palaeornis, *Vgrs.*), Keilschwanzsittich (Conurus, *Khl.*), Dickschnabelsittich (Bolborrhynchus, *Bp.*), Schmalschnabelsittich (Brotogerys, *Vgrs.*), Plattschweifsittich (Platycercus, *Vgrs.*), Wellensittich (Melopsittacus, *Gld.*), — und bis jetzt sind noch nicht Sprecher nachgewiesen in den Geschlechtern: Maskarenenpapagei (Mascarenus, *Lss.*),

Digitized by Google

Borstenkopfpapagei (Dasyptilus, *Wgl.*), Zwergpapagei (Psittacula, *Khl.*), Zwergkakadu (Nasiterna, *Wgl.*), Eulenpapagei (Stringops, *Gr.*), Papageichen (Coryllis, *Fnsch.*), Streifenpapagei (Psittacella, *Schl.*), Schönsittich (Euphema, *Wgl.*), Erdsittich (Pezoporus, *Ill.*). Wie gesagt aber, wir dürfen uns keineswegs bei den bisherigen Ergebnissen bescheiden oder gar behaupten wollen, daß es in den Reihen der zuletzt hergezählten Papageien durchaus keine Sprecher gebe, denn ebensogut, wie sich mit einmal der Wellensittich als ein solcher kundgethan, dürfen wir dies auch von irgend einer Art der Schönsittiche, Zwergpapageien, Papageichen und übrigen erwarten.

Die Körperbeschreibung der Papageien würde hier als überflüssig anzusehen sein, wohlverstanden, soweit sie sich auf den Bau des Körpers und die Beschaffenheit aller Organe erstreckt, während natürlich das Gefieder und seine Farben bei jeder einzelnen Art zur Feststellung und Kennzeichnung angegeben werden müssen. Eine eingehende Beschreibung der Zunge, als des wesentlichsten Körpertheils des sprechenden Vogels — wie des Menschen — möchte ich hier jedoch keinenfalls fortlassen: „In der Regel erscheint sie dick, fleischig, stumpf, kegelförmig; mitunter hat sie indessen eine kleine hornige, eichelförmige Spitze, häufiger aber ist sie am vordern Ende mit unzähligen fadenförmigen Wärzchen besetzt, welche in dicken, etwas plattgedrückten Zylindern von übereinander geschichteten elastischen Fasern bestehen, über die sich die Zungenschleimhaut in mehreren Schichten und stark verhornt lagert. Bei den meisten Geschlechtern hat die Zunge die zuerst erwähnte glatte Beschaffenheit, nur bei wenigen, den großen Araras und Ararakakadus endigt sie in die hornartige Spitze, und bei den Pinselzünglern oder Loris zeigt sie die letztre von Dr. Weinland beschriebne Eigenthümlichkeit. Es ist noch nicht

Digitized by Google

mit Sicherheit festgestellt, ob die Pinselzunge wirklich dazu dient, wie man behauptet hat, Honigsaft aufzusaugen. Ganz besonders muß hervorgehoben werden, daß die Arten mit dicker, fleischiger, glatter Zunge, also die eigentlichen Papageien, zum Nachsprechen menschlicher Worte am besten geeignet sich zeigen; im übrigen aber lernen, wie die Erfahrung dargethan hat, auch aus den anderen Geschlechtern, ja gleicherweise auch von den Pinsenzünglern, manche Arten plaudern."

Hinsichtlich der geistigen Begabung der Papageien sind die Meinungen der Ornithologen wie der Vogelpfleger außerordentlich weit auseinandergehend. Während die Einen in liebevoller Voreingenommenheit oder auch wol in Unklarheit und unwillkürlicher Uebertreibung den sprechenden Vogel ebenbürtig neben den Menschen stellen, ihm nicht allein Klugheit und scharfen Verstand, sondern auch Vernunft und warmes Gefühl beimessen — sehen die Anderen selbst die ungewöhnlichen Leistungen eines hervorragend begabten und ausgebildeten Vogels lediglich als mechanisches Nachplappern, als bloßes Geschwätz ohne Vorstellung von dem Sinn der Worte an. Weiterhin werde ich mehrfach Veranlassung nehmen, hierauf eingehend zurückzukommen.

Auf die Lebensweise der Papageien in der Freiheit im allgemeinen näher einzugehen, muß ich mir gleichfalls versagen, während es in meinem erwähnten größern Werk ausführlich geschehen ist.. Mit Rücksicht auf die Behandlung und Verpflegung dieser Vögel in der Vogelstube war dies auch nothwendig, denn wie wollte man einen Vogel richtig ernähren, sachgemäß behandeln und vor allem mit Erfolg züchten, wenn man nicht sein Freileben und seine Gewohnheiten kennt und seine Bedürfnisse zu befriedigen weiß! Der Papagei in der Vogelstube tritt uns gleichsam im freien, oder doch nur halbwilden Zustand gegenüber, der Sprecher dagegen erscheint uns

Digitized by Google

ausschließlich als gefangner Vogel. Als solcher muß er auf alles verzichten, was ihm die Freiheit geboten; weder die regelmäßige Lebensweise, noch die ausreichende Bewegung kann er haben. Luft, Licht, Wärme, ja vornehmlich die Nahrung, alles ist verändert und den Verhältnissen der Heimat nur zu fremd. Hier heißt es keineswegs wie bei der Züchtung: die Natur möglichst treu nachahmen und für das Mangelnde soweit als ausführbar naturgemäßen Ersatz bieten, sondern im Gegentheil, hier müssen neue Verhältnisse geschaffen und in ganz andrer Weise die Bedürfnisse befriedigt werden. Man darf aber durchaus nicht glauben, daß es gleichgiltig sei, in welcher Weise der Papagei im Käfig ernährt wird, vieljährige Erfahrung hat vielmehr ganz bestimmte Gesichtspunkte feststellen lassen, nach denen die Verpflegung geschehen muß. Jede Uebertretung der Vorschriften, die ich auf Grund derselben weiterhin in dem Abschnitt über Fütterung geben werde, bestraft sich hart durch Erkrankung oder gar Verlust des mehr oder minder werthvollen Vogels. Zunächst sei nur bemerkt, daß alle Papageien vorzugsweise, zum Theil ausschließlich, Pflanzenfresser sind und von Früchten, Sämereien, aber auch Blüten, Schößlingen und anderen weichen und zarten Gewächstheilen sich ernähren. Viele, namentlich die kleineren Arten, bedürfen auch für sich selbst oder zur Aufzucht der Jungen der Fleischnahrung und verzehren daher in der Freiheit offenbar nebenbei Kerbthiere.

Alle Papageien zeigen sich als arge Zerstörer, indem sie viel mehr verderben, zerschroten, zermalmen, als sie zur Ernährung brauchen; daher können sie an Nutzgewächsen außerordentlichen Schaden verursachen. Ueberall, wo sie in großen Schwärmen oder überhaupt zahlreich vorkommen, sind sie daher häufigen Verfolgungen ausgesetzt. Außerdem erlegt man sie aber auch zur Benutzung, so also, um ihr Gefieder zum Schmuck,

Digitized by Google

für allerlei Federnarbeiten u. drgl. zu verwenden, ferner um die ganzen Bälge für Sammlungen zuzubereiten, und schließlich werden viele Papageien als Wildbret gegessen.

Die Liebhaberei für sprechende Papageien ist offenbar uralt. In allen Welttheilen, wo Europäer mit den Eingeborenen zuerst in Berührung traten, fanden sie bei denselben bereits gezähmte Papageien vor; so in Ostindien, auf den Inseln des Malayischen Archipels, in Amerika und auch in Australien. Als die Entdecker Amerika's in dieser neuen Welt landeten, kamen ihnen die Indianer mit großen gezähmten Araras entgegen; in den Dörfern Guianas sieht man niemals spielende Kinder ohne Papageien und Affen zugleich, und in Afrika findet man zahlreiche Graupapageien um die Hütten der Neger, welche jung aus den Nestern gehoben und aufgefüttert worden und mit verschnittenen Flügeln auf den Strohdächern und Bäumen umherklettern. Ein Volksglaube besagt dort zwar, es herrsche im Jakonest derartige Hitze, daß, wer hineingreife, sich die Hand verbrenne, und von solchen vorwitzigen Versuchen sollen die weißen Flecke herstammen, welche manche Neger an den Händen haben. Letztere ergeben sich jedoch als Folge von Hautkrankheiten und die ganze Fabel ist nur für den Zweck erfunden, um die Genossen von der Beraubung der Papageien-Nester abzuschrecken, erfunden nämlich durch diejenigen, welche dieses Geschäft selber betreiben. In Südamerika gelten noch heutigentags die gewaltigen Bäume, in denen die großen prächtigen Araras nisten, als Familieneigenthum, welches sich vom Vater auf den Sohn vererbt. Die Federn solcher Vögel dienten früher zum Putz für die Häuptlinge und in jetziger Zeit schmücken mit denselben unsere Frauen Hüte u. a. Gleicherweise wie die lebenden Araras selber, bilden daher auch ihre Federn einen bedeutsamen Handelsartikel.

Bekanntlich werden alljährlich viele Tausende von Papa-

Digitized by Google

geien lebend bei uns eingeführt und dieselben finden sämmtlich willige Abnehmer. In diesem besonders seit dem letzten Jahrzehnt außerordentlich großartig gewordnen Vogelhandel zeigt sich nun aber von vornherein eine sehr üble Seite — das massenhafte Erkranken und Sterben der eingeführten Papageien (vornehmlich des Graupapagei) und auch mancherlei andern kleinern Gefieders. Man darf keineswegs glauben, daß diese betrübende Thatsache in einer etwaigen Weichlichkeit der Vögel begründet liege; im Gegentheil darin, das trotz all' der furchtbaren Beschwerden und Leiden, welche sie durchmachen müssen, dennoch die größte Anzahl lebend herüberkommt und daß sich von den krankhaft gewordenen viele, manchmal die Mehrzahl erholen, am Leben bleiben und völlig wieder gesunden, haben wir sicherlich einen Beweis dafür, mit welcher staunenswerthen Lebenskraft die meisten solcher anscheinend zarten Thiere ausgestattet sind.

Nothwendigerweise muß ich eine nähere Darlegung der trübseligen Verhältnisse geben. Herr Fr. Connor berichtet aus Brasilien in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt": Die Eingeborenen, Indianer und Mischlinge von Negern, bringen die Papageien noch im leidlichen Zustande nach den Hafenplätzen, füttern sie mit Früchten und Reis und verkaufen sie an die Händler zum Preise von durchschnittlich 2 Milreis = 4 Mark für den Kopf; am zahlreichsten werden die Papageien jedoch im Innern durch Tauschhandel erstanden, etwa um die Hälfte jenes Preises, und dann gelangen sie auf den Flußdampfern, welche den Para- und Amazonenstrom in großer Anzahl befahren, nach den Hafenstädten. Die Aufkäufer halten sie sodann in einem großen Kasten, in welchem einige Sitzstangen angebracht sind und der vorn mit Latten vernagelt ist, sodaß die Vögel nur wenig Luft und noch weniger Licht bekommen. Man denke sich solch' einen unsaubern Aufent-

Digitized by Google

haltsort mit keinerlei Vorrichtung zur Reinigung, in den das aus Bananen, Orangen und Kartoffeln bestehende Futter hineingeworfen wird und wo alles in kürzester Zeit bei der entsetzlichen Hitze in Säuerung und Fäulniß übergeht! Da strotzen die bedauernswerthen Vögel von Schmutz und Ungeziefer, und es ist also kein Wunder, daß ihre Gesundheit untergraben wird und sie unheilbarer Krankheit verfallen. Hier müssen sie bleiben, bis sie verkauft und auf einem Dampfer oder Segelschiff nach Europa übergeführt werden. Ganz ähnlich ist die Behandlung der Graupapageien in Afrika. Die Neger bringen sie in langen röhrenförmigen auf der Schulter getragenen Körben, aus welchen einer nach dem andern hinten gepackt und rückwärts herausgezogen wird, sodaß er nicht beißen kann, zum Markt, und die Verpflegung vonseiten der Aufkäufer ist nach übereinstimmenden Berichten im wesentlichen überall eine gleiche. In diesem wie in jenem Welttheil betrachtet man die lebenden Vögel lediglich als Handelsware und sucht bei recht geringer Mühe einen möglichst hohen Ertrag daraus zu gewinnen. Noch viel schlimmer aber als bei den Aufkäufern ergeht es den Papageien auf dem Dampfschiff. Sie werden in verhältnißmäßig enge, nur vorn vergitterte Kasten massenhaft eingepfercht und in den untersten Schiffsraum gebracht, wo sie in der heißen, dunstigen und qualmigen Luft auch noch daran leiden müssen, daß man ihnen, sei es aus Vorurtheil oder Mangel, das Trinkwasser vorenthält. Trotz aller solchen Unbillen bleiben sie, wie schon gesagt, staunenswertherweise in der beiweitem größten Anzahl nicht allein am Leben, sondern sie erscheinen, was uns doch geradezu wunderbar dünken muß, fast regelmäßig gut genährt und kräftig und lassen keinerlei Krankheits-Anzeichen erkennen. So kommen sie in Europa an, wo sie nun den schweren Kampf ums Dasein, in der Gewöhnung an ein rauhes Klima, veränderte Ernährung,

Digitized by Google

kurz und gut an ganz andere Verhältnisse und damit allerlei Unruhe und Beängstigung durchmachen müssen. Auch hier erhalten sie sich gewöhnlich noch 1 bis 2 Wochen, ja unter Umständen bis 6, in einzelnen Fällen sogar bis 8 Wochen lebend, aber sie sind mit ganz wenigen Ausnahmen dennoch unrettbar verloren. Auffallenderweise tritt die Erkrankung sofort, wol schon nach Stunden oder doch in wenigen Tagen bei einem bis dahin anscheinend ganz gesunden Papagei ein, sobald er Trinkwasser erhalten hat.

Vor allen anderen sind es, wie schon erwähnt, die Graupapageien, welche unter den beschriebenen üblen Einwirkungen zu leiden haben, und sie vornehmlich gehen auch an Blutvergiftung zugrunde, wie dies die Untersuchnng zahlloser frisch eingeführten gestorbenen hat feststellen lassen. Eine Heilung, bzl. Rettung hat sich als unmöglich ergeben, wenigstens konnte trotz vielfacher und vielseitiger Versuche bis jetzt kein Verfahren dazu aufgefunden werden, im Gegentheil, diese Krankheit ist auch für alle anderen, längst eingeführten und kerngesunden Papageien verderbendrohend, indem sie sich durch Ansteckung überträgt. Zur Abhilfe können zwei Wege führen. Entweder die Großhändler müssen sich dazu verstehen, den Ankauf der Graupapageien bereits in der Heimat so zu überwachen und regeln zu lassen, daß die Vögel künftig nicht mehr aus bloßer Habgier in unverantwortlicher Weise massenhaft zusammengerafft und durch schändliche Vernachlässigung dem Verderben preisgegeben werden, mit anderen Worten, die Großhändler haben dafür zu sorgen, daß die Papageien vom Anbeginn vernünftig und zweckmäßig verpflegt werden, sodaß die außerordentlich lebenskräftigen Vögel lebensfähig bleiben und so bei uns anlangen; oder dem ganzen Handel mit den Graupapageien muß vorläufig ein Ende gemacht werden, dadurch, daß die Liebhaber einmüthig bis auf weitres auf den Ankauf derselben ganz

Digitized by Google

verzichten. Hoffentlich wird es gelingen, wenn nicht anders durch das letzte Mittel, das erstre Ziel zu erreichen.

Die auf Segelschiffen herübergebrachten Papageien werden größtentheils vernünftiger gehalten und besser verpflegt und zeigen sich daher meistens ungleich ausdauernder; als unumstößliche Regel kann dies indessen leider doch nicht gelten, denn es kommt auch der entgegengesetzte Fall vor. Im übrigen sei noch darauf hingewiesen, daß die meisten Papageien, wie fremdländischen Vögel überhaupt, wenn sie nicht gerade von der unheilvollen Sepsis oder Blutvergiftung ergriffen sind, nachdem sie die weite beschwerliche Seereise überstanden, sich vortrefflich erholen und sehr gut ausdauern.

Recht viele Papageien, vornehmlich grüne Kurzschwänze, die sog. Amazonen aus Amerika, aber auch eine beträchtliche Anzahl anderer aus Asien und Afrika, kommen schon gezähmt oder wenigstens halb zahm in den Handel. Dieselben sind zum Theil als alte Vögel in die Gefangenschaft gerathen. Ueber die Art und Weise des Papageienfangs ist bis jetzt noch fast garnichts bekannt. Von den kleinen Papageien weiß man wol, daß sie schwarmweise in Netzen, mit Vogelleim oder Schlingen bei der Tränke und ähnlichen Gelegenheiten erbeutet werden; inbetreff der großen Sprecher aber kann man nur im allgemeinen annehmen, daß es ebenso oder ähnlich geschehe. Hinsichtlich der Zähmung in der Heimat erzählen Reisende, daß alte Indianer-Weiber die staunenswerthe Kunst kennen, einen wilden, unbändigen, bösartigen Papagei in kürzester Frist fügsam und zahm zu machen, sodaß ihn nach einigen Tagen, ja wol gar nach wenigen Stunden Jedermann, auch ein ganz Fremder, auf die Hand nehmen und streicheln darf. In dieser Hinsicht wird freilich viel gefabelt, doch dürfte die Thatsache an sich nicht zu bezweifeln sein, und nur inbetreff des Verfahrens ist man nicht im klaren, indem von Diesen behauptet worden,

Digitized by Google

daß die Indianerin nur ihre Hand ins Wasser tauche und damit dem Vogel über den Rücken streiche, während Jene meinen, sie flöße ihm betäubenden Pflanzensaft ein, nach einer andern Angabe wieder soll er durch das Beibringen des menschlichen Speichels so zahm werden. Die meisten der in den Handel gelangenden zahmen Papageien sind jedoch aus den Nestern gehobene und aus dem Munde mit gekautem Mais u. a. aufgefütterte Vögel, die dann auch bereits durch mehrere Hände gegangen; so vom Eingeborenen, Indianer oder Neger, zum Aufkäufer und von diesem oder auch unmittelbar vom erstern zum Seemann, Matrosen oder Schiffsbeamten, von diesen wiederum entweder an den Großhändler oder den Papageien-Abrichter in der Hafenstadt, von einem der beiden letzteren zum Kleinhändler und sodann von hier oder auch vom Großhändler schließlich in die Hand des Liebhabers. Auf diesem Wege hat der Papagei, wie sich wol denken läßt, bereits mancherlei gute, aber auch schlimme Lehren und Eigenthümlichkeiten angenommen. Die Abrichter in den Hafenstädten, welche man Papageienlehrer nennen könnte, sind kleinere Wirthe, Inhaber von Matrosen-Kneipen, Barbiere, ausgediente Seeleute u. A., also größtentheils ungebildete Menschen. Sie überliefern die Papageien, insbesondre Amazonen und Jakos, gewöhnlich schon fingerzahm und mehr oder weniger sprechend, sodaß der Liebhaber also in einem solchen Vogel selbstverständlich bereits ein werthvolles Thier vor sich hat, welches sich für weitern Unterricht in bester Weise zugänglich zeigt. Nur ein Uebelstand, freilich ein gar arger, kommt dabei inbetracht, der nämlich einer sehr häßlichen, breiten und unangenehmen Aussprache und namentlich auch von allerlei anderen abstoßenden Beigaben, so z. B. hat solch' Papagei manchmal Schimpfworte, gemeine Redensarten oder auch andere widerwärtige Laute, wie das täuschende Husten eines Brustkranken, Schnarchen, Röcheln, Ausspucken u. drgl.

Digitized by Google

nachahmen gelernt, und es hält dann außerordentlich schwer, ihn davon wieder zu entwöhnen. Trotzdem braucht man einen solchen Vogel keineswegs von vornherein als untauglich anzusehen; im Gegentheil, der Hauptwerth liegt ja doch immer in der Begabung und wenn man nur die Mühe einer sorgfältigen Erziehung nicht scheut, so vermag man ihm alles Ueble abzugewöhnen und zwar in gleichem Maße wie der Unterricht im guten fortschreitet. In neuerer Zeit ist es aufgefallen, daß die großen Vogelhandlungen bereits abgerichtete, zum Theil sogar schon viel sprechende Papageien immer zahlreicher ausbieten. Dies liegt darin begründet, daß sie aus den Vorräthen roher Vögel die besten auswählen und den erwähnten Abrichtern übergeben. Solch' Verfahren ist an sich lobenswerth und wird hoffentlich dahin führen, daß die noch immer gar zu hohen Preise für die gefiederten Sprecher sich allmählich wenigstens etwas herabmindern, sodaß dieselben auch den weniger begüterten Liebhabern zugänglich werden. Der vorhin besprochene Uebelstand der häßlichen Aussprache u. drgl. kommt natürlich auch hier zur vollen Geltung.

Einkauf und Empfang.

Je nach dem persönlichen Geschmack, mancherlei obwaltenden Verhältnissen, auch wol der Oertlichkeit, die man vor sich hat, entsprechend u. s. w., ist die Wahl der Art zu treffen, aus welcher man einen Papagei anschaffen will. Eine übersichtliche Schilderung, wie ich sie hier biete, muß aber selbst für den Liebhaber, der die Papageien erst wenig oder noch garnicht kennt, möglichst stichhaltige Angaben bringen; ich will mich bemühen, diese Erwartung zu erfüllen und weise hier darauf hin,

Digitized by Google

daß ich in den Gruppen-Uebersichten jedesmal eine eingehende Darstellung aller Eigenthümlichkeiten der betreffenden Arten und bei Behandlung dieser letzteren selbst genaue Mittheilungen über alle ihre Eigenschaften bieten werde. — Hier kommt es zunächst nur darauf an, die Merkmale der für den Besitz als wünschenswerth erscheinenden sprachbegabten Papageien im allgemeinen zu überschauen.

Wie bei allen anderen Vögeln, so gibt es auch bei den Papageien zunächst bestimmte Gesundheitskennzeichen, die man beim Einkauf niemals unbeachtet lassen wolle. Jeder Vogel muß frisch und munter aussehen, seine natürliche Lebhaftigkeit und ein glatt und schmuck anliegendes, besonders am Unterleib nicht beschmutztes Gefieder, klare und lebhafte, nicht trübe oder matte Augen, nicht schmutzige, nasse oder verklebte Nasenlöcher und keinen scharf hervortretenden Brustknochen haben; er darf nicht traurig sein, bewegungslos und mit struppigem oder aufgeblähtem Gefieder dasitzen, in der Ruhe nicht kurzathmig erscheinen oder beim Athemholen gar den Schnabel aufsperren und namentlich nicht zeitweise einen schmatzenden Ton hören lassen; abgestoßnes Gefieder, fehlender Schwanz und beschmutzte Federn dagegen sind, besonders bei stürmischen Vögeln, an sich nicht als gefahrbringend anzusehen. Die meisten Papageien zeigen nach der Einführung an einer oder beiden Seiten mehr oder minder arg beschnittene Flügel. Dies ist allerdings ein großer Uebelstand, gegen den wir aber vergeblich ankämpfen, weil nämlich das Flügelverschneiden geschieht, um das Entkommen der Vögel theils schon in der Heimat, theils auf den Schiffen zu verhindern. Bei den großen Sprechern erscheint er umsomehr bedauernswerth, da es einerseits oft jahrelang währt, bis die Stümpfe durch neue Federn ersetzt werden und da andrerseits jeder sehr entfederte Papagei vorzugsweise sorgfältiger und vor allem kenntnißvoller Verpflegung bedarf. Nur

Digitized by Google

dann, wenn ein solcher vollkräftig und wohlbeleibt sich zeigt, mag man ihn ohne Besorgniß kaufen.

Zum befriedigenden Einkauf gibt es sodann verschiedene Wege, doch muß man, gleichviel welchen man einschlagen will, stets aufmerksam und mindestens mit einigen Kenntnissen zuwerke gehen, denn der Handel mit lebenden Thieren hat immer seine Schattenseiten, die nur zu leicht Täuschung, Verdruß und Verleidung der ganzen Liebhaberei bringen können.

Wer bisher erst eine geringe Kenntniß dieser Vögel besitzt und vornehmlich der Erfahrung ermangelt, dürfte am besten daran thun, einen bereits abgerichteten Papagei zu kaufen, mindestens einen solchen, der schon eingewöhnt und wenn möglich halb gezähmt ist. Im erstern Fall kommt freilich der Preis bedeutungsvoll inbetracht, und nur wenn man ohne Bedenken die Ausgabe von hundert Mark und weit darüber nicht zu scheuen braucht, ist es rathsam, einen schon sprechenden Papagei anzuschaffen; denn man erspart sich ja nicht allein die Mühe der Selbstabrichtung und das Wagniß, daß man einen ganz untauglichen oder doch stümperhaften Vogel bekomme, sondern man hat auch nicht zu befürchten, daß der Papagei bei der Eingewöhnung und Abrichtung zugrunde gehe. Nicht außer Acht lassen wolle man bei solchem Einkauf, daß man die volle Gewähr haben muß, man sehe einen entschieden ehrenhaften Verkäufer vor sich; andrerseits wird man immer in die Gefahr gerathen, nur zu arg übervortheilt zu werden. Der Werth eines solchen Sprechers ist ja eigentlich ein durchaus illusorischer; oft hört man die Bemerkung — und schon bei der Indianerin im Urwald hat man es als Thatsache gefunden — daß ein sprechender Papagei geradezu unbezahlbar ist, denn der oder die Besitzerin will ihn eben um keinen Preis fortgeben. Inanbetracht dessen jedoch, daß gut und sachgemäß verpflegte Papageien in der Regel überaus ausdauernd sich zeigen und

Digitized by Google

sehr alt werden und daß also bei dem eingewöhnten Vogel nicht leicht die Gefahr eines Verlusts vorhanden, ferner, daß ein guter Sprecher zu angemeßnem Preise jederzeit wieder unschwer zu verwerthen ist, kann ich vom Ankauf eines solchen nicht abrathen. Dabei ist eigentlich nur folgendes zu berücksichtigen. Zunächst lasse man sich von dem Verkäufer möglichst genaue Angaben darüber machen, was der Vogel leisten kann; man verlange solche in gewissenhafter Weise und bedinge ausdrücklich, daß dieselben lieber zu wenig als zu viel besagen. Noch nothwendiger ist es, daß der Verkäufer eingehende Auskunft über die bisherige Verpflegung, bzl. Fütterung und Haltung ertheile. Dies sollte man übrigens beim Ankauf eines jeden Vogels überhaupt als Regel festhalten.

Vortheilhafter ist es unter Umständen allerdings, wenn man einen ganz rohen oder doch erst wenig abgerichteten Papagei einkauft, um die Unterrichtung, bzl. weitre Fortbildung selbst zu übernehmen. Der billige Preis macht dann ja auch das Wagniß, daß man einen kranken Vogel erhalten könne, der trotz sorgsamster Pflege vielleicht eingeht oder daß er ein störrischer, kaum oder garnicht gelehriger alter Schreier sei, nicht zu schwer. Wer die Gelegenheit dazu findet und in der Kenntniß dieser Vögel schon einigermaßen bewandert ist, thut am besten daran, sich beim Händler den Jako selber auszusuchen. Andernfalls muß man sich auf die Redlichkeit des Verkäufers verlassen. Der erstre Fall bedingt freilich einigermaßen starke Nerven, denn man muß das Gekreisch, welches die je in einem Kasten zu 8—20 Köpfen beisammen steckenden Grauen ausstoßen, selber gehört haben, um es würdigen zu können, welch' hoher Grad von Liebhaberei dazu erforderlich ist, daß sich ein Neuling nicht ein- für allemal abschrecken lasse. Zur Behandlung, Verpflegung und Abrichtung eines solchen rohen Vogels bedarf es aber, wie

Digitized by Google

bereits gesagt, Erfahrungen, bei deren Mangel man sich nur zu leicht Verdrießlichkeiten und Verlust aussetzt. Vor allem ist auch hier Kenntniß der bisherigen Verpflegung nothwendig. Wenn die meistens noch sehr jugendlichen Papageien soeben all' die Beschwerden und Gefahren der Reise durchgemacht haben, nun einen harten Kampf ums Dasein in der Gewöhnung an das rauhe Klima, die veränderte Ernährung und ganz andre, sie gewöhnlich nur zu sehr beängstigende Behandlung durchmachen müssen, wenn sie dabei weder vor Zugluft, noch Temperaturwechsel und anderen schädlichen Einflüssen genügend geschützt werden und sich dennoch erhalten, so liegt darin wol der Beweis dafür, daß sie eine außerordentliche, staunenswerthe Lebenskraft haben. Erklärlicherweise geht dabei doch manch' einer zugrunde, und um dies zu vermeiden, beachte man vornehmlich die goldne Regel, daß jeder Vogel, wie jedes Thier überhaupt, bei allmäligem Uebergang sich von einem Nahrungsmittel zum andern unschwer und gefahrlos überführen läßt, während ihm jeder plötzliche Wechsel fast immer Verderben bringt. Man verpflege ihn also in der ersten Zeit genau nach den Angaben des Verkäufers und gewöhne ihn dann, je nach seinem Befinden, vielleicht erst nach Wochen, an die zuträglicheren Futtermittel, die ich weiterhin angeben werde, und zwar auf dem Wege, daß man nach und nach die Gabe des bisherigen Futters verringert und von dem neuen entsprechend hinzugibt. Im Nothfall muß man die Annahme des letztern durch Hunger zu erreichen suchen. Vortreffliche Dienste leistet bei solchem Wechsel das Beispiel eines bereits längst eingewöhnten Genossen, den man neben den Angekommenen bringt.

Bei jedem Handel mit lebenden Thieren lassen sich einerseits Selbsttäuschungen nur schwer vermeiden und herrschen andrerseits mehr als sonstwo Unredlichkeiten. Es ist eine

Digitized by Google

trübselige, jedoch leider unumstößliche Thatsache, daß hier nur zu oft Einer den Andern zu übervortheilen sucht und daß man wirkliche oder vermeintliche, unabsichtliche oder geplante Unredlichkeiten hier selbst bei sonst durchaus achtungswerthen Leuten vor sich sieht. Wer einen lieb gewordnen Vogel besitzt, ein talentvolles Thier wol gar nach vielen Fehlschlägen endlich erlangt hat, täuscht sich leicht selber, und wenn solch' Vogel ein oder einige Worte wirklich inne hat, so hält man ihn wol bereits für einen ausgezeichneten Sprecher und gibt ihn auch in voller Ueberzeugung dafür aus. Nun treten vielleicht Verhältnisse ein, die den Verkauf nothwendig oder doch wünschenswerth machen — und dann wird in harmloser Weise beweitem mehr versprochen als die Thatsächlichkeit ergibt. Im Gegensatz dazu wiegt sich ebenso jeder Käufer in Illusionen; er will einen vorzüglichen Vogel erlangen, dagegen einen möglichst geringen Preis zahlen. So sind gegenseitige Täuschungen und damit Zank und Streit unausbleiblich. Unleugbar aber haben wir hier auch recht viele Menschen vor uns, welche in unverantwortlicher Weise auf die Einfalt und Leichtgläubigkeit Anderer spekuliren und den sprechenden Papagei weit über sein Können und seinen Werth hinaus anpreisen und verkaufen; ja, schließlich kommen Fälle von harsträubendem Betrug vor, indem noch ganz rohe oder alte unbegabte Vögel als vorzügliche Sprecher verkauft werden.

Ein weitrer großer Uebelstand, den man unter Umständen geradezu als Unfug bezeichnen kann, tritt uns in den sog. ‚akklimatisirten' Vögeln entgegen. Unter dieser Bezeichnung werden vielfach Papageien ausgeboten, von denen die unerfahrenen Käufer glauben sollen und auch wirklich vielfach sich überzeugt halten, daß sie die beste Gewähr guter Beschaffenheit in jeder Hinsicht bieten. Nun ist es aber erstaunlich, wie weit ausdehnbar der Begriff ‚akklimatisirt' ist oder

Digitized by Google

doch ausgedehnt wird. Streng genommen kann man als einen akklimatisirten Vogel nur einen solchen ansehen, der sich nicht allein völlig eingebürgert und mindestens bereits eine Mauser überstanden hat, sondern der auch in seinem Aeußern, also in voller Befiederung, und überhaupt nach allen Gesundheitszeichen hin tadellos erscheint, vor allem jedoch hinsichtlich der Fütterung und Verpflegung vollkommen eingewöhnt ist. Die Verkäufer, insbesondre die Händler, bezeichnen im Gegensatz dazu jeden Papagei schon als akklimatisirt, der sich nur einigermaßen an das veränderte Klima und die neue Fütterung gewöhnt und einige Monate oder wol gar nur einige Wochen erhalten hat, gleichviel wie sein Aeußeres beschaffen sei. Jeder geringste Zufall, insbesondre die Beschwerden der Reise, können dann aber Erkrankung und Tod herbeiführen — und die Gewähr der Garantie solcher ‚Akklimatisirung' ist also nichts andres als eine lere Redensart.

Der nächste Punkt, welcher gleichfalls zu Streitigkeiten und noch dazu unnöthigerweise führt, liegt in der mangelnden Kenntniß und Geduld seitens des Käufers begründet. Selbst bei einem vorzüglichen, hoch begabten und gut abgerichteten Papagei muß man darauf gefaßt sein, daß er in den ersten Tagen, manchmal selbst Wochen, nichts hören läßt. Man wolle bedenken, daß jeder derartige Vogel nur dann spricht, bzl. seine Kenntnisse nach jeder Richtung hin zur Geltung bringt, wenn er sich einerseits körperlich durchaus wohl und andrerseits sicher und behaglich fühlt. Darin liegt ja eben ein Beweis für die hohe Begabung eines solchen Thiers, daß es mit scharfer Beobachtung die Verhältnisse ermißt, sich nur allmälig in die neue Lage findet und dann erst in derselben wohlfühlt. Ich bitte weiterhin in dem Abschnitt über Zähmung und Abrichtung Näheres hierüber nachzulesen.

Die Versendung aller Papageien im Großhandel

Digitized by Google

geschieht in Holzkisten, welche nur an der vordern Seite vergittert sind. In der Regel zeigen sie die bekannte praktische Einrichtung, daß die vordre vergitterte Seite zugleich abgeschrägt ist, sodaß man sehen kann, wohin das Futter gestreut wird, während die scheuen Vögel sich in den Hintergrund zurückziehen; die Thür befindet sich entweder vorn im Gitter oder in der Hinterwand und ist gewöhnlich nur so groß, daß man den Vogel gerade hindurch bekommt. Besondere Futtergefäße sind in der Regel nicht vorhanden, sondern das Futter wird einfach auf den Boden geworfen. Wasser bekommen die großen Papageien ja, wie schon gesagt, meistens leider garnicht oder es wird ihnen nur ein- bis zweimal täglich in irdenen Töpfen hineingereicht. In den Käfigen der kleinen und kleinsten Arten hängen meistens einfache Kruken oder Töpfe, die leider fast immer fest angebracht sind, während der ganzen Reise also nicht gereinigt werden können. Die meisten Käfige sind auch nicht einmal mit einer Vorrichtung zum Reinigen ausgestattet und so bleiben denn Schmutz, Hülsen und andere Abgänge sowie die Entlerungen faulend auf dem Boden liegen und verpesten die Luft. Neuerdings sind namentlich die von den Großhändlern mitgegebenen Ueberfuhr-Käfige so eingerichtet, daß in der Vorderwand dicht über dem Fußboden eine bewegliche, etwa 2—3 cm hohe Leiste sich befindet, bei deren Oeffnung der Unrath vermittelst eines eisernen Hackens täglich herausgekratzt wird. Fräulein Christiane Hagenbeck u. A. geben ihren Aufkäufern zerlegbare und überhaupt sehr praktisch eingerichtete Kistenkäfige mit — und so darf ich mit Freuden darauf hinweisen, daß sich vielfach das ernste Streben zeigt, die S. 11 ff. geschilderten Uebelstände abzustellen oder doch zu mildern. Freilich bleibt leider immer noch gar viel in dieser Hinsicht zu wünschen übrig.

Zum Versandt im Binnenlande, sei es seitens der

Digitized by Google

Händler an die Liebhaber oder der letzteren an einander, sind Käfige im allgemeinen Gebrauch, die für diesen Zweck recht praktisch, im übrigen aber sehr roh erscheinen. Ein solcher besteht in einem einfachen langgestreckten Holzkasten, dessen Vorderseite an der obern Hälfte vergittert und für die großen, sowie für alle stark nagenden Papageien überhaupt in der Regel mit dünnem Blech innen fest ausgeschlagen ist; die Oberseite schrägt sich, der Gestalt des Vogels entsprechend, nach hinten zu ab, sodaß die Hinterwand nur etwa zwei Drittel von der Höhe der Vorderwand beträgt. Entweder die Oberwand oder die Hinterwand bilden einen einschiebbaren Deckel, bzl. die Thür, zu welcher der Vogel hineingebracht und herausgenommen wird. Vorn unterhalb des Gitters haben diese Kasten einen durch Holzleiste oder Brettchen vom Boden abgetheilten Raum für das Futter und etwas weiter hinten eine unmittelbar über dem Boden befindliche dicke Sitzstange; meistens enthalten sie kein Wassergefäß und oft genug fehlt auch die Futter- und Sitzvorrichtung. Man nimmt mit Recht an, daß ein Papagei auf kürzeren Reisen von 1 bis 3 Tagen dursten kann, ohne Schaden zu leiden, während im Gegensatz dazu ein Wassergefäß ihm verderblich werden kann, denn bei kühler unfreundlicher Witterung zieht das beim Fahren überspritzende Wasser ihm leicht Erkältung, bzl. Erkrankungen zu. Man sucht dies bekanntlich durch einen Schwamm zu verhindern, allein derselbe wird von dem Papagei in der Regel herausgezupft und näßt ihn dann erstrecht oder wird von ihm verschlungen und bringt ihm im letztern Fall noch üblere Erkrankung. Englische Händler füllen das Trinkgefäß mit in Wasser erweichtem Weißbrot an, doch auch dies ist kein gutes Verfahren, denn dasselbe säuert und verursacht Durchfall und andere Krankheiten. Die neuerdings vielfach gebrauchten pneumatischen Trinkgefäße dürften, wenn sie ganz von Metall, Zink

Digitized by Google

oder verzinntem Eisenblech sind, für Papageien bei weiter Versendung empfehlenswerth sein; doch muß dann der Käfig eine bedeutendere Größe als die gebräuchlichen haben, damit sich solch' Gefäß darin unterbringen läßt, ohne den Vogel zu sehr zu beengen; je weiter die Reise, desto mehr Raum ist überhaupt nothwendig. Bei kurzen Entfernungen ist es am besten, wenn das Wasser, wie erwähnt, ganz fortbleibt. Zur Versendung in kalter Jahreszeit werden von den Käfigfabriken besondere Winter-Versandtbauer hergestellt, welche in einem Doppelkasten mit drahtvergittertem Fenster an dem Außenkäfig bestehen, während der innere ein gewöhnlicher Versandtkäfig ist.

Empfang. Für jeden bestellten, bzl. erwarteten Papagei halte man den Wohnkäfig oder Ständer bereit, damit er nach der Ankunft nicht mehr lange im Versandtkasten zu bleiben braucht. Mit dem Herausnehmen aus dem letztern und Ein- oder Aufbringen in oder auf den erstern sei man nun aber besonders vorsichtig. Wenn es irgend möglich ist, vermeide man dabei die Anwendung von Gewaltmaßregeln, und geht es ohne solche durchaus nicht, so lasse man sie entschieden von einem Fremden ausführen — eingedenk dessen, daß der Papagei dergleichen niemals oder doch für lange Zeit nicht vergißt und gegen den, der ihm derartige vermeintliche Unbill zugefügt hat, stets scheu und ängstlich oder mißtrauisch bleibt.

In der Ankunft vieler, ja der meisten großen Papageien liegt von vornherein eine arge Enttäuschung für den Empfänger, insbesondre wenn derselbe noch garkeine Kenntniß von dem Wesen und Benehmen eines solchen Vogels hat. Da kommt der sehnlichst erwartete Graupapagei mit der Post an — und jagt das ganze Haus in Entsetzen, denn er schreit „wie ein gestochnes Schwein" und läßt sich garnicht beruhigen und weder durch Sanftmuth noch durch Strenge stillen; er

Digitized by Google

zeigt sich eben als ein wildes, ungeberdiges, ungeschlachtes Vieh, welches keinerlei Besänftigungsmitteln zugänglich ist. Dadurch ließ sich schon manch' ein Liebhaber die Freude für immer verderben und nur der Sachverständige weiß es zu ermessen, daß gerade dieser Vogel die Aussicht auf besten Erfolg gewährt, weil er die vorzüglichsten Anlagen ergibt. Als allererste Wahrheit wolle man beachten und daran festhalten, daß das Wort „aller Anfang ist schwer" wie überall, so namentlich hier bei der Papageienliebhaberei zur vollen Geltung kommt, daß aber auch kaum irgend wo anders den ersten Widerwärtigkeiten so große Freude an herrlichen Erfolgen entsprießen kann, als gerade bei ihr.

Sobald man in den Empfang-, bzl. Wohnkäfig Futter und Wasser gegeben, stellt man vor seine geöffnete Thür, bzl. in ihn hinein den gleichfalls aufgemachten Versandtkasten, sodaß der Vogel von selber ohne jeden Zwang aus diesem heraus und in jenen hineingehen mag, und wartet geduldig, selbst wenn es, wie dies zuweilen vorkommt, auch ziemlich lange dauert. Ist der Papagei so scheu und zugleich störrisch, daß er nicht freiwillig den Kasten verläßt, so muß man ihn, wie schon gesagt, von einer fremden, doch durchaus zuverlässigen Person herausgreifen lassen. Der Betreffende muß sich, nachdem er auf beide Hände starke, am besten wildlederne Handschuhe gezogen, die rechte Hand mit einem derben Leinentuch umwickeln und dann dreist und rasch, den Papagei hinterrücks über den Kopf und das Genick fassen, sodaß derselbe nicht beißen kann. Letzteres muß mit Geschick und Vorsicht geschehen, damit das werthvolle Thier dabei keinenfalls beschädigt werde. Mit der linken Hand schiebt man ihn nun sofort ohne weitern Aufenthalt in den Wohnkäfig hinein, verschließt dessen Thür und überläßt den Papagei für möglichst lange Zeit völlig sich selber.

Will man ihn anstatt im Käfige lieber auf einem Bügel

Digitized by Google

oder Ständer halten, so dürfte es am rathsamsten sein, daß jeder unerfahrne Liebhaber schon bei der Bestellung den Händler bittet, dem Vogel Ring und Kette anzulegen. Muß man letztres selber ausführen, so ergreift man den Vogel oder läßt ihn wie vorhin angegeben ergreifen, jedoch zugleich ihm den Schnabel zuhalten oder den Kopf mit einem losen Tuch verhüllen, dann zieht man am besten den linken Fuß vor und schraubt den bereits geöffneten Ring daran fest, während das andre Ende der Kette schon am Ständer befestigt sein muß. Beim Loslassen aber, sowie bei jeder Annäherung späterhin, sei man recht vorsichtig, damit der Papagei nicht in blinder Angst und Hast plötzlich fortspringe, sich hinabstürze und den Fuß breche oder ausrenke.

Die kleinen langschwänzigen Papageien oder Sittiche, sowie auch die kleineren Kurzschwänze verursachen nicht so viele Mühe; man läßt sie einfach ganz von selber aus dem Versandtkäfig hervorkommen und in den Wohnkäfig gehen, sobald sie nämlich der Hunger dazu treibt. Auf Ständer oder Bügel werden sie nur selten oder kaum gehalten.

Nun kann es manchmal gar lange dauern, bis der durch das Herausgreifen beim Händler, Einsetzen in den Kasten und die Versendung im engen Raum nur zu sehr verschüchterte Papagei endlich soviel Ruhe zu gewinnen und Muth zu fassen vermag, daß er nicht mehr bei jeder Annäherung, namentlich aber beim Füttern und Reinigen des Käfigs, davonzukommen sucht und das ohrenzerreißende Geschrei ausstößt; bei manchem währt es wochenlang, ehe er ganz allmälig sich beruhigt, verständig, zutraulich und dann auch bald gelehrig sich zeigt.

Hat man einen rohen Papagei vor sich, der noch ganz wild und unbändig ist, so sollte man ihn zunächst weder sogleich in den geräumigen Wohnkäfig, noch an die Kette auf

Digitized by Google

den Ständer bringen. Im erstern Fall wird seine Eingewöhnung sehr verzögert und im andern kommt er nur zu leicht in die Gefahr, bei Erschrecken oder Beängstigung sich plötzlich hinabzustürzen und wie oben gesagt zu beschädigen. Man setzt ihn vielmehr zunächst in einen Empfangskäfig und beherbergt ihn in demselben, je nach dem Fortschreiten seiner Eingewöhnung, bzl. Zähmung, vier bis sechs Wochen. Dieser letzterwähnte Käfig muß ebenso wie der, welchen ich weiterhin als Wohnkäfig beschreiben werde, gestaltet und eingerichtet sein, nur mit dem Unterschiede, daß er um die Hälfte oder doch um ein Drittel kleiner als jener ist.

Die Wohnungen.

Wenn der Käfig für jeden Vogel bedeutungsvoll erscheint, so ist dies doch bei den Angehörigen keiner andern Familie in dem Maße der Fall wie bei den Papageien. Diesen Erfahrungssatz, welchen ich in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" IV. (‚Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht') aufgestellt, muß ich hier mit besonderm Nachdruck wiederholen, denn er kommt bei den einzeln als Sprecher gehaltenen Papageien mehr als bei irgendwelchen anderen Vögeln zur Geltung.

Selbst der völlig eingewöhnte, gut geartete und vorzüglich abgerichtete Sprecher wird nur zu leicht verstimmt und aufgeregt, wol gar krank, wenn er seine Behausung wechseln muß und wenn die neue noch dazu irgendwie sein Mißfallen erregt; im Gegensatz dazu gewöhnt ein frisch angeschaffter Papagei sich beiweitem schwerer ein, zeigt sich der Zähmung und Abrichtung

Digitized by Google

viel schwieriger zugänglich, wenn ihm nicht eine in jeder Beziehung behagliche Wohnung geboten ist.

Ein guter Papageienkäfig soll folgenden Anforderungen durchaus genügen: 1. er muß ausreichenden Raum gewähren, sodaß der Vogel sich, wie ich weiterhin näher erörtern werde, die nothwendige Bewegung machen kann; 2. seine Gestalt ist am besten eine einfach viereckige, oben sanft gewölbte, ohne alle Ausbuchtungen, Schnörkeleien und dergleichen Verzierungen; 3. der Käfig sollte eigentlich für jeden Papagei, insbesondre aber muß er für jeden großen, völlig aus Metall hergestellt sein.

Als die gebräuchlichste Form des Käfigs für den einzelnen Sprecher sieht man einen einfachen viereckigen, auch oben nicht gewölbten, sondern flachen und nur an den Seiten zugerundeten Kasten aus starkem verzinnten Eisendraht, meistens noch mit hölzernem Sockel und über dem Fußboden in der Höhe des letztern mit einem Gitter, gleichfalls aus starkem Draht. Dieser Käfig hat aber mancherlei Mängel. Zunächst ist er in der Regel zu klein, sodann müssen die Futter- und Trinkgefäße gewöhnlich innen angehakt werden, was bei einem bissigen Papagei recht mißlich ist, schließlich sind Drahtnetz und Sockel nebst Schublade, letztere beiden nämlich gewöhnlich aus Holz, nichts weniger als zweckmäßig. Der Verein „Ornis" in Berlin ließ zur Beherbergung der Papageien auf seinen Ausstellungen Bauer anfertigen, welche ich als Musterkäfige (s. umstehende Abbildung) bezeichnen kann. Ein solcher bietet vollen Raum zur Bewegung, denn er hat 75 cm Höhe und je 43 cm Länge und Tiefe, für den Graupapagei, die Amazonen, Kakadus und alle Papageien in solcher Größe, während er natürlich für größere bis zu den Araras hinauf im Umfang entsprechend erweitert und für kleinere bis zu den Schmalschnabelsittichen und selbst bis zum Wellensittich hinab, verengert werden muß. Sein Obergestell ist aus 4 mm starkem, verzinnten Draht in 3 cm Weite,

Digitized by Google

Sockel, Schublade und Unterboden sind aus verzinntem Eisenblech hergestellt; der letztre kann der bequemern Reinigung halber auch in einem Drahtgitter bestehen. Das erwähnte Drahtgitter oberhalb des Fußbodens ist hier ganz fortgeblieben, zunächst weil sich der Vogel daran die Beine zerbrechen kann,

sodann weil sich der Schmutz darauf in häßlicher Weise festsetzt, hauptsächlich aber, weil jeder Papagei das Bedürfniß fühlt, sich hin und wieder auf dem Fußboden auszustrecken und im Sande zu baden. Die Blechschublade muß daher auch leicht ein- und auszuschieben sein, sodaß die Entlerungen täglich fortgekratzt werden können, worauf der Boden wieder mit trocknem, reinem

Digitized by Google

Sand beſtreut wird. Die ſo leicht gehende Schublade muß von außen durch Klammern oder ſtarke Häkchen befeſtigt werden, damit ſie der muthwillige Papagei nicht aufſchieben kann. Der Sockel ſoll immer recht hoch, mindeſtens 7 cm breit ſein, weil ſonſt der Papagei durch Herausſcharren von Sand u. a. das Zimmer ſehr verunreinigen kann. Die Thür muß ſo weit ſein, daß man den Vogel bequem hineinbringen und herausnehmen kann, alſo etwa 16—17 cm im Geviert. Meiſtens hat man ſie von oben herabfallend, da dies aber recht unbequem iſt, ſo kann ſie auch ſeitwärts zu öffnen ſein; in jedem Fall muß ſie vermittelſt eines tief einzuſchiebenden Hakens oder einer federnden Klammer unbedingt ſicher ſich verſchließen laſſen. Faſt jeder Papagei, insbeſondre jeder große, beſchäftigt ſich, ſei es aus Langweil, Uebermuth oder Bösartigkeit, angelegentlich damit, Alles was nicht feſt und ſicher im Käfig iſt, loszubrechen und alſo vornehmlich den Thürverſchluß zu ſprengen. Großer Sorgfalt bedarf die Sitzſtange. Damit ſie nicht zernagt würde, hatte man ſie früher mit dünnem Eiſenblech beſchlagen, dies verurſachte jedoch dem Vogel Pein, denn einerſeits wurde ſie bald ſo glatt, daß er ſich nur mit Mühe darauf halten konnte, nachts oft herabfiel und von der fortwährenden Anſtrengung ſehr litt, andrerſeits bekam er durch den Druck auf dem harten Metall leicht Hühneraugen oder Geſchwürchen in die Fußſohlen und dritterſeits verurſachte ihm daſſelbe als guter Wärmeleiter Erkältungen der Füße oder des Unterleibs und dadurch Krankheiten. In zweckmäßiger Weiſe wird jetzt an jeder Seite des Käfigs unterhalb des Futter- und Trinkgefäßes je ein eiſerner Ring oder eine Hülſe von ſtarkem Blech angebracht und darin die Stange feſtgeklemmt. Man wählt am beſten ein 3 bis 3,5 cm dickes friſches Aſtſtück noch mit voller Rinde von nicht zu hartem Holz, und ſobald daſſelbe zernagt iſt, kann es unſchwer

Digitized by Google

durch ein neues ersetzt werden. Falls man eine entrindete Stange nimmt, darf dieselbe nicht zu glatt gehobelt, sondern sie muß etwas rauh sein. An den Futter- und Trinkgefäßen hat man neuerdings eine zweckmäßige Vorrichtung angebracht, einen aufgelötheten gewölbten Mantel nämlich, welcher das Futter so umgibt, daß der Papagei die Sämereien u. drgl. nicht wie bei den offenen Gefäßen herausstreuen und verschleudern, bzl. das Wasser verspritzen kann. So werden sie eingeschoben und hinter jedem befindet sich eine auf- und niedergehende Gitterthür, welche verhindert, daß der Vogel entkomme, wenn Futter und Wasser gewechselt werden. — Ein völlig entsprechender Papageienkäfig sollte einer Vorrichtung nicht ermangeln, die ich für ganz besonders wichtig ansehe, nämlich einer kurzen bequemen Sitzstange oberhalb des Bauers, zu welcher der herausgelaßne Papagei emporklettern, sich darauf setzen und bequem die Flügel ausschwingen kann. Als Uebelstand ergibt sich freilich, daß er von hier aus das Käfiggitter verunreinigt; entweder muß das letztre dann stets sogleich wieder geputzt werden oder man sollte auf dem Käfigdach, unterhalb des etwas erhöhten Sitzes, eine entsprechende Schublade mit Sand anbringen. — Die noch vielfach gebräuchliche Schaukel im Käfig halte ich nicht allein für überflüssig, sondern sogar für schädlich, weil sie den Papagei in der Bequemlichkeit stört, namentlich aber ihm den zum Flügelschwenken nöthigen Raum beengt.

Die Käfige für die kleineren und kleinsten einzeln als Sprecher gehaltenen Papageien — und zwar von den Alexandersittichen herab bis zum Wellensittich — sollten in ganz gleicher Einrichtung wie der Musterkäfig des Vereins „Ornis" hergestellt werden, nur mit dem Unterschied, daß, je kleiner der Vogel, um so leichter auch das Drahtgestell, um so enger das Drahtgitter, um so dünner der Draht

Digitized by Google

sein muß und daß bei den nicht nagenden Arten Sockel und Schublade von Holz gefertigt sein können, weil die Papageien bekanntlich zu den Vögeln gehören, die nicht arg schmutzen; andrerseits freilich macht die Holzschublade Schwierigkeit beim Baden, und man muß daher stets unterhalb derselben anstatt des Bodens ein enges Drahtgitter haben, auf welches das Badegefäß gesetzt, während die Schublade herausgenommen wird; die Auszugsöffnung der Schublade muß dann zugleich mittelst einer herabfallenden Klappe verschließbar sein. Bei diesen Käfigen ist es auch besser, wenn die Thür von oben herab, an den Drahtstäben gehend, zufällt. Die in solchen Käfig einzustellenden Trink- und Futtergefäße sollten immer nur von Glas oder Porzellan sein. Als Badenäpfe für alle Papageien eignen sich am besten die gewöhnlichen bekannten Blumentopf-Untersätze von Steingut oder besser von Porzellan, im letztern Fall ein gewöhnlicher Spucknapf. Da diese Papageien nicht blos klettern, sondern meistens auch gern fliegen und hüpfen, so muß der Käfig drei Sitzstangen und zwar eine hoch oben und zwei in der Mitte haben.

Viele Liebhaber wünschen, daß der sprechende Vogel zugleich als ein Schmuck in der Häuslichkeit zur Geltung komme und geben ihm also einen so prachtvollen Käfig als möglich. Daher sieht man denn die vielen durchaus unpraktischen runden zylinder-, kegel- oder thurmförmigen Bauer von Messingblech oder -Draht. Abgesehen davon aber, daß solche Käfige von vornherein den Vogel beengen, ihm wenigstens keinenfalls ausreichenden Raum und einen bequemen Aufenthalt gewähren, bergen sie auch noch arge Gefahren. Zunächst setzt dieses Metall bekanntlich, wenn es nicht stets aufs sorgsamste trocken und blank gehalten wird, Grünspan an und sodann bedrohen die Putzmittel Gesundheit und Leben des Vogels. Der Käfig aus verzinntem, ver-

Digitized by Google

zinktem oder sonstwie metallisch überzognen Eisendraht kann ja gleichfalls als ein hübscher Schmuck des Zimmers betrachtet und gewünschtenfalls in beliebiger Weise angestrichen werden. Sorgsam zu beachten ist freilich, daß es ein schnell und hart trocknender Lackanstrich sein muß und daß der Vogel nicht eher in den Käfig gebracht werden darf, als bis die selbstverständlich durchaus giftfreie Farbe vollkommen getrocknet ist. Neuerdings hat man auch einen farblosen Lack im Gebrauch, mit welchem man das blanke trockne Messing überzieht und der dann so hart antrocknet, daß der Papageienschnabel den dünnen Anstrich nicht loszuknabbern vermag, während das Messing nicht Grünspan ansetzen kann. Geht man von der naturwidrigen runden Form ab und läßt den Käfig in der Gestalt des „Ornis"-Bauers oder sonstwie zweckmäßig anfertigen, so darf man immerhin Messing dazu wählen. Hat man dieses Metall aber ohne Lackanstrich und muß der Käfig geputzt werden, so ist der Papagei während dessen jedesmal herauszunehmen und nicht eher wieder hineinzubringen als bis das geputzte Gitter vermittelst eines weichen leinenen Tuchs durchaus rein und trocken gerieben ist; die meisten Putzmittel, so namentlich die sog. Zuckersäure, sind sehr giftig.

Manche Liebhaber ziehen es vor, den Papagei, anstatt in dem Käfig, frei auf einem Ständer, im Ring oder Bügel zu beherbergen. Die bisher vorhandenen Vorrichtungen dieser Art sind leider fast sämmtlich ebenso unpraktisch und untauglich wie manche Käfige; auch sie können in der Regel nur als Luxusgegenstand gelten. Man sieht sie in verschiedner Einrichtung und die schlimmsten von ihnen sind ganz, selbst mit Einschluß der Sitzstange, aus Metall oder von härtestem polirten Holz angefertigt. Es sei vorausgeschickt, daß man inbetreff der Sitzstangen immer das S. 31 bereits Gesagte

Digitized by Google

beherzigen möge und daß sie namentlich leicht zu erneuern sein müssen.

Der einfachste Papageienständer ist ein Gestell etwa von Manneshöhe, eine Säule aus hartem polirten Holz, oben mit einem Knauf und unten oberhalb des Fußes mit einer 66 cm langen und 50 cm breiten Vorrichtung, in welcher sich eine leicht ausziehbare Schublade mit voll Sand bestreutem Boden, gleichwie im Käfige, befindet, an der zu beiden Seiten Futter- und Wassergefäß angebracht sein können, während an der Säule hinauf treppenartig eingesteckte etwa 15 cm lange Kletterstangen bis zu der eigentlichen etwa 50 cm langen obersten Sitzstange führen, welche letztre nicht zu hoch, sondern noch unterhalb des menschlichen Auges durch die Säule gesteckt sein muß und an deren beiden Enden man wol zweckmäßiger als unten Futter- und Wassergefäß haben kann. Immer müssen die Gefäße aber durchaus sicher befestigt werden können, weil der Papagei hier, wo er frei sitzt, sich noch viel angelegentlicher mit ihnen beschäftigt. Am zweckentsprechendsten sind sie so eingerichtet, daß sie schubladenartig in eine oben offne Blechkapsel geschoben werden, deren hervorstehende und nach innen gebogene starke Ränder sie festhalten.

Häufiger als den vorigen findet man den Papageienständer mit Bügel oder Ring. (S. die Abbildung). Er ist in der Regel ganz aus Metall angefertigt, mit alleiniger Ausnahme der Sitzstange. Hinsichtlich des Materials, sowie der Gestalt kann hier ja ganz Geschmack und Belieben walten, wenn er nur zwei Hauptbedingungen erfüllt, einerseits, daß der Bügel geräumig, der Größe des Vogels entsprechend ist und andrerseits, daß er gleichfalls unterhalb des Sitzes eine Schubladenvorrichtung hat. Die Papageienständer, welche diesen beiden Anforderungen nicht genügen, schließe ich von vornherein als unbrauchbar aus. Solche luxuriösen Ständer,

Digitized by Google



die anstatt derer wol gar mit Goldfischglocke und Schmuckkäfig für einen kleinern Vogel ausgestattet sind, können nichts weniger als Behaglichkeit für die Bewohner bieten, sondern bergen im Gegentheil Thierquälerei. Der Bügel muß für einen Papagei in der Größe des Jako eine etwa 60 cm lange Sitzstange haben und in der Rundung etwa 50 cm hoch sein. An den Seiten befinden sich Futter und Wassergefäß und inbetreff dieser sowie der Sitzstange selbst gilt das bereits Gesagte. Als Erfordernisse, welche bei diesem Papageienständer meistens versäumt werden, und die ich doch als durchaus nothwendig ansehen muß, nenne ich folgende: Zunächst sollte solch' Ständer immer eine Kletter vorrichtung haben, an welcher der Vogel zur Schublade herabgelassen werde,

Digitized by Google

sodaß er täglich mindestens eine Stunde im Sande paddeln und damit, wie ich weiterhin näher angeben werde, ein nothwendiges Bedürfniß befriedigen kann. Fehlt eine derartige Einrichtung, so ist der Vogel sehr elend daran und es ist auch keineswegs ausreichend, wenn er oberhalb des Bügels noch einen besondern festen Sitz hat, während ich diesen letztern allerdings für alle Fälle, selbst wenn der Bügel auch garnicht einmal so sehr lose hängt, daß er bei der geringsten Bewegung in Schwingungen versetzt wird, als entschieden unentbehrlich erachte. Immerhin fehlt hier die naturgemäße Bewegung des Kletterns und man sollte bei Anbringung der obersten Sitzstange darauf Bedacht nehmen, ihm dieselbe, wenigstens soweit es thunlich ist, zu verschaffen. Der Papageienständer, welchen die nebenstehende Abbildung zeigt, ist so eingerichtet, daß er vermittelst der beiden Schrauben tief genug herabgelassen, bzl. in den Fuß hinuntergesenkt werden kann, um dem Vogel das Erreichen der Schublade mit dem Sand zu ermöglichen. Man kann die Kette, namentlich wenn sie aus leichtem Metall hergestellt worden, auch noch um die Hälfte länger geben, damit der Papagei keinenfalls behindert werde, den ganzen Raum des Untersatzes, bzl. der Schublade, zu betreten. Dieser Ständer hat keinen besondern obern Sitz. Will der Vogel klettern und ist die Kette lang genug, so kann er ja immerhin die obre Rundung des Ständers erklimmen; die Kette muß dann aber nicht allein lang genug sein, sondern auch in der Mitte ein drehbares Glied haben, damit sie dem Vogel jede Bewegung gestatte und sich nicht verwickle. Auf der Rundung oben am Ständer kann dann wol zeitweise ein Sitzholz fest angeschroben werden und schließlich ist die Kette so einzurichten, daß sie, wenn der Papagei wieder ruhig im Bügel sitzt, zur Hälfte eingehakt wird, damit der Fuß nicht fortwährend die ganze Last zu tragen hat.

Digitized by Google

Nach Ermessen muß man den Bügel abnehmen und im Freien an einen Baumast aufhängen können; am Ständerhaken aber müßte sich stets eine Feder oder dergleichen befinden, welche es verhindert, daß der Papagei gelegentlich den Bügel selber loslöse und mit ihm herabfalle.

Zu den wichtigsten, zugleich aber am meisten Schwierigkeit verursachenden Dingen gehört die Fußkette nebst Fußring, vermittelst derer der Papagei an Ständer oder Bügel gefesselt wird. Alle bis jetzt im Handel vorkommenden Papageienketten sind durchaus unzweckmäßig, denn vor allem ist die Wahl des Metalls für dieselben mißlich. Kupfer, Messing, Neusilber u. a. werden durch Grünspananfatz leicht gefährlich und sind fast ebenso wie das Eisen zu schwer, sodaß solche Kette durch ihre zu große Last an einem Fuß dem Vogel Pein macht. Das neuerdings vorgeschlagne Aluminium leistet dem Schnabel zu geringen Widerstand und würde sich von demselben wie mit einer Kneifzange durchschneiden lassen. Zwischen diesen Klippen aber scheitert auch die Verwendung aller übrigen Metalle. Noch übler sieht es inbetreff des Fußrings aus, denn entweder drückt er mit harter Kante an der Stelle, wo er fest aufliegt, d. h. an der Seite, wo die Kette herunterhängt, den Fuß und bringt schmerzhafte Hautverhärtungen hervor oder er reibt wenigstens wund; sodann jedoch vermag der Verschluß des Rings der rastlosen Gewaltthätigkeit und förmlichen Kunstfertigkeit des Papageienschnabels nicht zu widerstehen. Der Vogel, wenn er nicht bereits völlig an den Ständer gewöhnt ist, macht sich dann über kurz oder lang doch einmal los und kann allerlei Unfug im Zimmer anrichten oder wol gar auf Nimmerwiedersehen entkommen. Es bleibt mir hier nichts weiter übrig, als die Aufforderung, welche ich in meinem bereits mehrmals erwähnten Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht an die Sachverständigen auf diesem Ge-

Digitized by Google

biet gerichtet, hier zu wiederholen: sie mögen darauf sinnen, zweckmäßige Fußketten und Ringe, die alle derartigen Uebelstände vermeiden lassen, die namentlich durchaus fest und sicher, dabei jedoch auch leicht sind, sodaß sie den Vogel nicht qualvoll belästigen, herzustellen. Am allerbesten dürfte es immer sein, wenn man den sprechenden Papagei so auf den Bügel und Ständer gewöhnt, daß er denselben auch unangekettet niemals freiwillig verläßt; dazu gehört freilich recht viel und es bleibt dabei mindestens eine Gefahr, nämlich die, daß der Vogel einmal, durch einen plötzlichen Schreck oder dergleichen aus seiner Ruhe gebracht, durch's offne Fenster davon fliegt, selbst wenn er schon seit zehn Jahren und darüber neben demselben gesessen.

Ernährung.

Es ist wol erklärlich, daß eine zweckentsprechende Fütterung für keinen Vogel so wichtig erscheint, wie für den sprechenden und daher mehr oder minder kostbaren Papagei. Unter Bezugnahme auf das S. 11 ff. bereits Gesagte will ich zunächst nochmals darauf hinweisen, daß die Aufkäufer und Importeure bisher meistens in der ganzen Behandlung unzweckmäßig verfahren und dadurch von vornherein den Keim zum Siechthum und Untergang legen. Die großen Sprecher werden in ihrer Heimat nach der Auffütterung mit gekautem Mais also entweder nur mit dem letztern in trocknem, hartem Zustand mit oder ohne Zugabe von Schiffszwieback oder mit Bananen u. a. tropischen Früchten, auch wol gekochtem Mais, selbst gekochten Kartoffeln und manche Arten, so vornehmlich die Pinselzüngler oder Loris, mit malayisch gesottnem Reis ernährt. Jeder, der Papageien herüberbringt,

Digitized by Google

füttert dieselben seiner Einsicht und Kenntniß gemäß und da läßt es sich denken, daß nicht selten ein und dieselbe Art in mancherlei verschiedenartiger Weise verpflegt wird. Hierin ist die Ursache der bestehenden argen Uebelstände zu suchen und es ergibt sich als in der That dringend nothwendig, daß die gesammte Papageien-Einfuhr, bzl. Verpflegung, in einheitlicher Weise geregelt werde. Vor allem müssen die Großhändler dahin streben, daß sie lebensfähige Vögel erlangen, und dies können sie eben nur dadurch erreichen, daß die Verpflegung und Fütterung bereits von Anbeginn her sach- und naturgemäß eingerichtet werde. Man könnte einwenden, dies sei garnicht möglich, bevor man nicht die Lebens- und Ernährungsweise dieser Vögel im Freien gründlich kennt. Um aber das letztre Ziel zu erreichen, bedarf es vieler Reisen und Forschungsergebnisse, welche leider noch in weiter Ferne liegen dürften. Ganz entschieden kann ich jedoch schon jetzt die Behauptung aussprechen oder vielmehr wiederholen, daß das gegenwärtige Verfahren der Einführung aller, besonders der größeren Papageien, mehr oder weniger ein unheilvolles ist.

Es dürfte unbestreitbar sein, daß alle letzteren Vögel in der Freiheit der Hauptsache nach von mehlhaltigen Sämereien, in geringerm Maße von öligen Samen und zeitweise auch von frischen zarten Pflanzentheilen leben. Daher ist es richtig, wenn man in neuerer Zeit meistens mit Mais, nebst etwas Hanf und Zugabe von gut ausgebacknem, nicht gesäuertem Weizenbrot füttert. Der Mais wird entweder roh oder gekocht gegeben. Letztres geschieht in der Weise, daß man ihn solange siedet, bis ein herausgeschöpftes Korn den Eindruck des Fingernagels annimmt, dann gießt man das Wasser ab und reibt die Körner auf einem groben Leinentuch lufttrocken. Das Weißbrot (Weizenbrot, Semmel oder Wecken, nicht aber Milchbrot) muß altbacken, also hartgetrocknet sein, wird dann in Stücke zerklopft und in

Digitized by Google

möglichst wenig Wasser getaucht; nach dem völligen Aufweichen wird vermittelst eines Messers die Rinde entfernt und die reine Krume gut ausgepreßt, sodaß die Masse krümelig feucht, jedoch nicht kleberig oder schmierig ist.

Herr Karl Hagenbeck hat zuerst darauf hingewiesen und ich schließe mich seinem Ausspruch durchaus an, daß alles sog. Matschfutter, also eingeweichtes Weißbrot, gekochter Mais u. drgl. für diese Papageien schädlich sei, sie mindestens über kurz oder lang mit Gefahren bedrohe.

Man gewöhne sie also nur an die Fütterung von trocknem harten (immer am besten Pferdezahn-, weniger Perl-) Mais und Hanfsamen, beide natürlich im vorzüglichsten Zustande, ferner an bestausgebacknes trocknes, keineswegs frisches, aber ebensowenig ganz altes hartgetrocknetes (in keinem Fall angeschimmeltes, dumpf riechendes oder übel schmeckendes) Weizenbrot; anstatt des letztern kann man den bekannten Schiffszwieback, gleichfalls trocken, also nicht aufgeweicht, geben. Die Maiskörner müssen, auch wenn man sie trocken füttert, doch vorher mit siedendem Wasser abgebrüht werden, um etwa anhaftende thierische und pflanzliche Schmarotzer zu ertödten; selbstverständlich ist es aber nothwendig, sie nach dem Abgießen des Wassers mit einem saubern Tuch abzureiben und an einem nicht zu heißen Ort gut zu trocknen. Mit diesem einfachen Futter kann man nach meiner Ueberzeugung die großen Papageien für die Dauer vortrefflich erhalten und alle Uebelstände und Gefahren vermeiden.

Sobald der Papagei als völlig eingewöhnt, zweifellos gesund und lebenskräftig betrachtet werden kann, darf man damit beginnen, ihm einige Zugaben zur Erquickung zu bieten, so namentlich Obst. Man versuche vorsichtig zunächst mit einer Kirsche, Weintraube, einem Stückchen Apfel, Birne oder dergleichen, je nach der Jahreszeit und alles natürlich in bester Be-

Digitized by Google

schaffenheit; doch achte man wenigstens in der ersten Zeit recht aufmerksam auf die Entlerungen des Vogels und wenn diese schleimig oder gar wässerig, ja auch nur abweichend überhaupt erscheinen, so lasse man die Fruchtzugabe sogleich wieder fort. Gleicherweise dienlich oder wol noch zuträglicher als letztre ist Mais in Kolben und zwar im halbreifen Zustande, wie man zu sagen pflegt, in Milch stehend, mit derselben Vorsicht gegeben. Als unbedenkliche Leckerbissen für die großen Sprecher darf man Hasel- oder Wallnüsse, die sog. brasilischen Erd- oder Paranüsse, auch wol eine süße Mandel gewähren, doch mache man es sich zur Regel, all' dergleichen vorher sorgfältig zu schmecken, damit nicht etwa ein verdorbner, ranzig oder bitter gewordner Kern oder gar eine bittre Mandel darunter ist; letztre wirkt bekanntlich als Gift, und beiläufig sei bemerkt, daß man auch Petersilie als ein solches für Papageien ansieht. Alle weichen Südfrüchte, wie Bananen, Datteln, Feigen, Apfelsinen u. a. m., gebe man den großen Sprechern lieber garnicht oder doch nur unter äußerster Vorsicht, indem man jede einzelne Frucht vorher gleichfalls sorgsam kostet. Ebenso vermeide man rohe oder gekochte Mören, rohe oder geröstete italienische Kastanien, Melonen, auch Rosinen, sowie die verschiedenen Beren, denn man ist bei alledem nicht sicher, daß dies oder das nicht schädlich sei; ohne Bedenken darf man dagegen vollreife frische oder gut getrocknete Ebereschen- oder Vogelberen reichen. Grünkraut erachte ich für die Angehörigen dieser Gruppe als überflüssig, Salat oder Blätter von den verschiedenen Kohlarten als geradezu gefahrdrohend; jedoch biete man ihnen stets Zweige zum Benagen, anfangs trocknes mittelhartes Holz, nach völliger Eingewöhnung grüne Zweige mit Rinde, Knospen oder Blättern, am zuträglichsten von Weiden, Pappeln, allerlei Obstbäumen, auch Birken, Buchen und selbst von den Nadelhölzern; für weniger gut halte ich die sehr harten, sowie die

Digitized by Google

ſtark gerbſäurehaltigen Holzarten. Des Holzes zum Benagen bedarf jeder Papagei, einerſeits um für ſeinen Schnabel eine naturgemäße Thätigkeit zu haben, andrerſeits als friſchen und zuträglichen Nahrungsmittels. — Ein erfahrener Papageienpfleger, Herr E. Dulitz, hat darauf hingewieſen, daß alle großen Papageien einen wahren Hang nach thieriſchem oder pflanzlichem Fett zeigen, und in Uebereinſtimmung hiermit geben viele Liebhaber täglich ein Stückchen nicht zu dick geſtrichnes Butterbrot. Etwas mageres Fleiſch an einem Knochen oder ein Stückchen leichten, nicht zu fetten Kuchen bewilligt auch Herr Hagenbeck; ich empfehle lieber etwas Kakes oder guten leichten Biskuit, beides trocken gegeben; auch dann und wann ein Stückchen beſten harten Zuckers kann nicht leicht ſchädlich werden. Allbekannt iſt es wol, daß jeder große Papagei in der Gefangenſchaft allerlei menſchliche Nahrungsmittel, Braten, Gemüſe, Kartoffeln, ja, ſonderbarerweiſe nicht allein Zuckerſachen, ſondern auch ſtark geſalzene, in Eſſig eingemachte, gepfefferte u. drgl. Leckereien mit wahrer Gier frißt, und es kommen Fälle vor, in denen ein ſolcher Vogel ſich dabei vortrefflich erhält und lange Jahre ausdauert. Meiſtens aber gehen werthvolle Papageien an derartiger naturwidriger Ernährung doch zugrunde. Die erſte Folge iſt häufig das Selbſtausrupfen der Federn, ein unſeliger krankhafter Zuſtand, den ich weiterhin im Abſchnitt „Krankheiten“ beſprechen werde. In vielen anderen Fällen treten mancherlei Leiden ein und nur zu oft ein Siechthum des ganzen Körpers, ſodaß das arme Thier an inneren und äußeren Geſchwüren elend ſterben muß. Ob die Papageien, wenn ſie einzeln im Käfig gehalten werden, wirklich thieriſcher Nahrungsmittel, alſo der Zugabe von Mehlwürmern, Ameiſenpuppen u. a. bedürfen, iſt noch nicht feſtgeſtellt. Der Afrikareiſende Soyaux ſagt, daß die Graupapageien in Weſtafrika als Zerſtörer von Neſtern anderer Vögel bekannt ſeien und es

Digitized by Google

gibt ja noch mehrere Beispiele, in denen verschiedene Papageienarten in der Freiheit als Fleischfresser sich zeigten — wer kann aber bis jetzt mit Sicherheit behaupten, ob dies eine naturgemäße oder widernatürliche Erscheinung sei?

Die bis hierher gegebenen Fütterungsvorschriften gelten im allgemeinen für die Angehörigen aus folgenden Geschlechtern: Eigentlicher Papagei, Amazonenpapagei, Edelpapagei (doch ist für diese letzteren mehr Frucht erforderlich), Eigentlicher, Langschwanz- und Arara-Kakadu und Arara.

Alle mittelgroßen Papageien ernährt man mit Hanf, Hafer, Kanariensamen und auch Hirse, die kleinsten Arten blos mit den drei letztgenannten Sämereien, also ohne Hanf, weil dieser für sie schädlich sein soll, während er für die ersteren, ebenso wie für die ganz großen Arten als eins der besten Ernährungsmittel angesehen werden kann, besonders wenn sie sehr entkräftet sind. Als Zugaben gewährt man zunächst noch mancherlei andere Sämereien, so vielerlei Hirsen (außer reinweißer und Senegal- die verschiedenen Kolbenhirsen u. a.), in trockenen Samen, sowie in trockenen und frischen Aehren, bzl. Kolben, ferner Sonnenblumen-, Saflor- u. a. Samen, außer dem Hafer auch andres Getreide, letztres, sowie allerlei Gräsersamen vornehmlich im halbreifen Zustande in Aehren und Rispen, ebenso halbreifen Mais in den Kolben. Die öligen Sämereien sollte man niemals vor völliger Reife gewähren, denn dieselben, namentlich aber der Hanf, können dann sehr schädlich werden. Einzelne Arten, so der große Alexandersittich, fressen auch, gleich den großen Papageien, trocknen Mais. Für die meisten der hierher gehörenden Arten ist die Darreichung von etwas süßer Frucht täglich, nicht wie bei den letzteren blos beiläufig, sondern durchaus nothwendig; im allgemeinen gilt das dort (S. 41) Gesagte, doch braucht man weniger ängstlich inbetreff der Südfrüchte zu sein, wenn man nur die Vorsicht beachtet,

Digitized by Google

jede einzelne Gabe zu kosten. Auch Grünkraut ist für diese Arten Bedürfniß und als am zuträglichsten empfehle ich außer der allbekannten Vogelmiere noch besonders Resedakraut und die Ampelpflanze Doldenriesche (Tradescantia). Die Kohlarten und Salat vermeide man auch bei diesen Papageien gänzlich. Alles Grünkraut muß natürlich im besten Zustande, rein, lufttrocken, nicht frisch beregnet oder bethaut, keinenfalls aber von Mehlthau befallen, angeschimmelt oder gar angefault sein; man achte sorgfältig darauf, daß sich nicht einzelne derartige Blätter darunter befinden. Viele der hierher gehörenden Arten werden bekanntlich in der Gefangenschaft gezüchtet*) und dann bedürfen sie außer den mannigfaltigsten Sämereien und dem Fruchtfutter auch der Zugabe von Fleischnahrung, also Ameisenpuppen und Mehlwürmer; einzeln als Sprecher gehalten, braucht man ihnen dergleichen kaum oder doch nur selten zu bieten. Hinsichtlich der Leckerbissen aller Art, sowie der Zweige zum Benagen gilt für sie genau das bei den großen Papageien Angegebne.

Als die Geschlechter, auf welche die letzteren Anleitungen sich beziehen, nenne ich folgende: Langflügelpapagei, Keilschwanzkakadu, Langschnabelsittich, Edelsittich, Keilschwanzsittich, Dickschnabelsittich, Schmalschnabelsittich, Plattschweifsittich und Wellensittich.

Die Angehörigen der Gruppe, die nun noch übrig bleibt, die Pinselzüngler oder Loris, müssen entsprechend ihrer Ernährung im Freien, absonderlich gefüttert werden. Ihnen vermag man noch viel weniger als allen anderen naturgemäße Nahrung zu gewähren, denn sie sollen theils von überaus zuckerreichen tropischen Früchten, vom Honigsaft der Blüten

*) Anleitung zur Züchtung der Papageien ist in Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" I. zu finden.

Digitized by Google

und theils von Kerbthieren sich ernähren. Die Ersatzmittel, welche man ihnen, und ich darf sagen, erfreulicherweise mit bestem Erfolg, geboten hat, werde ich weiterhin bei Beschreibung dieses Papageiengeschlechts selbst näher besprechen. Gleich hier sei mit Nachdruck hervorgehoben, daß manche der in heißen Gegenden als zuträglich gegebenen Nahrungsmittel, so besonders malayisch gesottner Reis*), gekochte Kartoffeln und die eigentlichen Tropenfrüchte, wie Bananen u. a. m., diesen Vögeln in unserm Klima nur zu leicht, ja fast regelmäßig, Krankheit und Tod bringen. Dagegen hat die Erfahrung festgestellt, daß sowol die Breitschwanz-, als auch die Keilschwanzloris erst als ausdauernd bei uns angesehen werden dürfen, wenn sie sich an Samenfutter, vor allem Kanariensamen, aber auch die verschiedenen Hirsen und Hafer gewöhnt haben; einige, wie der Lori von den blauen Bergen, fressen dann sogar vorzugsweise Sämereien. Außer den beiden genannten Geschlechtern gehört auch der Stumpfschwanzlori oder Nestor hierher; obwol behauptet worden, daß er rohes Fleisch bekommen müsse, hat sich doch herausgestellt, daß er sich bei gleicher Fütterung wie die Verwandten vortrefflich erhalten läßt.

Nach den bereits vielfach gegebenen Hinweisen in dieser Beziehung brauche ich wol nur noch kurz daran zu erinnern, daß sämmtliche Nahrungsmittel, welche ein Papagei bekommt, sich durchaus in einem in jeder Hinsicht tadellosen Zustand befinden müssen. Alle Sämereien müssen voll ausgewachsen und gut gereift, sodann frei von Schmutz und fremden Samen sein; sie dürfen, so z. B. der Hanf, nicht zu frisch (er bewirkt

*) Der Reis wird mit kaltem Wasser beigesetzt und etwa halbgar gekocht, dann gießt man das Wasser ab, stellt den Topf mit den feuchten Körnern noch weiter an eine heiße Stelle und läßt sie hier dämpfen bis sie völlig gar sind. So zubereitet soll der Reis viel wohlschmeckender und zugleich gesunder sein, als wenn er im Wasser ganz gar gekocht ist.

Digitized by Google

dann leicht Durchfall), aber auch nicht zu alt, vertrocknet oder ranzig sein. Gleicherweise wichtig ist es beim Obst, daß dasselbe nicht zu früh abgenommen, nachgereift (und dann wol sauer geworden), sondern voll ausgewachsen und naturgemäß gereift sei. Es darf auch nicht im weich gewordnen Zustande ‚molsch' oder ‚mudicke', wie man in Berlin zu sagen pflegt, sondern es muß frisch und wohlschmeckend sein. Sorgsam achte man darauf, daß es im Winter nicht eisig kalt, sondern immer erst gegeben werde, nachdem es mehrfach durchgeschnitten, im erwärmten Raum gelegen und stubenwarm geworden. Das Weißbrot, wenn man solches füttern will, muß vorzüglich ausgebacken sein, wie schon gesagt, ohne Sauerteig, auch ohne oder doch mit möglichst wenig Hefe, nicht glitschig oder wasserstreifig, sondern gleichmäßig locker und porös. Ebenso darf es nicht zu lange oder in zu viel Wasser geweicht werden, damit nicht aller Nahrungsstoff auszieht.

Das bis hierher Gesagte soll als allgemeiner Anhalt für die Fütterung der hier inbetracht kommenden Papageien dienen; selbstverständlich werde ich in der übersichtlichen Schilderung, die ich von jedem einzelnen Geschlecht gebe, die besondre Fütterung und Verpflegung der betreffenden Arten noch eingehend berücksichtigen.

Wie für jeden Vogel überhaupt, so ist auch für alle Papageien und gleicherweise für den einzelnen Sprecher, wie für das nistende Pärchen, die Zugabe von Kalk zur Fütterung nothwendig. Am entsprechendsten erscheint der thierische Kalk in Gestalt der bekannten Tintenfisch- oder Sepienschale; er wird zugleich infolge seines Salzgehalts sehr gern gefressen und ergibt sich immer als zuträglich; nur vermeide man, ihn frisch eingeführten Papageien sogleich zu geben, weil sonst leicht übermäßiger Durst und durch das Trinkwasser, an welches sie noch nicht gewöhnt sind, Durchfall verursacht wird. Man

Digitized by Google

klemmt am besten einen ganzen Schulp oder doch ein großes Stück zwischen das Gitter. Nächstdem ist geglühte Austernschale, ferner auch Kalk von alten Wänden oder Kreide empfehlenswerth. — Sand und zwar saubrer, durchaus reiner, trockner, feiner, aber nicht staubiger, am besten weißer Stubensand, ist nicht allein eines der besten Hilfsmittel zur Reinigung und Reinhaltung des Käfigs, sondern er muß auch als Lebensbedürfniß gelten, indem Papageien gleich anderen Vögeln kleine Steinchen zur Verdauung verschlucken.

Weiterhin beim Graupapagei, sowie bei den Amazonen u. a. werde ich noch darauf zurückkommen, daß, wie ich auch schon erwähnt habe, viele dieser Vögel ganz ohne Wasser gehalten werden; ich hebe es hier bereits hervor, daß ich eine solche Verpflegung als durchaus unheilvoll ansehe und von vornherein dringend warne, man wolle einen Papagei, der nicht Wasser bekommen darf, überhaupt niemals kaufen. Das gebräuchliche Verfahren, in Kaffe oder Thee getauchtes Weißbrot zu geben, ist nach meiner Ueberzeugung unheilvoll, denn einerseits kann die geringe, meistens wol noch dazu warme Flüssigkeit nicht das natürliche Bedürfniß stillen und andrerseits belästigt das Matschfutter den Magen, stört die Verdauung, macht den Vogel also krank oder es ist nicht dazu ausreichend, ihn für die Dauer bei voller Kraft zu erhalten, zumal wenn er, wie es ja leider oft geschieht, ausschließlich oder doch vorzugsweise damit ernährt oder auch nur soviel frißt, als er irgend bekommen kann, während er das zuträglichere Körnerfutter verschmäht. Inbetreff des Trinkwassers sind nun aber auch noch besondere Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Gleicherweise wie ein Mensch mehr oder minder schwer erkranken kann, wenn er fremdes Trinkwasser ohne allmälige Gewöhnung genießt, so ist dies beim Vogel und insbesondre beim Papagei, der Fall. Man reiche daher in der ersten Zeit

Digitized by Google

immer nur abgekochtes, selbstverständlich jedoch wieder erkaltetes Trinkwasser, auch niemals zuviel auf einmal, höchstens bis fünf Schluck hintereinander und täglich etwa zweimal. Nach und nach vermischt man dann das gekochte Wasser immer mehr mit natürlichem, aber nicht ganz frischem oder eiskaltem, sondern nur solchem, welches etwa eine Stunde gestanden hat. und wie man zu sagen pflegt, stubenwarm ist. Auch wenn der Papagei bereits völlig eingewöhnt ist, soll man ihm doch immer nur verschlagnes Trinkwasser reichen. — Die kleineren Arten sind meistens an reichliches Trink- und auch wol Badewasser gewöhnt und man muß daher solches, jedoch ebenfalls mit der Vorsicht, daß es immer stubenwarm sei, gewähren.

Zähmung und Abrichtung.

Die Nachahmungssucht und -Fähigkeit der Papageien erstreckt sich nicht blos auf menschliche Worte, sondern auch auf allerlei andere Laute — und in dieser Begabung kann ein solcher Vogel also höchst werthvoll, aber ebenso unausstehlich und daher werthlos werden. Im guten Sinne lernt der große Papagei Worte nachsprechen und manchmal ebenso nachsingen, Melodien flöten oder pfeifen, selbst die Lieder von Singvögeln mehr oder minder treu wiedergeben; im bösen Sinne nimmt er die gellenden Schreie aller anderen Vögel, die er hört, an, ahmt gleicherweise allerlei schrille Töne nach, wie den Hahnenschrei, Hundegebell, Thürknarren, das Pfeifen der Lokomotive, Kinderweinen u. a. m. Aufgabe der Erziehung muß es sein, ihn ebenso von allem Widerwärtigen abzulenken, wie zum Angenehmen anzuleiten.

Digitized by Google

Obgleich die Liebhaberei für Papageien in allen ihren vielen Erscheinungen eine erstaunlich lebhafte und verbreitete ist, so würde sie sicherlich noch viel weitere Ausdehnung finden können, wenn sich ihr nicht nur zu große wirkliche oder vermeintliche Schwierigkeiten entgegenstellten. Manche Leute haben von vornherein Widerwillen gegen die Papageien „ihres langsamen amphibienähnlichen Kletterns", „ihrer Falschheit, Tücke und Bosheit", „ihres nur zu argen Lärmens", kurz und gut vielerlei Unliebenswürdigkeiten wegen, — nach meiner festen Ueberzeugung aber, auf Grund langjähriger Erfahrung und genauer Kenntniß, beruhen alle solchen Klagen lediglich in Vorurtheil, Unkenntniß, überhaupt in der Schuld des Besitzers selber. Schlimmer noch ist es, wenn, wie Herr Dulitz sagt, Jemand sich einen Papagei hält, während er keineswegs ein wahrer Vogelfreund ist. Der stattliche Vogel im hübschen Bauer gilt ihm lediglich als Zimmerschmuck. Die Begabung desselben, Worte sprechen zu lernen, erfreut in der ersten Zeit; nachdem aber der Reiz des Neuen sich verloren hat, dient er wol nur noch dazu, besuchenden Freunden und Bekannten Spaß zu machen. Im übrigen wird er dem Besitzer immer mehr gleichgiltig, wol gar überdrüssig, man überläßt seine Verpflegung den Dienstboten — und damit ist sein Schicksal freudlos und beklagenswerth geworden; für den Besitzer erscheint er dann allerdings bald als ein unerträgliches Geschöpf. Fast jeder Papagei, insbesondre der hochbegabte und lebhafte, will lieben und geliebt sein, das ist eine Erfahrung, die der Liebhaber niemals vergessen sollte. Wer diese Hauptbedingung seines Wohlergehens nicht erfüllen kann, thut ein großes Unrecht daran, einen solchen Vogel anzuschaffen. Alle Mißgriffe nun aber, in der Erziehung ebenso wie in der Behandlung, bringen dem Thier anstatt guter Eigenschaften im Gegentheil abstoßende bei. Eine ernste Wahrheit liegt in dem Ausspruch, daß, wer

Digitized by Google

ſelber nicht gut erzogen iſt, ſich nicht anmaßen ſoll, Andere, gleichviel Menſchen oder Thiere, erziehen zu wollen — und doch ruht die Abrichtung oder „Dreſſur", wie man bezeichnend genug zu ſagen pflegt, unſerer nächſten Freunde aus der Thierwelt, unſerer intimſten Genoſſen unter den Hausthieren, in der Regel in den Händen von rohen, oft nicht einmal gutartigen und häufig genug unfähigen Menſchen. Daher ſehen wir denn um uns her die vielen verdorbenen Hausthiere, Hunde, die von Natur gutmüthig und fügſam geweſen, in bösartige, biſſige Köter verwandelt, Katzen falſch und hinterliſtig, Papageien ſtörriſch, boshaft und als unleidliche Schreier u. a. m. Andrerſeits darf ein wohlerzognes Thier, welches es auch ſei, doch zweifellos als ein hochſchätzenswerther Genoſſe des Menſchen, der ihm unter Umſtänden im vollen Sinne des Worts ein Freund ſein und unermeßlichen Werth für ihn haben kann, gelten. Im Nachſtehenden will ich es verſuchen, Hinweiſe zu geben, wie man dieſes in der That herrliche Ziel zu erlangen vermag.

Bis jetzt hat die Erfahrung etwaige Merkmale, an denen man die mehr oder minder hohe Begabung eines Vogels ohne weitres erkennen könnte, noch nicht mit Sicherheit feſtſtellen laſſen. Wol vermag es der Blick des Sachkundigen einem Papagei einigermaßen anzuſehen, ob er einſchlagen, alſo ſich begabt, leicht zähmbar und gelehrig zeigen werde, wol zeugen Munterkeit und Regſamkeit, ein lebhaftes, glänzendes Auge, Aufmerkſamkeit auf Alles, was rings umher vorgeht u. drgl. für die Annahme, daß wir einen „guten Vogel" vor uns haben, allein volle Gewißheit können wir darin doch nicht finden, denn es liegen Beiſpiele vor, nach welchen die Anzeichen trügeriſch geweſen, der Papagei trotzdem ſtörriſch und dumm geblieben, während ein andrer, der anfangs ſtumpfſinnig dageſeſſen, ſich dennoch zum vorzüglichen Sprecher ausgebildet hat. Die Geſchlechtsunterſchiede dürften in dieſer Hinſicht bedeutungslos

Digitized by Google

sein und trotz vielfacher gegentheiliger Behauptung keinen Unterschied in der Begabung ergeben, abgesehen davon, daß man sie bis jetzt bei den meisten großen Arten kaum oder noch garnicht ermittelt hat. Es ist wol ziemlich allgemein bekannt, daß die größeren Papageien, in der Freiheit wahrscheinlich fast alle, die nicht einem Zufall zum Opfer fallen und in der Gefangenschaft die, welche sich sachgemäßer Verpflegung erfreuen, ein hohes Alter erreichen. Selbstverständlich ist es um so schwieriger, einen Vogel einzugewöhnen und abzurichten, je älter er vor dem Einfangen bereits geworden, und die erste beim Einkauf eines Sprechers, den man in die Lehre nehmen will, zu beachtende Regel lautet also, daß derselbe, gleichviel von welcher Art er sei, für jeden Unterricht umsomehr empfänglich ist, je jünger er in unsern Besitz gelangt. Doch kennt man aber auch Fälle, in denen selbst sogenannte alte Schreier, die im Handel geringern Werth haben, noch vortreffliche Sprecher geworden, freilich gewöhnlich erst, nachdem man sie jahrelang in der Gefangenschaft gehalten. Als Beispiel führe ich den Jako des Herrn Gymnasialdirektor Neubauer in Rawitsch an, welcher im Alter von nahezu 20 Jahren nach dreijährigem Aufenthalt zu sprechen begann und noch mehr als 200 Worte in drei Sprachen: deutsch, polnisch und französisch, lernte. Jeder gelehrige und unschwer zähmbare Papagei pflegt gleichzeitig mit der fortschreitenden Eingewöhnung erklärlicherweise immer gefügiger zu werden, aber auch jemehr er lernt, desto seltner sein häßliches Geschrei erschallen zu lassen.

Die Händler zweiter und dritter Hand zähmen in der Regel jeden Papagei mit Gewalt auf ähnlichem Wege wie die Indianerin. Mit starken, wildledernen Handschuhen ausgerüstet, packt der Mann den Vogel an den Beinen, zieht ihn ohne Rücksicht auf sein Kreischen und Beißen aus dem Käfig hervor, hält ihn auf dem Zeigefinger der linken Hand fest und

Digitized by Google

ſtreichelt ihn mit der rechten ſolange, bis er ſich in ſein Schickſal ergibt, ruhig und zahm wird. Dazu gehört aber vor allem Muth, ferner Geſchick, Ausdauer und Geduld und namentlich völlige Nichtachtung der durch die Biſſe des Vogels verurſachten, trotz der Handſchuhe gar empfindlichen Schmerzen. Die zangenartige Geſtalt des Papageienſchnabels bringt bei heftigen Biſſen Quetſch- und Reißwunden zugleich hervor, welche ſehr ſchmerzhaft ſind und ſchwierig heilen. Man hat ſich vornehmlich gegen hinterliſtiges Beißen zu hüten. Im allgemeinen wolle man beachten, daß kleine Papageien viel häufiger und wüthender beißen als große, welche letzteren eigentlich nur, wenn ſie ſehr gereizt werden, dann aber freilich um ſo gefährlichere Biſſe hervorbringen können. Um ihnen das Beißen abzugewöhnen, haut man ſie, ſobald ſie es verſuchen, mit dem Zeigefinger auf den Schnabel. Bei dieſer Gelegenheit ſei noch darauf aufmerkſam gemacht, daß faſt alle Papageien, beſonders die größeren Arten, anderen, vielleicht in demſelben Zimmer freifliegenden Stubenvögeln, wenn ſie ihnen nahe kommen, gefährlich werden.

Auch Liebhaber ſchlagen wol das beſchriebne Verfahren ein, weil daſſelbe, wenn ſchon mit größrer Anſtrengung, ſo doch raſcher als jedes andre zum Ziele führt. Herr Haushofmeiſter Meyer in Berlin erzählt, daß er in früheren Jahren es oft ausgeführt habe, ſich mit einem ganz rohen Graupapagei in ein Zimmer einzuſchließen und den anfangs unbändig erſcheinenden wild tobenden und fürchterlich kreiſchenden Vogel ſolange, wenn es ſein mußte, wol mehrere Tage von früh bis ſpät und ſelbſt einen Theil der Nächte in der angegebnen Weiſe zu behandeln, bis deſſen Scheu und Trotz endlich gebrochen und er aus Mattigkeit und Hunger zahm und fügſam geworden. Die Zähmung auf dieſem Wege muß als eine der ſchwerſten Aufgaben in der ganzen Vogelabrichtung angeſehen

Digitized by Google

werden und ich möchte sie daher keineswegs allen Liebhabern anrathen. Denn, wenn ein andres Verfahren auch ungleich langsamer und zeitraubender Erfolg bringt, so hat es doch den Vortheil, daß es zwischen dem Menschen und dem Vogel ein liebevolles Verhältniß zu Stande bringt, während diese Dressur das Menschenherz sicherlich nicht mild und sanft stimmen kann. Auch will es mir scheinen, als ob die Vögel, welche so mit Gewalt gebändigt worden, immer den Eindruck der Knechtschaft zeigen, im Gegensatz dazu aber die in Liebe und Freundschaft abgerichteten ihrem Herrn gewissermaßen verständnißvoller zugethan sind.

Nur dann kann die Zähmung und Abrichtung unschwer und mit bestem Erfolg erzielt werden, wenn bei dem Lehrmeister zunächst ein gewisses Geschick dazu vorhanden ist; es gibt Leute, welche eine derartige schwierige Aufgabe mit staunenswerther Leichtigkeit zu lösen vermögen, bei anderen dagegen, obwol sie reichere Erfahrungen und viel größere Kenntnisse haben, hält sie überaus schwer. Wenn man sieht, daß allerlei Vögel gegen Diesen sogleich furchtlos und sogar zutraulich sind, Jenem gegenüber aber selbst in jahrelangem Verkehr niemals ganz ruhig und zahm werden, so kommt man unwillkürlich zu der Annahme, daß dergleichen nicht allein im Benehmen, in der Art und Weise der Behandlung, sondern von vornherein auch in der äußern Erscheinung begründet liegen muß. Man behauptet, daß für die Papageien, ähnlich wie für die Kinder, ein bärtiger Mann beängstigend sei, während sie, mindestens im allgemeinen, für Frauen und Kinder mehr Anhänglichkeit äußern; auch will man festgestellt haben, daß männliche Papageien gegen Frauen und umgekehrt, weibliche gegen Männer, sich zugänglicher und liebenswürdiger erweisen — doch sind ausreichende Beobachtungen inbetreff aller solchen Annahmen durchaus nicht gemacht worden.

Digitized by Google

Um eine rasche und vollständige Zähmung zu erreichen, wolle man einige Erfahrungssätze nicht außer Acht lassen: Der Vogel darf seinen Stand niemals höher, sondern er muß ihn stets niedriger als das menschliche Auge haben. Er ist immer so zu stellen, daß der Verpfleger, bzl. Lehrmeister, sich zwischen ihm und dem Licht befinde. Namentlich aber mache man ihn, besonders den großen Papagei, soweit es irgend ausführbar ist, hilflos, denn jemehr er sich in die menschliche Gewalt gegeben sieht, desto leichter wird er zahm und wiederum um so eher der Abrichtung zugänglich.

Man bringe ihn also in einen recht engen Käfig oder setze ihn angekettet gleich auf einen Ständer. Beides erfordert jedoch Vorsicht; bereits das Herausgreifen aus dem Versandtkäfig muß ja sorgsam vorgenommen und sollte ebenso wie das Anlegen der Kette um den Fuß niemals von dem Besitzer selber ausgeführt werden (s. S. 26).

Jedem, auch dem völlig zahmen Papagei gegenüber, bedenke man stets, daß er als Tropenvogel besondere Eigenthümlichkeiten mitgebracht hat, denen durchaus Rechnung zu tragen ist, wenn er nicht in der einen oder der andern Hinsicht Schaden erleiden soll. Mehr als jedes andre Thier ist der hochbegabte Papagei einer Erkrankung, ja dem Tode durch Gemüthsbewegung ausgesetzt und zwar nicht allein aus Angst und Erschrecken, sondern auch aus Sehnsucht nach seinem Herrn, der ihn liebevoll behandelt und dann verkauft hat oder nach einem gefiederten Genossen, ferner aus Aerger und Zorn infolge von Zank und Streit mit Menschen und Thieren. Man verhalte sich also beim Füttern, wie bei jedem Nahen immer gleichmäßig ruhig und freundlich und vermeide es vor allem, ihn durch plötzliches hastiges Herantreten zu erschrecken. Im ganzen Verkehr mit ihm, namentlich aber bei der Abrichtung, lasse man sich niemals zur Heftigkeit oder gar zu Zornaus-

Digitized by Google

brüchen hinreißen. Ferner kann der Papagei durch Erregungen auch leicht verdorben werden. Man soll ihn niemals necken, im Scherz oder Ernst reizen, unnöthigerweise bedrohen oder gar strafen. Das Erziehungsmittel der Bestrafung darf bei diesen Vögeln nur bedingungsweise und von einem Abrichter angewendet werden, der vor allem volles Verständniß für ihr Wesen und ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet überhaupt besitzt.

Bei der Zähmung sind sodann unverwüstliche Ruhe und gleichmäßig freundliches Wesen Hauptbedingung des Erfolgs. Zuerst, etwa ein bis zwei Wochen, überlasse man den Vogel ungestört sich selber. Sein eigner, scharfer Verstand wird ihm bald sagen, daß für sein Leben keine Gefahr vorhanden ist, und sobald er dann ruhig geworden, das dummscheue Wesen und häßliche Geschrei abgelegt hat, fängt er an, seine Umgebung zu beobachten. Während er sie mehr und mehr kennen lernt, entwickelt er geradezu überraschenden Scharfsinn. Er weiß Jeden, der es gut mit ihm meint, von dem, der ihm eine wirkliche oder vermeintliche Unbill zugefügt hat, also Freund und Feind, bald und ebenso noch nach langer Zeit sicher zu unterscheiden; er lernt seinen Wohlthäter schätzen, wird zutraulich gegen ihn und ihm staunenswerth zugethan. Am besten unterläßt man auch hier jede Zwangsmaßregel und bedient sich allenfalls nur einiger Kunstgriffe, um eine raschere, vollständigere Zähmung zu erreichen. Nachdem man ihm für einige Stunden das Trinkwasser entzogen, hält man ihm dasselbe oder auch besondere Leckerbissen so hin, daß er, um dazu zu gelangen, über die Hand hinwegreichen muß. Unschwer gewöhnt er sich so an diese, kommt freiwillig auf den Finger, läßt sich dann auch das Köpfchen krauen, nach und nach streicheln, bis zuletzt völlig anfassen und hätscheln.

Herr Dr. Lazarus, einer der tüchtigsten Papageienkenner

Digitized by Google

und Pfleger, schlägt etwas abweichend folgenden Weg vor: „Sobald der frisch eingeführte Papagei bei gleichmäßig liebevoller Behandlung, oft trotzdem erst nach Monaten, sich ruhiger zeigt und zutraulich zu werden beginnt, indem er aufhört, bei jeder Annäherung zu kreischen, vielmehr an das Gitter kommt und wol gar den Kopf entgegenstreckt, wobei er jedoch noch immer sehr scheu und ängstlich ist, darf man allmälig den Versuch wagen, mit einem Finger vorsichtig seinen Oberschnabel oder Kopf zu berühren. Nun versuche man, ihn zu krauen, während man ihm einige Worte zärtlich sagt, besonders solche, welche er vielleicht schon spricht. Dies thue man namentlich in der Dämmerung und des Abends bei Licht; bald wird er sich solche Liebkosungen gefallen und wol gar den Kopf in die hohle Hand nehmen lassen. Stets nehme man dergleichen aber durch das Käfiggitter vor, durch welches man am Papageibauer (s. S. 30) ja bequem langen kann, niemals reiche man mit dem ganzen Arm durch die Käfigthür, weil der Papagei dadurch immer wieder stürmisch gemacht wird. Erst nach längrer Zeit, wenn er schon daran gewöhnt ist, durch das Käfiggitter sich ohne Scheu berühren zu lassen, beginne man die Käfigthür zu öffnen, damit er herauskomme, doch nur wenn es im Zimmer ganz ruhig ist, und ebenso lasse man ihm vollauf Zeit, sich zu entschließen, auch wenn es mehrere Stunden dauert, bis er heraus und auf das Dach klettert. Bald wird er die Bewilligung dieser Freiheit mit Ungeduld erwarten. Nun beschäftige man sich ausschließlich mit ihm, wenn er sich draußen befindet. Ist er soweit gezähmt, daß er Futter aus den Fingern nimmt, einen solchen mit dem Schnabel faßt, ohne zu beißen, seinen Kopf in eine hohle Hand steckt, während man ihn mit der andern im Gefieder kraut, so muß er nun auch lernen, auf die Hand zu kommen. Dauert es zu lange, bevor er sich freiwillig dazu

Digitized by Google

entschließt, so muß man ihn, wie S. 52 angegeben, mit Gewalt dazu gewöhnen. Im Verlauf einer Woche bringt man ihn sicherlich dazu, dies freiwillig zu thun."

Bevor ich den Weg der praktischen Anleitung zur Abrichtung vorzeichne, muß ich zu allererst einem häßlichen, leider noch vielfach herrschenden Vorurtheil mit voller Entschiedenheit entgegentreten. Dasselbe betrifft das sog. Zungenlösen, welches viele Leute noch für durchaus erforderlich halten, andere dagegen als nothwendig ausgeben, um ihres Vortheils willen nämlich. Während ich ebenso wie alle übrigen Schriftsteller auf diesem Gebiet sicher glaubten, die Meinung, einem Vogel müsse, damit er sprechen lernen könne, die Zunge gelöst werden, käme nur noch bei ungebildeten Leuten vor und während wir in dieser Ueberzeugung das nähere Eingehen auf den Aberglauben für überflüssig erachteten, ist derselbe doch, wie ich kürzlich erfahren mußte, noch viel mehr verbreitet als man annehmen sollte. Ich hörte, daß er neuerdings sogar in einer höhern Töchterschule gelehrt worden. Auch erhalte ich, allerdings zeitweise, noch Anfragen in dieser Hinsicht. Deshalb sei hiermit ganz ausdrücklich erklärt, daß das Lösen der Zunge bei keinem Vogel nothwendig, sondern eine arge Thierquälerei ist, die nur den Menschen Vortheil bringt, welche auf die Einfalt Anderer spekuliren.

Zähmung und Sprachunterricht müßten eigentlich stets gleichzeitig erstrebt werden. Erachtet man indessen die erstre nicht für nothwendig, so kann man den Papagei von vornherein in einen geräumigen Käfig setzen, während dies andernfalls erst in ein bis zwei Wochen geschehen sollte.

Wenden wir uns nun der Abrichtung zu, so ist für dieselbe außer den S. 56 angeführten Bedingungen vor allem in hohem Maße Verständniß, liebevolle Theilnahme für die Vögel überhaupt, vornehmlich aber ebenfalls Ruhe erforderlich.

Digitized by Google

An jedem Morgen, wenn man zuerst zu dem Papagei hintritt, und an jedem Abend, sodann auch am Tage mehrmals, sagt man ihm zunächst ein einziges Wort recht deutlich betont und wenn möglich immer in genau gleicher, klarer und scharfer, nicht aber schnarrender, lispelnder oder sonstwie schlechter Aussprache vor. Man wähle ein solches mit volltönendem Vokal, o oder a, und sodann mit hartem k, p, r oder t, und vermeide die Zischlaute, besonders sch und z. Die Lehrmeister in den Hafenstädten, bzl. schon die Matrosen auf den Schiffen, bringen den Papageien gewöhnlich die Worte Jako, Koko, Lora, Hurrah, Rorirora, dann weiter wackre Lora, Papa u. a. m. bei. Ein Graupapagei, den ich schon längre Zeit besessen und welchen ich, weil er garnichts annehmen gewollt, bereits als untauglich zum Sprechen, für einen Züchtungsversuch bestimmt hatte, sprach die Worte „Herr Doktor", welche das Mädchen beim Anmelden von Fremden gerufen, plötzlich nach. Die Erfahrung besagt übrigens, daß jeder Papagei von einer ihm wol melodischer klingenden Frauenstimme leichter lerne, als von der rauhen eines Mannes, doch darf man keineswegs glauben, daß letztres garnicht geschehe.

Während der Sprachabrichtung wolle man darauf achten, daß der Vogel vorzugsweise gut behandelt werden muß, damit er zutraulich werde und besonders bei jeder Annäherung des Menschen nicht mehr wie bisher zusammenschrecke oder doch ängstlich und scheu sei, sondern vielmehr recht ruhig und aufmerksam sich zeige, sodaß er von vornherein mit einem gewissen Verständniß auf den Unterricht merke. Der letztre sollte in Wirklichkeit ein solcher und nicht eine bloße Abrichtung zum Nachplappern einzelner Worte sein; er muß entschieden eine bestimmte Vorstellung für jedes Gesagte beim Vogel erwecken. Dazu gehört vor allem, daß derselbe sich der Begriffe von Zeit, Raum und anderen Verhältnissen bewußt werde. Man sagt

Digitized by Google

ihm früh „guten Morgen", spät „guten Abend" oder „gute Nacht" vor, ebenso „guten Tag" oder „willkommen" bei der Ankunft und „lebewohl" beim Fortgehen; man klopft an und ruft „herein"; man zählt ihm Leckerbissen zu: eins, zwei, drei, oder nennt ihm deren Namen, wie Nuß, Mandel, Apfel; späterhin lobt man ihn, wenn er artig und folgsam ist und tadelt ihn, wenn er sich eigensinnig zeigt oder nicht gehorchen will. All' dergleichen begreift ein begabter Vogel sehr bald, und es ist manchmal wirklich erstaunlich, mit welchem Scharfsinn und mit welcher Sicherheit er derartige Verhältnisse kennen und unterscheiden lernt. Auch bei der Abrichtung zum Nachsingen eines oder mehrerer Lieder sowie zum Nachflöten von Melodien ist sorgsam darauf zu sehen, daß der Unterricht, gleichviel ob er im letztern Fall bloß mit dem Munde oder mit einer Flöte ausgeführt werde, stets in gleicher Tonart geschehe.

Den sachgemäßen Sprachunterricht soll man mit leichten einfachen Worten anfangen und allmälig zu schwereren übergehen. Man verfahre in der Weise, daß man eigentlich an jedem Tage, mindestens aber von Zeit zu Zeit, alles, was der Vogel bisher gelernt hat, gewissermaßen vom Abc an, noch einmal wiederhole und dann erst, sobald man sich davon überzeugt, daß er alles taktfest inne hat oder nachdem man ihm dies oder das Entfallene wieder beigebracht, ihm Neues vorspreche. Dabei vermeide man durchaus nachzuhelfen, wenn der Vogel übt und inmitten des Worts oder Satzes stecken bleibt; er würde dadurch leicht eine falsche doppelsilbige Aussprache der Worte annehmen. Man warte daher stets bis er schweigt und spreche ihm dann das betreffende Wort oder den Satz nochmals klar und scharf betont vor. Um ihn von häßlichen widerwärtigen Redensarten, Worten oder Lauten überhaupt zu entwöhnen, unterlasse man es, über dergleichen zu lachen, denn

Digitized by Google

das würde ihn nur dazu ermuntern, desto eifriger gerade solche Unarten zu üben — in ganz gleicher Weise wie es bei Kindern der Fall ist. Nur dadurch kann er sie vergessen, daß sie in seiner Gegenwart niemals wiederholt oder auch nur erwähnt werden, daß man vielmehr, sobald er sie auszusprechen beginnt, ihn sofort mit einem andern erwünschten Wort unterbricht. Nothwendig ist es, daß man sich sowol mit dem in der Abrichtung befindlichen als auch mit dem bereits tüchtigen Sprecher möglichst viel beschäftigt und zwar eingedenk dessen, daß Stillstand in allen Dingen stets Rückschritt bedeutet, daß also bei mangelnder Uebung auch der beste hochbegabte Vogel in Gefahr ist, „zurückzugehen", bzl. das Erlernte zu vergessen, zu verwildern oder umgekehrt wol gar stumpfsinnig zu werden und also bedeutsam an Werth zu verlieren. So, Schritt für Schritt lehrend, hat man die Gewähr, daß der Papagei wirklich ein tüchtiger Sprecher werde.

Nun ergibt sich freilich die Begabung als außerordentlich verschiedenartig. Der eine begreift schwer, erfaßt ein neues Wort erst nach längrer Uebung, behält es dann aber auch und hat alles fest inne, was ihm überhaupt gelehrt worden; ein zweiter schnappt alles rasch auf, lernt ein Wort wol gar beim erstenmal nachsprechen, vergißt es jedoch ebenso leicht wieder; ein dritter nimmt gut auf und bewahrt zugleich; ein vierter lernt garnicht oder doch nur wenig; ein fünfter hat keine Anlage, Worte nachzusprechen, kann dagegen vortrefflich Melodieen nachflöten; ein sechster ahmt das Krähen des Hahns, Hundegebell, das Knarren der Wetterfahne und allerlei andere wunderliche Laute täuschend nach, kann aber ebenfalls kein menschliches Wort hervorbringen. Eine Hauptaufgabe für den tüchtigen Lehrmeister ist es nun, daß er beizeiten das entsprechende Talent eines jeden Vogels entdecke und ihn sodann in demselben zur höchstmöglichen Ausbildung bringe. Im allgemeinen darf

Digitized by Google

man annehmen, daß es in den Reihen der Arten, welche überhaupt sprechen lernen, wol kaum einen einzigen Vogel gebe, der garnicht fähig sei, etwas aufzufassen, daß dagegen ein Papagei, der bald, wol gar in den ersten Tagen des Unterrichts schon, ein oder einige Worte annimmt, gewöhnlich ein guter Sprecher wird.

Abgesehen von der Begabung an sich aber, treten noch einige andere Bedingungen maßgebend ein; so muß vor allem jeder Papagei, den man unterrichten will, von vornherein voller und kräftiger Gesundheit sich erfreuen, ferner sorgsame Pflege genießen; schließlich kommt auch, wie schon gesagt, der mehr oder minder hohe Grad der Zahmheit inbetracht. Man behauptet, daß es Vögel gibt, welche niemals rein und klar, sondern nur lispelnd, heiser oder schnarrend sprechen lernen; meines Erachtens liegt dies jedoch immer viel mehr in der Schuld des Lehrmeisters. Uebrigens lasse man sich nur keinenfalls sogleich abschrecken, wenn ein Papagei das oder die ersten Worte trotz klarsten Vorsprechens undeutlich wiedergibt; dies ist nämlich anfangs bei allen mit sehr wenigen Ausnahmen der Fall, und erst nach mehr oder minder langer Uebung bringen sie das Wort voll und klar hervor.

Wohl zu beachten ist, daß selbst der vollständig eingewöhnte Papagei gegen jede Veränderung, gleichviel ergebe sich dieselbe in der Fütterung und Wartung, in der Behandlung oder in den Wohnungsverhältnissen, überaus empfindlich sich zeigt; er kann bei solcher Gelegenheit so aufgeregt und verdrießlich werden, daß er verstummt und für lange Zeit trübselig schweigend dasitzt. Darin ist auch die Ursache dafür zu suchen, daß die meisten sprechenden Papageien beim Verkauf aus einer Hand in die andre, wie schon S. 22 erwähnt, zunächst keineswegs ihre werthvollen Eigenthümlichkeiten kundgeben, und hierin wiederum liegt die leidige Thatsache begründet, daß es

Digitized by Google

kaum möglich ist, auf den Ausstellungen die hervorragendsten Sprecher zu prämiren; mindestens herrscht immer die Gefahr für die Preisrichter, eine große Ungerechtigkeit zu begehen, indem nämlich der eine Sprecher sich bald in die neuen Verhältnisse findet und also seine Kenntnisse zum besten gibt, während der andre, vielleicht weit werthvollere, hartnäckig sich weigert, das geringste hören zu lassen. Mancher hochbegabte und vorzüglich abgerichtete Papagei spricht auch niemals in Gegenwart eines Fremden, und da er erklärlicherweise infolgedessen bedeutsam an Werth verliert, so sollte man von vornherein darauf Gewicht legen, jeden Papagei so abzurichten, daß er durch die Anwesenheit fremder Personen sich garnicht stören läßt.

Bei den Händlern und Papageienlehrern in den Hafenstädten wird nicht selten ein Verfahren eingeschlagen, dessen ich wenigstens erwähnen muß, wenn ich es auch keinenfalls anrathen kann. Man verhängt den Käfig während der ganzen Zeit des Unterrichts mit einem Tuch, sodaß der Papagei, ganz ebenso wie der junge Kanarienvogel im Gesangskasten, fast völlig im Dunkeln sitzt und so bei Verhinderung jeder Störung und Zerstreuung ausschließlich auf seine Sprachstudien angewiesen ist

Für empfehlenswerther halte ich es, wenn man einen gezähmten, gesitteten und bereits sprechenden Papagei neben den wilden störrischen bringt. Alle großen, insbesondre die kurzschwänzigen Papageien, sind überaus kluge Vögel; sie sehen bald ein, daß dem Genossen nichts Böses geschieht, beruhigen sich an deren Beispiel und legen ihre Wildheit manchmal überraschend schnell ab. Auch nehmen sie von ihnen ungleich leichter die Nachahmung menschlicher Worte u. a. an als von dem Lehrmeister. So unterrichtete eine Müllerama-zone, die im Sprechen sowol wie im Singen Vieles leisten konnte, eine Rothbugamazone zum ebenso guten Sprecher. Bei Frau Baronin von Siegroth gab ein Graupapagei einer jungen

Digitized by Google

Amazone Unterricht; er sprach ihr eine Zeit lang Worte vor „und wenn sie nicht begriff, rief der Graue ‚Schafskopf' und drehte sich verächtlich um". Später, als der Grüne theils von seinem Gefährten, theils von seinen Besitzern Mehreres gelernt, unterhielten sich die beiden Vögel frühmorgens, wenn sie sich unbeachtet glaubten, förmlich. Die Dame hörte eines Morgens folgende Unterhaltung mit an. Rosa (so heißt der Graue): „Hast Du Geld?" Koko (so heißt der Grüne) in betrübtem Ton: „Nein." Rosa: „Rosa ist aus —" Koko: „Afrika." Rosa: „Kaiser Wilhelm", Koko: „Hoch!" Rosa: „Bataillon", Koko: „Marsch!" — Im Gegensatz zu dem zuletzt ertheilten Rath vermeide man es beim Beginn des Unterrichts zwei oder mehrere rohe Papageien in einem oder in an einander stoßenden Zimmern zu halten, weil sie sich gegenseitig stören und zum Kreischen aufmuntern würden.

Wer einen hervorragenden Sprecher, insbesondre einen Graupapagei oder Jako, eine große gelbköpfige Amazone oder einen ähnlichen Papagei vor sich hat, gelangt wol unwillkürlich zur wahren Begeistrung für das hochbegabte Thier. In solcher haben sich manche Schriftsteller freilich dazu hinreißen lassen, daß sie gar sonderbare Schilderungen der Leistungen eines derartigen Sprechers gegeben. „Nur zu oft", sagt Rowley mit Bezug hierauf, „hat man den Versuch gemacht, dem Vogel das volle, klare Verständniß der gesprochenen Worte beizumessen, ohne zu bedenken, daß die Parteilichkeit des Besitzers nur zu leicht sich selber täuscht — denn der Wunsch ist oft der Schöpfer der Vorstellung." Eine solche überschwengliche Auffassung kann man wol vermeiden, wenn man einfach auf dem Boden der Thatsächlichkeit stehen bleibt. Man halte nur immer daran fest, daß der Papagei wol Verstand, aber nicht Vernunft hat, daß er denken und auch urtheilen, aber nicht wie wir seelisch fühlen, empfinden kann. Es würde ein schwe-

Digitized by Google

res Unrecht sein, wollte man behaupten, daß der Papagei die Worte blos mechanisch nachplappern lerne, ohne jemals eine Vorstellung von ihrer Bedeutung zu haben. Wie rührend weiß er zu bitten, wenn er einen Leckerbissen zu erlangen wünscht, wie ärgerlich kann er schelten, wenn er denselben nicht bekommt, wie jubelt er vor Freude, wenn sein Herr nach langer Abwesenheit zurückkehrt und wie herzig ruft er willkommen! Beim Fortgehen wird er sicherlich stets lebwohl und nicht willkommen sagen, und wenn Jemand anklopft: herein; wenn er etwas wünscht: bitte, und wenn er es erhalten: danke! Wie aufmerksam lauscht er auf den Unterricht und wie bezeichnend weiß er seiner Freude Ausdruck zu geben, wenn er etwas Neues gelernt hat! Das sind Thatsachen, die Niemand bestreiten kann, sondern Jeder bestätigen muß, der einen solchen Vogel genau beobachtet hat. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. habe ich gesagt: In der That ist es richtig, daß der Papagei durch seine Sprachbegabung sich nicht allein hoch über andere Thiere erhebt, sondern daß er auch durch geistige Anlagen — nur der Hund dürfte ihm hierin gleichkommen — dem Menschen vorzugsweise nahe tritt. Diesen Ausspruch kann ich hier nur wiederholen, in der Ueberzeugung, daß ihn Niemand zu widerlegen vermag.

Nun habe ich noch den Hinweis anzufügen, daß beim lernenden Papagei mit dem Fortschreiten des Unterrichts sogleich eine staunenswürdige Werthsteigerung eintritt. Ein Graupapagei oder einer der sog. Amazonenpapageien, welchen man im ganz rohen Zustande zu Preisen von 20, 24, 30, 45 bis 60 Mk. einkauft, wird, wenn er ein oder zwei Worte spricht, mit der doppelten Summe, bei einigen Sätzen aber bis 200 Mk. und bei weitrer Abrichtung steigend mit 300 Mk. und weit darüber, wol gar bis 1000 Mk., bezahlt. Selbstverständlich werde ich bei den einzelnen Arten auch die Preise angeben.

Digitized by Google

Als einen Hauptvorzug aller Papageien überhaupt muß ich schließlich noch ihre Anspruchslosigkeit hervorheben. Wer es bedenkt, in welcher einfachen, fast mühe- und kostenlosen Weise solch' höchst werthvoller Vogel gehalten und verpflegt werden kann, wird mir zustimmen müssen. Eine nicht zu unterschätzende weitre Eigenthümlichkeit der Papageien, insbesondre der großen Arten, ist die schon erwähnte, daß sie ein überaus hohes Alter erreichen. Erklärlicherweise ist es nicht bekannt, wie alt sie in der Freiheit werden; im Käfige aber hat man Beispiele, besonders an Kakadus, auch an Graupapageien, Amazonen u. a. verzeichnet, nach denen sie sich hundert Jahre und weit darüber erhalten haben.

Noch weitere Vorschriften zum Papageien-Unterricht als die oben gegebenen sind weder bekannt, noch dürften sie nothwendig sein; denn wer einerseits die Neigung und andrerseits die Befähigung dazu hat, wird auf Grund meiner Anleitungen ja sicherlich jeden begabten, lernfähigen Vogel ausbilden können.

Gesundheitspflege.

Als eine Hauptaufgabe muß es der Liebhaber sprechender Papageien ansehen, einem derartigen Vogel in jeder Hinsicht ein so behagliches Dasein als irgend möglich zu schaffen, ihm Annehmlichkeiten aller Art zu bieten und schädliche Einflüsse von ihm fernzuhalten. Dazu bedarf es aber nicht allein einer zweckmäßigen Wohnstätte, angemessener und bester Fütterung, aufmerksamer und liebevoller Behandlung, sondern auch sorgsamster Gesundheitspflege. Die letztre bedingt vor allem, daß der Sprecher bewahrt werde vor jedem bedrohlichen Einfluß,

Digitized by Google

und zwar namentlich vor Zugluft, Naßkälte, raschem Temperaturwechsel, zu starker Hitze, Ofenwärme ebenso, wie sengenden Sonnenstrahlen, dunstiger, staubiger, mit schädlichen Gasen erfüllter oder sonstwie verdorbner Luft, schlechtem oder unpassendem Futter, verunreinigtem Wasser, Unreinlichkeit und Vernachlässigung überhaupt; auch Tabaksrauch zähle ich dazu, obwol die Erfahrung lehrt, daß ein Papagei sich an die schwüle, rauch- und dunstgeschwängerte Atmosphäre eines vielbesuchten Wirthshauses gewöhnen und darin lange Zeit ausdauern kann.

Einen Sprecher sollte man, selbst wenn er bereits seit Jahren sich in unserm Besitz befindet und also ein durchaus eingewöhnter Vogel ist, auch bei gutem, windstillem Wetter niemals vor ein offnes Fenster stellen, weil dort Zugluft unvermeidlich und diese ihm in jedem Fall schädlich ist. Will man ihn ins Freie hinaus bringen — und das ist ihm ja in der That sehr wohlthuend —, so darf es nur unter äußerster Vorsicht geschehen. Zunächst muß das Wetter warm und windstill sein und dann muß man einen Ort wählen, an welchem er vor jeder Luftströmung, sowie gegen die unmittelbaren glühenden Sonnenstralen geschützt ist, ebenso hat man dabei Nachtluft und Nebel zu vermeiden. Oft genug erkrankt ein Papagei trotz aller Vorsorge an Schnupfen, Hals- oder Lungenentzündung, ohne daß man eine Ahnung davon hat, woher die Ursache gekommen. Da hat ihn dann wol kalter Zug getroffen, der aus einem Nebenzimmer beim Oeffnen der Thür oder aus einer unbemerkten Thür- oder Fensterspalte gerade nach der Stelle strömt, wo der Käfig steht. Man beachtet nicht, daß jede Thür beim Auf- und Zuklappen Zugluft hervorbringt, welche manchmal auf weite Entfernung und nach einer Richtung hin, wo man es garnicht erwartet, empfindlich wirken kann. Für den Papageienkäfig, bzl. -Ständer muß

Digitized by Google

daher der Standort in jedem Zimmer mit großer Umsicht gewählt werden.

Am schlimmsten ergeht es den Papageien, wie allen Stubenvögeln überhaupt, gewöhnlich des Morgens beim Reinigen der Zimmer, wo sie nicht allein der Zugluft, sondern auch der von aufgewirbeltem Staub erfüllten naßkalten Luft und namentlich zu schnellem Temperaturwechsel ausgesetzt sind, indem beim Lüften der eisige Hauch einströmt, während der Vogel nicht genügend geschützt ist. Das Verdecken, selbst mit einem recht dicken Tuch, ist nicht ausreichend, man soll vielmehr den Käfig immer vor der Zimmerreinigung in eine andre gleichwarme Stube bringen. Eine arge Erkältung, an die man wol kaum denkt und die doch umsomehr unheilvoll werden kann, wird oft dadurch hervorgerufen, daß Jemand, aus kalter freier Luft oder einem ungeheizten Zimmer kommend, plötzlich an den Käfig tritt, wie dies beim Füttern unbedachterweise nur zu oft geschieht. Wenn der Papagei in einem derartigen Fall plötzlich und anscheinend ohne Veranlassung schwer erkrankt, so schiebt man es auf ‚die Weichlichkeit solcher Vögel', ohne zu berücksichtigen, daß von solcher bei verständnißvoller Eingewöhnung und wirklich zweckmäßiger Pflege garnicht die Rede sein kann.

Zu den entschieden schädlichen Einflüssen gehört sodann auch noch zu hohe Wärme, besonders in einem nicht genügend gelüfteten Zimmer, während die meisten Papageien dagegen niedere Wärmegrade, selbst bis etwa 5 Grad Kälte, ohne Gefahr ertragen können, wenn nur jeder schnelle Uebergang sorgsam vermieden wird. Am zuträglichsten ist für alle Vögel gewöhnliche Stubenwärme, also etwa 15° R.

Viele Papageienpfleger verhängen während der Nacht den Käfig ihres Lieblings mit einem Tuch. Man kann dies immerhin thun, namentlich bei frisch eingeführten, also

Digitized by Google

noch nicht eingewöhnten Vögeln, bei den als nicht kräftig und widerstandsfähig bekannten Arten oder bei sehr kostbaren Papageien; ferner mag es geschehen, wenn der Vogel in einem Zimmer steht, das sich zur Nacht bedeutend abkühlt oder in welchem der Sprecher bis spät abends beunruhigt und gestört wird, dadurch, daß viel Verkehr darin ist. Keinenfalls darf man es jedoch übertreiben, weil der Vogel dadurch sehr leicht verweichlicht werden kann. Man wähle also nicht ein dickes wollenes Tuch und wenn man im Winter ein solches für durchaus nöthig hält, so benutze man wenigstens für den Sommer ein leichteres. Ich empfehle Sackleinewand oder sorgsam gereinigte Säcke von starkem Hanf oder Jute. Dieselben haben den Vorzug, daß sie im Sommer nicht zu warm sind, während sie doch dazu genügen, im Winter die Kälte abzuhalten; außerdem sind sie noch insofern besonders geeignet, als die Vögel nicht leicht, wie bei vielleicht losen Woll- und Baumwollstoffen, Fasern abnagen können, durch deren Hinabschlucken schon oft Krankheiten verursacht worden.

Vorzugsweise großer Sorgfalt bedarf die Pflege des Gefieders und sie sollte solche bei allen Stubenvögeln, vornehmlich aber bei den Papageien, finden. Man muß es gesehen haben, um zu glauben, in welchem trübseligen Zustande unsere gefiederten Gäste aus den Tropen in der Regel anlangen: zerlumpt, manchmal fast ganz nackt, wol gar an vielen Körperstellen blutrünstig, die Endgelenke der Flügel abgeschlagen, durch fortwährendes unbändiges Aufschlagen blutend oder gar geschwürig, mit den harten noch festsitzenden Federstümpfen, an Unterleib und Füßen, zuweilen am ganzen Körper, arg beschmutzt, im günstigern Fall bei besserm Gefieder doch die Federn an einem, gewöhnlich aber an beiden Flügeln und selbst am Schwanz arg verschnitten. Wollte man nun den bedauernswerthen Ankömmling sogleich in eine gründliche

Digitized by Google

Federpflege nehmen, so würde man ihn allerehestens umbringen; es darf vielmehr erst ganz allmälig und mit größter Vorsicht geschehen.

Nachdem der Papagei sich völlig beruhigt und einigermaßen eingewöhnt hat, wozu er wol vier bis sechs Wochen bedarf, widme man seinem Gefieder die entsprechende Aufmerksamkeit. Die Händler benässen den ganzen Körper vermittelst des Mundes entweder blos mit lauwarmem Wasser oder mit solchem, unter das etwa zum vierten Theil Rum oder Kognac gemischt ist. Der Liebhaber kann dies vermittelst einer kleinen Douche-Spritze oder eines Verstäubers ausführen. Nur muß man dem Vogel das alkoholhaltige Wasser nicht in Schnabel und Augen kommen lassen. Man stellt den Käfig ohne Schublade in eine Wanne und spritzt nun von allen Seiten, sodaß der ganze Körper gut benäßt wird. Anstatt dessen kann man an heißen Sommertagen auch einen Gewitterregen benutzen. In jedem Fall aber muß man den Papagei beim Baden und nach demselben gegen jede Erkältung durchaus sorgsam hüten; er muß also in Stubenwärme von mindestens 15° stundenlang oder doch bis zum völligen Abtrocknen des Gefieders verbleiben. Das Bad darf etwa alle vier Wochen einmal, bei heißem Wetter auch öfter, gegeben werden, und der Vogel gewöhnt sich sehr bald so daran, daß es ihm augenscheinlich einen Genuß gewährt. Bei den mittleren und kleineren Papageien ist das gewaltsame Abbaden nur in dem Falle nothwendig, wenn sie sich nicht freiwillig selber baden wollen; um letztres aber zu erreichen, steckt man ihnen wol einen belaubten gut durchnäßten Zweig in den Käfig, an dessen Blättern sie sich meistens noch lieber als im freien Wasser das Gefieder einnässen. Sobald sie erst an das Baden gewöhnt sind, erhalten sie möglichst oft, im Sommer an jedem warmen Tage, und sonst wenn die Stube recht erwärmt ist, den Badenapf

Digitized by Google

in den Käfig. Zuvor muß dann aber der Sand aus der Schublade entfernt und diese mit Papier belegt werden. Nach dem Baden trocknet man sie gut aus und bestreut sie wieder mit frischem Sand. Mit dem Baden allein ist jedoch die Gefiederpflege noch beiweitem nicht erschöpft. Zunächst muß man allen Papageien wenigstens die Gelegenheit dazu bieten, daß sie im Sande paddeln und sich auch darin das Gefieder abbaden können; die meisten thun es mit großem Eifer. Der Sand muß die S. 48 erwähnte gute Beschaffenheit haben und namentlich völlig trocken und staubfrei sein.

Ein schwieriger Punkt der Gefiederpflege ist dann das Entfernen der alten Stümpfe von abgestoßenen, bzl. verschnittenen Federn. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die meisten Papageien, insbesondre aber die großen, in der Gefangenschaft keine regelmäßige Mauser (Federwechsel) durchmachen, sondern daß die wohlthätige Erneuerung der Federn gar lange Zeit, oft Jahre währt. Es bleibt in der Regel nichts andres übrig, als daß man die Federstümpfe gewaltsam fortbringt. Hierzu bedarf es natürlich großer Umsicht und Sorgsamkeit. Man zieht, nöthigenfalls mit einer kleinen Zange, etwa alle vier bis sechs Wochen abwechselnd an der einen und dann an der andern Flügelseite und späterhin gleicherweise am Schwanz jedesmal einen bis drei Stümpfe aus. Dies muß geschickt und rasch geschehen und man muß sich inachtnehmen, den Vogel dabei an der btrf. Stelle oder sonstwo am Körper zu drücken oder überhaupt zu beschädigen. Sollte er trotzdem blutrünstig werden, so betupfe man die Stelle mit einem Gemisch von je 1 Theil Arnika-Tinktur und Glycerin mit 20 Theilen Wasser. Starke Blutungen, das sei hier gleich nebenbei bemerkt, stillt man durch Eintauchen in Eisenchloryd-Flüssigkeit (Liquor ferri sesquichlorati), 1 Theil mit 100 Theilen Wasser verdünnt, und Auflegen von frischgebrannter Lunte aus reiner Leinewand.

Digitized by Google

Wie bei jedem Vogel muß man auch beim Papagei hartes festes Anpacken (eigentlich Anfassen überhaupt) möglichst vermeiden, vor allem aber hüte man sich, eine frisch hervorsprießende Feder mit noch blutigem Kiel abzubrechen oder auszuzupfen. Dadurch würde einerseits das Gefieder häßlich und andrerseits könnte die Gefahr einer starken Blutung und Entkräftung eintreten. Erklärlicherweise ist es rathsam, daß man das Ausziehen der Federstümpfe, sowie jede andre schmerzhafte oder auch nur unangenehme derartige Behandlung niemals, insbesondre aber nicht bei frisch eingeführten, kürzlich in den Besitz gelangten Papageien, selber ausführe, sondern dies von einer fremden Person thun lasse; dieselbe muß aber jedenfalls durchaus zuverlässig, nicht roh und ungeschickt, sondern wenn möglich schon in dergleichen *geübt* sein.

Bevor ich auf die eigentlichen Krankheiten der Papageien eingehe, muß ich noch die bereits beiläufig erwähnte *Mauser* oder den *Federwechsel* berühren, welchen man wenigstens bedingungsweise als eine Erkrankung ansehen kann. Während unsere einheimischen Vögel dieselbe bekanntlich alljährlich mehr oder minder regelmäßig durchmachen, stockt sie, wie schon gesagt, bei den meisten Papageien, und man hat es noch nicht feststellen können, ob dies naturgemäß begründet oder nur eine Folge der Gefangenschaft sei. Gleichviel aber — die Papageienpfleger müssen diesem Umstand Rechnung tragen. Bei der Federpflege habe ich Anleitung dazu gegeben, in welcher Weise die sonst wol jahrelang festsitzenden Federstümpfe zu entfernen sind. Dies muß jedoch nicht allein des schönern Aussehens wegen, bzl. um die möglichst baldige Erneuerung der Schwingen und Schwanzfedern an sich zu erreichen, geschehen, sondern es ist auch zur Erhaltung oder Herbeiführung des Gesundheitszustands überhaupt nothwendig. Wenn der Papagei infolge der Einflüsse der Gefangenschaft lange Zeit in demselben schad-

Digitized by Google

haften Gefieder verharrt, so liegen darin mancherlei Gefahren, und man sucht daher durch das Auszupfen der Federn eine künstliche Mauser zu bewirken.

Dabei vergesse man nicht, daß die jeder ausgezupften Feder entsprechende am andern Flügel oder an der andern Schwanzseite immer von selber ausfällt, daß es also eine unnütze Mühe und Quälerei für den Vogel sein würde, wenn man z. B. die drei ersten Schwingen an jedem Flügel zugleich ausziehen wollte. Behält ein alter Papagei ein tadellos schönes Gefieder jahrelang ohne Erneuerung, so ist es keineswegs nothwendig, etwa aus Vorsorge eine künstliche Mauser herbeizuführen; man lasse ihm vielmehr nur eine angemeßne Federpflege zutheil werden. Dazu gehört vor allem sorgsame Körperpflege im allgemeinen, also regelmäßige, reichliche und besonders nahrhafte Fütterung und Einhaltung aller übrigen Verpflegungsmaßregeln, die ich bereits angegeben. Man wolle beachten, daß bei abgezehrten schwachen und alten Vögeln der Federwechsel immer am schwierigsten vor sich geht, und daher sollte man im Beginn desselben, insbesondre wenn man ihn künstlich hervorgerufen, recht kräftig ernähren: Bester Hanfsamen, etwas Eierbrot oder Biskuit, auch wol ein Theelöffel voll frische Ameisenpuppen, dann täglich ein Theelöffel voll guter Wein und vielleicht auch täglich 1 bis 3, höchstens 5 Tropfen apfelsaure Eisen-Tinktur im Trinkwasser oder mit dem Wein auf Biskuit sind sehr zu empfehlen; schließlich namentlich noch warmer trockner Aufenthalt und zeitweiliges Baden.

Im Gefieder großer Papageien bildet und sammelt sich Federstaub oft in beträchtlicher Menge an, und abgesehen von der Nothwendigkeit der Bewegung an sich, muß jeder Papagei auch deshalb einen möglichst großen Käfig haben, damit er flügelschlagend den ganzen Körper ordentlich auslüften kann. Für den Fall, daß der Käfig, wie ja leider nur zu oft, nicht

Digitized by Google

den ausreichenden Umfang hat, muß man den Papagei täglich für eine mehr oder minder lange Frist herauslassen und ihn daran gewöhnen, daß er auf dem S. 32 beschriebnen Sitzplatz oberhalb des Bauers sich genügend ausschwinge. Hat man einen bissigen unbändigen Vogel vor sich, den man nicht aus dem Käfig freilassen darf oder ist er schon ein alter Veteran, welcher freiwillig nicht mehr hervorkommen will und beim gewaltsamen Hervorziehen, weil er nicht daran gewöhnt ist, sich wol gar abängstigt, so durchpuste man ihm hin und wieder das Gefieder vermittelst eines kleinen Hand-Blasebalgs oder einer Kautschukspritze. Selbst wenn er bei den ersten Malen sehr ängstlich sich zeigt, wird er sich doch bald darin fügen und nach kurzer Zeit sogar das Gefieder freiwillig dem künstlichen Winde entgegenhalten. Wenn der Federstaub garnicht entfernt wird, so kann er durch Verstopfen der Poren, Unterbrechung der Hautthätigkeit und damit Geschwüre, innere Krankheiten oder auch arges Jucken hervorbringen, welches letztre wol gar zu der unseligen Angewohnheit des Selbstrupfens führt.

Ein gut gehaltner Vogel, gleichviel welcher, darf auch niemals vernachläßigte Füße zeigen, denn wenn dieselben unreinlich, verklebt, wund und geschwürig sind, so können sie nicht selten Ursache zu Erkrankungen und Tod werden. Reinlichkeit, immer trockner Sand und häufig Badewasser sind die besten Erhaltungsmittel; vor allem aber bedarf der Papagei durchaus naturgemäßer Sitzstangen (s. S. 31). Den vernachläßigten Fuß reinigt man vermittelst einer weichen Bürste mit warmem Seifenwasser (doch ist auch dabei Erkältung sorgsam zu vermeiden) und bestreicht ihn dann mit verdünntem Glycerin (1 : 10) oder dünn mit bestem Olivenöl. Die Krallen brauchen nur selten verschnitten zu werden, weil sie beim Papagei, der ausreichende Gelegenheit zum Klettern hat, nicht übermäßig wachsen; wird es nothwendig, so muß es mit großer Vorsicht geschehen.

Digitized by Google

Krankheiten*).

Immer habe ich es hervorgehoben, daß die Krankheiten der Vögel für mich als das schwierigste Gebiet erscheinen. Ich bin nicht medizinischer Fachmann genug, um eine wissenschaftliche Darstellung geben zu können, andrerseits aber bin ich zu gewissenhaft, um mich blos in oberflächlicher Weise mit diesem wichtigen Gegenstande zu beschäftigen. Bis vor kurzem war diese Seite der praktischen Vogelpflege außerordentlich vernachlässigt, und erst in allerneuster Zeit ist sie vornehmlich durch die Arbeiten des Herrn Professor Dr. Zürn („Die Krankheiten des Hausgeflügels", Weimar 1882) systematisch wissenschaftlich behandelt worden. Während ich in meinen früheren Werken, insbesondre in dem „Handbuch für Vogelliebhaber", mich bei der Besprechung der Krankheiten lediglich auf meine eigenen langjährigen Erfahrungen stützte und nach denselben sowol die Diagnose stellte, als auch die Behandlung vorschlug, will ich meine Anleitungen jetzt dahin erweitern, daß ich in denselben, soweit es mir möglich ist, auch auf die Zürn'schen wissenschaftlichen Darstellungen Bezug nehme.

Trotzdem sei jedoch auch hier von vornherein darauf hingewiesen, daß für den Vogelliebhaber, -Pfleger und -Züchter die Hauptaufgabe immer ganz entschieden darin beruht, die Krankheiten zu verhüten, welche man kaum oder noch garnicht zu heilen vermag. Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich die voraufgegangenen Rathschläge für die Gesundheitspflege der Vögel gegeben und will ich nun in Folgendem auch die Krankheiten überblicken.

Sobald ein Papagei anfängt, das Gefieder zu sträuben, insbesondre am Hinterkopf und Nacken, wenn er oft gähnt und mit dem Kopf schüttelt, den letztern sodann in die Federn steckt, wie frierend zittert oder zusammenschauert, so sind das verdächtige Zeichen, welche den Besitzer daran gemahnen, den Vogel aufmerksam zu beobachten.

*) Am Schluß dieses Abschnitts finden die Leser eine Aufzählung der sämmtlichen angerathenen Arzneimittel mit Angabe der Zubereitungs- und Gaben-Verhältnisse. Die Zahlen im Text bedeuten die jedesmalige Arzneimittelform, welche in dem betr. Fall zur Anwendung kommen soll.

Digitized by Google

Das seltsame Knirschen mit dem Schnabel, welches ein Papagei aus Unbehagen, manchmal sogar blos aus übler Angewohnheit, hören läßt, sowie gesträubte Nackenfedern an sich, haben in der Regel nicht viel zu bedeuten; schlimmer ist der schmatzende Ton, welchen ein anscheinend ganz gesunder Papagei am stillend Abend hin und wieder ausstößt, auf den dann wol bald öfteres Räuspern, Husten oder Schnarchen und beschwertes Athemholen mit offnem Schnabel und als noch ernsteres Krankheitsanzeichen: Ausfluß aus Schnabel oder Nasenlöchern folgen; selbst eine dauernde Feuchtigkeit der letzteren allein erfordert schon Beachtung. Ein Hauptkennzeichen der Gesundheit, bzl. des Unwohlseins, bildet weiter die Entlerung. Beim naturgemäß gehaltnen ganz gesunden Papagei besteht sie immer in zwei Theilen, einem dicklichen schwärzlichgrünen und einem dünnen weißen zugleich. Sobald beide breiig in einander verlaufen oder der eine überwiegt, die Entlerung entweder gleichmäßig grünlichgrau oder weißschleimig, wol gar wässerig wird, ist der Vogel nicht mehr vollkommen gesund. Alle schweren innerlichen Krankheiten der Papageien sind schwierig zu heilen, schon von vornherein deshalb, weil es bei jedem Vogel schwer hält, eine richtige Diagnose zu stellen, d. h. mit Sicherheit zu ermitteln, welche edelen Organe von der Krankheit befallen sind und welche üblen Einwirkungen sie auf dieselben äußert. Herr Prof. Dr. Zürn hat nun zwar in dankenswerther Weise eine große Zahl solcher Krankheiten beschrieben, ihre Erkennungszeichen angegeben und Heilmittel vorgeschlagen, doch ich meine, daß es vielfach selbst für den recht gebildeten Vogelwirth schwierig, ja kaum möglich sein wird, am lebenden Vogel jene Krankheitszeichen aufzufinden und sodann auch nicht minder schwer, den kranken Vogel der btrf. Behandlung zu unterwerfen. Letztre Schwierigkeit fällt leider vorzugsweise ins Gewicht, denn man kann in der That eine Krankheitserscheinung sicher erkannt und ein heilkräftiges Mittel zur Hand haben — ohne wirklich Gebrauch davon machen zu können, indem der Vogel es gutwillig nicht einnimmt, während er, falls man Gewalt anwendet, dadurch so erregt wird, daß eine noch viel größre Gefahr eintritt; insbesondre bei schweren innerlichen Krankheiten sollte man das gewaltsame Eingeben möglichst unterlassen. Nur selten wird aber allerdings ein kranker Papagei so folgsam sein, widerwärtig schmeckende Arznei freiwillig zu nehmen.

Digitized by Google

Schnupfen (Katarrh der Nasen-, Rachen- und Mundhöhle, auch Pips). Krankheitszeichen: Niesen, gelber und schleimiger Ausfluß aus den Nasenlöchern, der sich in Krusten ansetzt, Schlenkern oder Schütteln mit dem Kopf, Auswerfen von Schleim. Heilmittel: Wärme und Trockenheit, Einathmen von Theerdämpfen 84), Einpinseln von gutem Fett, auch Auspinseln des Schnabels und Rachens mit Auflösung von chlorsaurem Kali 37) [Zürn]; Reinigen der Nasenlöcher und des Schnabels mit einer in Salzwasser getauchten Feder und dann Auspinseln mit Mandelöl.

Katarrh der Luftröhre (auch Rachen-, Kehlkopf- und Halsentzündung). Krankheitszeichen: Heiserkeit, Husten, beschleunigtes Athmen, mit Rasseln oder Röcheln. Heilmittel: Eingeben von Süßigkeiten, wie Honig, auch wol Zuckerkand und reinem Lakritzensaft; sodann Salmiak-Mixtur 76), täglich mehrmals ½—1 Theelöffel; Dulkamara-Extrakt 19) täglich zweimal ½—1 Theelöffel; ferner gelinde Theer- 84) oder Holzessigdämpfe 30) einzuathmen [Zürn]. Nur verschlagnes oder schwach erwärmtes Trinkwasser, Auspinseln des Mundes bis tief in den Schlund hinein, auch der Nasenlöcher mit Salicylsäure-Wasser 73). Erleichterung gibt es, wenn der Vogel in warmer und feuchter Luft gehalten wird; man spritzt vermittelst eines Verstäubers täglich einigemal lauwarmes Wasser um ihn her, während das Zimmer etwa 18—24 Gr. R. Wärme hat.

Lungenentzündung. Krankheitszeichen: Erschwertes oder kurzes, schnelles, pfeifendes Athmen mit aufgesperrtem Schnabel, heiße Brust, Traurigsein, mangelnde Freßlust, deutlich wahrnehmbares Fieber, schmerzhafter Husten, Auswurf von gelbem, zuweilen mit blutigen Streifen vermischtem Schleim [Zürn]; schmatzender oder keuchender Ton, besonders des Abends in der Stille zu hören. Heilmittel: Feuchte warme Luft wie vorhin; sodann nach Zürn: Pillen von kohlensaurem Ammoniak 5) täglich zwei- bis dreimal oder gereinigter Salpeter 77) dreistündlich zu geben. Bei katarrhalischer Lungenentzündung, auch die bei Luftröhrenkatarrh angerathenen Mittel.

Der Luftröhrenwurm oder Kehlkopfswurm (Syngamus trachealis s. Strongylus Syngamus) tritt als einer der unheilvollsten thierischen Schmarotzer, ebenso bei allen Stubenvögeln wie beim Hofgeflügel auf. Er erscheint blutegelähnlich, walzenförmig, doch nach hinten zugespitzt, röthlich; Männchen 4—5 mm, Weibchen 12—13 mm

Digitized by Google

lang, Dicke 0,5 — 0,6 mm; Eier zylindrisch, Länge 0,11 mm, Dicke 0,036 mm. Mit starker Mundkapsel, welche ähnlich wie ein Schröpfkopf wirkt, saugt er sich in der Schleimhaut des Kehlkopfs oder der Luftröhre einzeln oder zu mehreren fest, verursacht Röthung, Anschwellung, dicken zähen Schleimbelag und dadurch, sowie durch seinen sich immer mehr vollsaugenden Körper selbst, Erstickung. Krankheitszeichen: Eigenthümlicher Husten, Hin- und Herschleudern des Kopfs, Athemnoth, Schnabelaufsperren, Luftschnappen, Schleimauswerfen. Uebertragung: dadurch, daß der Kranke selbst oder ein andrer Vogel den ausgeworfnen Schleim, in welchem sich massenhaft Eier des Schmarotzers befinden, auffrißt. Vorbeugungsmaßregel: Strengste Absondrung jedes frisch ankommenden, sowie eines kranken Vogels und sorgsamste Beobachtung; trockner gut gelüfteter Aufenthalt und äußerste Reinlichkeit. Bei massenhaftem Auftreten: Abscheuern der Käfige und Wände mit heißem Seifen- und Karbolsäurewasser 49). Futter- und Wassergeschirre ebenso gründlich auszuscheuern. Heilmittel: Besichtigung des Kehlkopfs und Herausnehmen des Wurms vermittelst Pinzette [Zürn]; Einpinseln von reinem Terpentinöl 83) oder Benzien, Einathmen von Kreosotdämpfen 54); Eingeben von ½—1 Theelöffel voll reines Leinöl.

Diphtheritis und Kroup (diphtheritisch-kroupeuse Schleimhautentzündung; volksthümlich: Bräune, Rotz, gelbe Mundfäule, gelbe Knöpfchen, Schnörgel u. a.), wird durch pflanzliche Schmarotzer, Kugelspaltpilze, Gregarinen*) genannt, hervorgerufen. Krankheitszeichen: Husten, Niesen, schweres Athmen bei geöffnetem Schnabel, Kopfschütteln, Auswurf von süßlich riechendem Schleim, auch Schlingbeschwerden, Luftschnappen und zunehmende Athemnoth unter Schnarchen und Röcheln, zunehmende Mattigkeit, Sitzen am Boden flügelhängend mit geschlossenen Augen (zugleich fast immer Darmkatarrh mit wässrig-schleimigen Auslerungen), dann Zittern und Schüttelfrost und Durst. Der Sitz der Krankheit sind die Schleimhäute des Mauls, Rachens, Kehlkopfs, der Luftröhre, der Bronchien und des Darms, auch die Nasenschleimhäute, Bindehäute und Hornhaut der

*) Die Gregarinen oder Psorospermien sind mikroskopische Lebewesen, welche neuerdings meist für pflanzliche, herdenweise (von grex) auftretende und verschiedene schwere Krankheitserscheinungen an Menschen und Thieren verursachende Organismen angesehen werden [Zürn].

Digitized by Google

Augen. Aus den Naſenlöchern quillt gelbe ſchleimige ſchmierige Flüſſigkeit, die ſich in dunkelgelben oder bräunlichen Kruſten feſtſetzt; die Augenlider ſchwellen an und werden verklebt. Dauer der Krankheit gewöhnlich zwei bis drei Wochen, doch auch 60—70 Tage. Vorbeugungsmittel: Unterſuchung jedes neu angeſchafften Vogels und Abſondrung zur Beobachtung; ſtrengſte Abſondrung jedes Erkrankten; ſofortige Vernichtung der Geſtorbenen und ſorgfältigſte Reinigung der Käfige und Geſchirre mit Karbolſäure-Waſſer 49). Heilmittel: In der Regel iſt der Kranke verloren und es erſcheint als Hauptaufgabe, jede Anſteckung, die durch die geringſte Berührung von Ausſonderungen der ergriffenen Theile bewirkt werden kann, zu verhindern. Eingeben von Karbolſäure-Waſſer 43) und Bepinſeln oder Beſprengen vermittelſt des Verſtäubers der erkrankten Schleimhautſtellen mit demſelben 43). Die Kruſten müſſen mit mildem Fett erweicht, nicht mit Gewalt fortgeriſſen werden. Auch Höllenſteinauflöſung 28) zum Pinſeln und dann Nachpinſeln von Kochſalzauflöſung 51), ſelbſt Jod-Tinktur 33) und für die Augen Salicylſäure-Waſſer 73), Auflöſung von Kupfervitriol 55) und Tanninauflöſung 82). Innerlich gibt man chlorſaures Kali 36), täglich dreimal einen Theelöffel voll und äußerlich pinſelt 37) man mit ſolchem.

Auch eine Bronchien- und Lungenentzündung wird durch Schimmelpilze hervorgerufen. Krankheitszeichen: Heiſerkeit, Schnarchen, raſſelndes Athmen, Fieber, mangelnde Freßluſt, ſtarker Durſt, dann baldige ſtarke Abmagerung, ſchließlich auch Durchfall. Verlauf 6—8 Tage, manchmal bis zwei Monate. Vorbeugungsmittel: Einathmen von ſchwachen Theerdämpfen 84); äußerſte Reinlichkeit und ſtrengſte Abſonderung jedes verdächtigen Vogels. Heilmittel: Einathmen von Jodtinktur 35); meiſt jedoch dem Tode verfallen.

Tuberkuloſe. Häufig auftretend und zwar nicht allein in den Lungen, ſondern vornehmlich in der Leber, ferner auch in Herz, Herzbeutel, Milz, Nieren, Magen, Eierſtock, Därmen u. a. m. Krankheitszeichen: Abmagerung und Geſchwülſte an den verſchiedenſten Körpertheilen. Man muß ſie nach der bisherigen Kenntniß als unheilbar anſehen und zugleich als erblich — ſodaß man alſo die Nachkommen daran geſtorbener Vögel nicht zur Zucht verwenden darf.

Verdauungsſchwäche. Krankheitszeichen: Mangelnde Freßluſt, wenig brauner feſter Koth, Trägheit. Urſachen: unpaſſendes oder verdorbnes Futter und dadurch unrichtige Beſchaffenheit der

Digitized by Google

Galle u. a. Verdauungssäfte. Heilmittel: Leichtes Futter, wenig Grünfutter, etwas Salz und schwach erwärmtes Trinkwasser; gute Dienste leistet ein Theelöffel voll lauwarmen Rothweins nebst Zugabe von ein wenig Süßmandel oder Wallnuß. Zürn empfiehlt auch Aufguß von Pfefferminzkraut 68) oder Kalmuswurzel 39) mit doppeltkohlensaurem Natron dreimal täglich einen Theelöffel, doch möchte ich dazu bei Papageien kaum rathen. In England gibt man eine Schote Kayennepfeffer 50) oder etwas Aufguß davon ins Trinkwasser.

Blähsucht, auch Windgeschwulst genannt; erscheint als flache weiße Anschwellung; kommt vornehmlich bei jüngeren Vögeln vor, begründet sich in Verdauungsstörungen, wird also durch unpassendes, verdorbnes oder zu reichliches Futter hervorgerufen; entsteht aber auch nach Bissen. Im leichtern Grade heilbar durch knappe und magre Fütterung und vorsichtiges Aufstechen der blasenartigen Anschwellung; die Luft entweicht dann bei gelindem Druck und man reibt darauf die Stelle mit erwärmtem Oel ein oder wenn man ein größres Loch hineingeschnitten, verklebt man dasselbe mit Kollodium 52).

Magen- und Darmentzündung (Magen- und Darmkatarrh, auch Unterleibsentzündung), kommt leider sehr häufig vor. Ursache: saxer gewordnes oder sonstwie verdorbnes Futter, eiskaltes Trinkwasser, Erkältung des Unterleibs, Fressen irgendwelcher schädlichen ätzenden oder gar giftigen Stoffe, auch zu frischer Sämereien oder nassen Grünkrauts, sodann, wenn auch selten, Hinabschlucken von Metall, Knochen, Glas, Steinchen u. a. Krankheitszeichen: mangelnde Freßlust, Durst, Würgen und Erbrechen, schleimige bis blutige Entlerung, Schüttelfrost, Hinfälligkeit; der Vogel sitzt fortwährend am Futtertrog und sucht umher, ohne zu fressen; manchmal erscheint der Unterleib aufgetrieben und geröthet. Heilmittel je nach der Ursache verschieden: Ruhe, warmer Breiumschlag; auch wol handwarmer Sand, doch dauernd gleichmäßig warm zu halten; Tanninauflösung 82), auch wol Glaubersalz als Abführmittel 23) täglich ein- bis zweimal; bei Magenverletzung durch Glas u. a. Leinsamenschleim mit wenig Oel, doch meist vergeblich. — Die bereits S. 78 erwähnten Gregarinen verursachen gleichfalls Darmentzündung, welche sich in heftigem Durchfall, baldigster außerordentlicher Hinfälligkeit und raschem Sterben kennzeichnet. Um sie festzustellen, muß man die Entlerungen mikroskopisch untersuchen. Heilmittel: Unterschwefligsaures Natron 63),

Digitized by Google

täglich zweimal. Nach Zürn's Entdeckung reines Glyzerin täglich einen Theelöffel voll und Salicylsäure-Auflösung 73).

Als Vergiftungen kommen eigentlich nur drei bei Papageien inbetracht: durch bittre Mandel, fortgeworfene Streichhölzchen, also Phosphor und Oxal- oder sog. Zuckersäure beim Putzen des Käfigs; eine wie die andre können ja nur durch Unvorsichtigkeit eintreten und als Vorbeugungsmittel ist daher Vorsicht zu empfehlen. Kennzeichen bei Vergiftung durch bittre Mandel: Beängstigung, Taumeln, Umfallen und Unfähigkeit sich zu erheben; Zittern, Krämpfe. Heilmittel: Eintauchen in kaltes Wasser oder Begießen mit solchem; Eingeben von Salmiakgeist 75) oder Hoffmannstropfen 29) halbstündlich und etwa dreimal. — Kennzeichen bei Vergiftung durch Phosphor: Gesträubte Federn, mangelnde Freßlust, Durchfall, Hinfälligkeit. Heilmittel: Chlorflüssigkeit 15) halbstündlich; reines Terpentinöl 83), auch Eiweiß. — Kennzeichen bei Vergiftung mit Oxalsäure: Taumeln, Kraftlosigkeit, Krämpfe. Heilmittel: Eiweiß u. a. Schleim, gebrannte Magnesia 60). Bemerkt sei, daß die Erkennung in allen drei Fällen erklärlicherweise ebenso unsicher ist wie die Behandlung und daß die letzre also nur dann Aussicht auf Erfolg gewähren kann, wenn man sich selber davon zu überzeugen vermag, daß eine und welche Vergiftung stattgefunden, während andrerseits auch mancherlei andere Krankheiten ähnliche oder gleiche Kennzeichen haben. Uebrigens wird man beim Verdacht jeder Vergiftung einhüllenden Schleim, Eiweiß, Altheewurzel- oder Leinsamenabkochung und kohlensaure oder gebrannte Magnesia 60) mit Vortheil geben.

Durchfall (Diarrhoe, auch Kalkschiß oder im Gegensatz schwarzer Brand) kann verschiedene Ursachen haben und daher auch in verschiedenen Krankheitserscheinungen auftreten. Bei jedem Papagei ist es nothwendig, täglich die Entlerung nachzusehen, ob sie die S. 76 erwähnte Beschaffenheit habe; beginnt sie mehr weißlich oder gelblich und schleimig zu werden, kleben die Federn am Hinterleib zusammen, zeigt sich die Entlerungsöffnung aufgetrieben oder gar entzündet, so ist der S. 80 erwähnte Darmkatarrh vorhanden und die dort angegebenen Mittel sind anzuwenden. Werden die Entlerungen weißgrünlich oder schokoladenfarbig, dann immer mehr grün bis schwarzgrün und von saurem oder üblem Geruch, hört die Freßlust ganz auf, während der Kropf gefüllt bleibt und großer Durst eintritt, so ist starke Darm- oder Magenentzündung vorhanden und

Digitized by Google

gleichviel durch welche Ursache sie hervorgerufen, der Vogel meistens verloren. Heilmittel: Wärme, Nichtstopfen des Durchfalls, Reiswasser, kohlensaure Magnesia 60) oder andrer Schleim; wenn ruhrartige Erscheinungen: starkes Drängen und Schwippen mit dem Hinterleib, auch wol blutige Entlerung, so gibt man ½ bis 1 Theelöffel voll Rizinusöl 72) mit dem Schleim; bei schwärzlicher Entlerung Rothwein, ½—1 Theelöffel voll ein- bis dreimal täglich, ferner Opiumtinktur 65) täglich zweimal, schließlich auch wol Höllensteinauflösung 27) täglich zweimal 1 Theelöffel voll. Die festgeklebten Federn am Hinterleib müssen mit warmem Wasser abgewaschen werden.

Verstopfung kann erklärlicherweise ebenfalls in verschiedenen Krankheitsursachen begründet sein, an sich aber in: Verdauungsstörungen und Eingeweidewürmern; Krankheitszeichen: Drang zum Entleren, Wippen mit dem Hinterleib, Federnsträuben, Traurigkeit, Mangel an Freßlust. Heilmittel: vor allem der Versuch mechanischer Entlerung durch ein Klystir, d. h. Hineinbringen eines in erwärmtes Oel (Rizinus- und Olivenöl zu gleichen Theilen) getauchten Nadelkopfs in die Entlerungsöffnung, wodurch nach vielleicht mehrmaliger Wiederholung sich manchmal angesammelte unglaublich große Kothmassen entleren; auch bloßes Wasserklystir vermittelst einer Gummiballspritze mit dünner rundgeschmolzner Glasröhre als Spitze; Eingeben von Rizinusöl mit Schleim, 1 Theelöffel voll ein- bis zweimal täglich.

Typhus (seuchenhaftes Typhoid, beim Geflügel Cholera genannt). Ursache: Mikrokokken und Bakterien, also mikroskopische pflanzliche Schmarotzer, welche sich sehr leicht übertragen, bzl. nur zu sehr ansteckend wirken. Kennzeichen: mangelnde Freßlust, mattes Dasitzen mit hängenden Flügeln, Hinfälligkeit, starker Durchfall mit Entlerungen von dünnem weißgelben Schleim (schleimiger oder Kalkdurchfall), welche dann grünlich werden und den Unterleib stark beschmutzen, manchmal auch Erbrechen von dünnem grünlichen Brei, starker Durst, Zittern, hochgesträubte Federn, Taumeln, Tod unter Krämpfen; Zeitdauer 1½ bis 3 Tage, manchmal aber wochenlang. Bei Papageien leider nicht selten. Vorbeugungsmittel: sorgfältigste Absondrung aller neu angeschafften und jedes in der beschriebnen Weise erkrankten Vogels; sorgsamste Desinfektion 17) und äußerste Reinlichkeit; ist die Krankheit ausgebrochen, so gibt man den noch

Digitized by Google

gesund gebliebenen Vögeln Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxydul 20) ins Trinkwasser und zwar 14 Tage hindurch. Heilmittel: gleichfalls Auflösung von schwefelsaurem Eisen-Oxidul 20) 1 Theelöffel voll drei- bis viermal täglich; im übrigen ist kaum Rettung möglich.

Blutvergiftung (Sepsis oder Hungertyphus) ist bereits S. 13 bei der Besprechung der Einführung gekennzeichnet und ich bitte, zunächst dort über die Ursache nachzulesen. Die betreffenden Papageien (vornehmlich Graupapageien) kommen also anscheinend kerngesund, namentlich vollleibig, munter und mit klaren Augen in Europa an, sind aber, wie erwähnt, in spätestens acht Wochen, meistens viel früher, fast ohne Ausnahme Todeskandidaten und zwar am raschesten bei Darreichung von Trinkwasser (welches ihnen daher von den Händlern durchaus vorenthalten wird). Krankheitserscheinungen: Sträuben des Gefieders, insbesondre im Nacken, mattes trauriges Dasitzen, Veränderung der nackten Haut um die Augen, vom reinen Weiß bis zum düstern bläulichen oder gelblichen Grau, Verschmähung der Nahrung, manchmal, doch nicht immer, Brechen und Durchfall, zuweilen nur letztrer, dann Athemnoth, Taumeln und Tod. Untersuchungen durch Aerzte (Kreisphysikus Dr. Grun in Gumbinnen, Privatdozent Dr. Wolf, prakt. Arzt Dr. Moritz Löwinsohn, Beide in Berlin) haben ergeben: Erscheinungen, welche durch faulige Blutzersetzung hervorgebracht werden, nämlich dunkles dickliches Blut ohne feste Gerinsel, zahlreiche punktförmige Blutaustretungen auf Lunge, Herzbeutel und an den Hirnhäuten; gelbliche faserige Ausschwitzungen auf den Lungen und der Leber; zerstreute rothe Entzündungsherde in den Lungen; häufig hellgelbe keilförmig gestaltete festere Ausschwitzungen in dem Stoff der Leber; oft auch große, mürbe violettrothe oder ganz bleiche wachsgelbe Leber; dazu Magen- und Darmkatarrh und als den Zeitpunkt des Absterbens bezeichnend die Symptome der Erstickung, nämlich Blutüberfüllung der Lungen und des venösen Blutkreislaufs des rechten Herzens, der großen Halsvenen und der Venen der weichen Hirnhaut. Die der fauligen Blutzersetzung eigenthümlichen Bakterien in Gestalt von Kugeln, Stäbchen und Ketten ergeben mit Sicherheit Jauchevergiftung, also Sepsis. Diese Fäulniß-Organismen, wenn sie nur in geringer Menge vorhanden sind, kann der Körper wieder ausscheiden, sobald er genügend Sauerstoff zum Athmen hat, da gerade die Bakterien der Sepsis durch Sauerstoff

Digitized by Google

zerstört und beim Mangel an demselben gebildet werden. Die unselige Krankheit ist aber äußerst giftig und überträgt sich leicht; daher die Erkrankung aller zusammen angekommenen, sobald ein einziger der Seuche verfallener darunter war. Die Entlerungen können noch nach Monaten ansteckend wirken. (Dr. Grun). Vorgeschlagene Heilmittel: Chlorflüssigkeit 15 und 16), Schwefelmilch 79), Phosphorsäure 69), Chinin 14), Tannin 82), Ergotin 21 und 22), Salicylsäure 73 und 74), salicylsaures Natron 61 und 62), Karbolsäure 43 und 45) und viel dergleichen, einzugeben oder auch in subkutanen Einspritzungen; ferner Kayennepfeffer 50); eine Händlerin in Leipzig wollte mit Eigelb in wenig Wasser abgequirlt besten Erfolg erreicht haben. Die übrigen Händler suchen den Ausbruch der unheilvollen Krankheit ganz oder doch solange als möglich dadurch abzuwenden, daß sie das Trinkwasser völlig entziehen und nur in Kaffe oder Thee getauchtes Weisbrot geben. Auch die Anwendung von Ozonwasser 66) oder Einwirkung von Sauerstoff nach Dr. Grun hat bis jetzt keine Sicherheit der Heilung geboten — und ich muß mit voller Entschiedenheit den Ausspruch wiederholen, daß alle in dieser Weise erkrankten Vögel durchaus verloren sind und daß wir leider bisher weder ein stichhaltiges Heilmittel vor uns haben, noch die Macht, dem unseligen Handel (s. S. 13) ein Ende zu machen. — Ob diese Erkrankung der Graupapageien nicht mit der vorhin geschilderten Seuche, dem Typhus oder seuchenhaften Typhoïd, übereinstimmend ist, vermag ich nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden.

Wassersucht. Ursache: Erkältung, insbesondre nach unvorsichtigem gewaltsamen Abbaden großer Papageien; Bauchfell-Entzündung; auch wol Folge von anderen Störungen, wie Tuberkulose der Eingeweide. Kennzeichen: Anfangs Athmungsbeschwerden, dann aufgetriebner Leib und im hochgradigen Zustande deutlich zu erkennende Flüssigkeit in dem aufgetriebnen Theil; kommt glücklicherweise selten vor. Wol kaum zu heilen.

Eingeweidewürmer. Erst neuerdings hat man in mehrfachen Fällen festgestellt, daß bei den Papageien wie bei den anderen Vögeln Bandwürmer und Spulwürmer vorkommen; die ersteren habe ich selber mehrfach gefunden und die letzteren sind mir zugesandt. Weder die Arten der in Papageien schmarotzenden Eingeweidewürmer, noch deren Uebertragung, bzl. Zwischenwirthe sind bis jetzt erforscht worden. Es dürfte auch überflüssig sein, durch sie her-

Digitized by Google

vorgebrachte Krankheitszeichen anzugeben, da Abmagerung u. drgl. doch gleicherweise in anderen Krankheitszuständen begründet liegen können; als einziges sichres Kennzeichen des Vorhandenseins der Schmarotzer kann man nur Abgang derselben in den Entlerungen ansehen: Zürn empfiehlt als Heilmittel frische Kürbiskerne, welche die Papageien allerdings gern fressen und frische Arekanuß 6); doch vermag ich über die letztre nichts zu sagen. Ich rathe, dem betreffenden Papagei reines, also nicht verunreinigtes, ranzig gewordnes oder sonst verdorbnes, Leinöl, täglich früh und abends einen Theelöffel voll und zwar etwa dreimal zu geben. Hinsichtlich aller übrigen Eingeweidewürmer dürfte gleiches gelten.

Die Abzehrung oder Dürrsucht ist keine Krankheit an sich, sondern nur das Krankheitszeichen in verschiedenen Zuständen, zuweilen blos eine Folge von Verdauungsstörungen, meistens aber von mancherlei Leiden der Verdauungs- oder Athmungswerkzeuge oder irgendwelcher anderen Körpertheile, so auch von Entzündung und Vereiterung der Bürzeldrüse. Heilung also nur durch Ermittlung und Hebung der verschiedenen Ursachen.

Würgen und Erbrechen sind Erscheinungen in mehreren verschiedenen Krankheitszuständen und können nur durch deren Hebung geheilt werden. Uebrigens wird das Erbrechen beim großen Papagei manchmal lediglich durch Gemüthserregungen, Schreck, Beängstigung u. a. hervorgerufen und hat also als vorübergehende Zufälligkeit keine besondre Bedeutung. Auch bei überladnem Magen oder nach Genuß unverdaulichen Futters tritt es ein und auch dann ist es meistens ohne Gefahr.

Erkrankung der Bürzeldrüse, auch Fettdrüse genannt. Diese gewährt dem Vogel das für die Erhaltung des Gefieders nöthige Fett und leidet bei allen Käfigvögeln vorzugsweise leicht; darin mag wol bei den Papageien vornehmlich die unregelmäßige oder stockende Mauser (s. S. 72) begründet sein. Am häufigsten füllt sich die Drüse zu sehr mit Fettmassen, die dann verhärten oder ganz vereitern, sodaß sie einem Geschwür gleicht, welches man fälschlicherweise vielfach als Pips bezeichnet und durch Aufschneiden oder unvernünftig genug durch Abschneiden zu heilen sucht, wodurch der Vogel nur zu leicht in Lebensgefahr kommt. Vorbeugungsmittel: wie weiterhin bei Fettsucht angegeben, vor allem aber auch häufiges freiwilliges oder gezwungnes Baden. Heilung: Sorgsame Untersuchung, ob die Drüse nur ver-

Digitized by Google

härtetes Fett oder wirklich Eiter enthält; im erstern Fall Bestreichen mit warmem Olivenöl, zwei- bis dreimal täglich, zugleich viel Grünkraut, Bewegung und vorsichtiges Abbaden mit lauwarmem Wasser; wenn Eiter vorhanden: vorsichtiger Einschnitt, gelindes Ausdrücken und nach Zürn Auspinseln mit Borsäure-Auflösung 13). — Bei einer Entzündung der Bürzeldrüse (meist gleichzeitig mit Durchfall): Entfernung der nächsten Federn; Auflegen von Bleiwasser- 11) Läppchen; nach Zürn vorsichtiges Pinseln mit Karbolsäure-Wasser 47), dann Bestreichen mit mildem Fett, Glycerin- 25) oder Zinksalbe 86).

Auch bei den Papageien treten selbstverständlich Erkrankungen des Eierstocks ein; da inbetreff derselben aber noch keinerlei Erfahrungen, bzl. Heilmittel festgestellt sind und da sie bei einzeln gehaltenen Vögeln am wenigsten vorkommen dürften, so muß ich sie hier umsomehr übergehen. Dagegen legt ein Papagei im Käfig nicht selten ein oder mehrere Eier, manchmal sogar alljährlich ziemlich regelmäßig. Meistens hat dies nichts zu bedeuten; denn wenn der Vogel sich dabei auch für einige Tage unpäßlich zeigt, so geht es doch glücklich vorüber; nur in seltenen Fällen erkrankt er wirklich an Legenoth. Erkennungszeichen: Schwerfälligkeit bis Bewegungslosigkeit, Hocken am Boden, aufgetriebner Hinterleib mit zeitweisem krankhaften Erschauern. Vorbeugungsmittel: Zugabe von Kalk wie bereits S. 47 angegeben; besonders sorgsame Vermeidung jeglichen Erschreckens und Beängstigens während irgendwelcher Kränklichkeit; Verhindrung des Zufettwerdens. Heilmittel: Dampfbad; dann gleichmäßige Wärme, möglichste Ruhe und vorsichtiges Einpinseln von erwärmtem Oel in die Legeröhre in gleicher Weise wie S. 82 beim Klystir angegeben, aber hier vermittelst eines etwas größern Stecknadelkopfs und mit vorsichtigem Erweiten der Röhre bis zum Ei heran, welches man nöthigenfalls aufstechen und gelind ausdrücken muß.

Krankheiten der Leber und Milz. Erstere kommen bei Papageien ziemlich häufig vor. Ursachen: Unrichtige oder zu reichliche Fütterung; infolge von Darmkatarrh wird sodann der Gang verschlossen, welcher die Galle in den Dünndarm ausführt, dadurch entsteht Stauung, Aufsaugung der Galle ins Blut und damit Gelbsucht. Heilmittel: Glaubersalz 23) zur Abführung und Aufguß von Kalmuswurzel 38), theelöffelweise; im übrigen knappes und leichtes Futter, Grünkraut. — Andere Leberkrankheiten sind beim Papagei schwer

Digitized by Google

zu erkennen und es können bei ihm eigentlich nur zwei inbetracht kommen: Tuberkelbildung in der Leber (bereits S. 79 besprochen) und Fettleber oder Fettsucht im allgemeinen. Krankheitszeichen der letztern: Erschwertes Athmen, Keuchen, schwerfällige Bewegung, harte oder doch dickliche Entlerung, bei näherer Untersuchung ein überaus voller mit Fett gepolsterter Körper, schlaffe, faltige, unthätige Haut, wol auch große federlose Stellen. Vorbeugungsmittel: am besten den Papagei täglich aus dem Käfig zu nehmen und einigemal durch die Stube fliegen zu lassen, andernfalls geräumiger Käfig mit Klettervorrichtung, immer Holz zum Benagen und zeitweise knappes Futter. Heilmittel: letztres gleichfalls, viel Grünkraut, bei Verstopfung Rizinusöl 72), viel Bewegung, doch ohne Beängstigung, auch Baden, doch mit Vorsicht. — Ob der Milzbrand bei Papageien wirklich vorkommt, weiß ich nicht; beim Hofgeflügel ist er als thatsächlich vorhanden festgestellt. Ursache: gleichfalls Spaltpilze. Krankheitszeichen: plötzliches Erkranken, Muskelzittern, starkes Federnsträuben, stinkende blutige Entlerung, blutiger Schaum aus Maul und Nasenlöchern, krampfhafte Zuckungen; bei leichterm, langsamerm Auftreten: bläuliche Färbung der Schleimhäute, Taumeln, Bildung von erbsen- bis haselnußgroßen Knoten, die heiß, schmerzhaft sind und beim Oeffnen kleberige gallertartige gelbbraune Masse oder gelbrothe Jauche enthalten; auch blaurothe Blasen auf der Zunge. Vorbeugungsmittel: Strengste Absondrung. Heilmittel: Karbolsäurewasser 44) halbstündlich 1 Theelöffel voll, 8- bis 10mal; Aufschneiden und Auspinseln der Beulen mit Karbolsäurewasser 46); fast immer verloren.

Herzkrankheiten sind natürlich bei den Vögeln schwer zu erkennen, während sie jedenfalls viel mehr vorkommen, als man wol annimmt. Zürn spricht von einer Herzbeutel-Entzündung und gibt als Krankheitszeichen an: Hinfälligkeit, unsichrer Gebrauch der Füße, Athmungsbeschwerden und vor allem deutlich fühlbarer schneller Herzschlag; die Kranken sind traurig, sondern sich ab, suchen dunkle Winkel auf, zittern und liegen; der Tod tritt rasch ein. Heilmittel: versuchsweise Digitalis-Tinktur 18) zwei- bis dreimal täglich. — Außerdem kommen vor: Tuberkeln oder Geschwürchen im Herzen, die ich selber oft gefunden; Verfettung des Herzens und im Gegensatz Entkräftung (Atrophie) desselben; jedenfalls dann auch Herzbeutel-Wassersucht; ferner Verknöcherung der Gefäßhäute oder Verengung des Hohlraums der Hauptschlagader (Aorta); schließlich eine

Digitized by Google

durch Kugelspaltspitze hervorgerufne Entzündung des Herzmuskels und der Herzklappen (vrgl. die S. 79 behandelte Lungenentzündung). Heilmittel sind bei allen diesen Erkrankungen wol kaum anzuwenden; Zürn gibt auch nichts Näheres an.

Gehirnkrankheiten kommen bei den Papageien mehrfach vor. Wenn das Gehirn (ebenso wie das Herz und die Lungen) nach dem Tode mit Blut gefüllt erscheint, entweder ganz oder an einzelnen Stellen, so ist wol eine Gehirnkongestion oder ein Zustand, den wir beim Menschen als Schlagfluß bezeichnen, eingetreten. Ursachen: große Erregung, Schreck, Angst u. a., starke Hitze, zu viel Hanfsamen bei heißem Wetter und plötzliches zu starkes Blutzuströmen. Krankheitszeichen: Sonderbares schiefes Halten des Kopfs, Augenverdrehen, Taumeln oder Rückwärtsgehen, Drehbewegungen; rascher Tod unter Krämpfen. Vorbeugungsmittel: Abwendung der genannten Einflüsse, täglich Salzsäure ins Trinkwasser 78), knappes Futter und viel Grünkraut. Heilmittel: kaltes Wasser auf den Kopf, vermittelst Brause oder Auflegen eines gefüllten Schwamms, als Abführmittel Rizinusöl 72). — Krämpfe, epileptische Anfälle u. a. sind gleichfalls Folgen von Störungen im Gehirn u. a. wichtigen Organen. Der Papagei stürzt plötzlich zusammen unter heftigen Zuckungen, Flügelschlagen und drehenden Bewegungen oder er beginnt zu zittern, wankt, verdreht die Augen, dann den Kopf, fällt um und zappelt ebenso heftig. Ursachen: ganz dieselben wie vorhin, namentlich aber noch Halten in zu engem Käfig, zu starke Ofen- oder Sonnenhitze, unbefriedigter Geschlechtstrieb u. a. Vorbeugungsmittel: gleiche. Heilmittel: Futterveränderung, viel Grünkraut und Obst, Kühle, freie Luft, Ortsveränderung und im übrigen gleichfalls wie vorhin. Beim Anfall nimmt man den Papagei in die Hand und hält ihn aufrecht, damit er sich nicht stoße und arg beschädige, sondern Linderung habe; doch hat man sich dabei vor seinen Bissen zu hüten. Von den gebräuchlichen barbarischen Heilmitteln, Fortschneiden einer Zehe oder sonstwie Blutlassen rathe ich ab. Wenn der Krampf nur einmal vorgekommen, so hat er meistens keine Bedeutung; erst wenn er sich wiederholt, wende man die Heilmittel an und suche vor allem die Ursache zu ergründen. Nicht selten beschädigt sich ein kleinerer hurtiger Papapei beim plötzlichen erschreckten Auffliegen die Schädeldecke oder auch das Rückgrat an einer scharfen Kante. Krankheitszeichen: Taumeln, Umfallen, Krämpfe und heftiges krampfhaftes

Digitized by Google

Drehen um sich selber. Heilung meist nicht möglich; Lindrung durch Halten in der Hand oder Beherbergen in einem mit Tüchern ausgelegten Korb. — Drehkrankheit oder Taumelsucht entsteht entweder durch fortwährendes Drehen um sich selber bei sehr beweglichen Papageien im engen runden Käfig oder durch Anstoßen an eine scharfe Ecke und Beschädigung des Schädels oder durch thierische Schmarotzer im Gehirn. Krankheitszeichen: Schief gehaltner Kopf, Hintenüberbiegen, Drehen um sich selber, Taumeln, Ueberschlagen und Krämpfe. Heilung nur im erstern Fall durch geräumigen viereckigen Käfig, in den anderen Fällen kaum möglich.

Augenkrankheiten. Bei Erkrankung verschiedener Organe können gleichzeitig die Augen mehr oder minder in Mitleidenschaft gezogen werden, so bei der S. 78 behandelten diphteritisch-kroupeusen Schleimhaut-Entzündung, bei welcher fast regelmäßig die Bindehäute eines oder beider Augen, die Nickhaut und selbst die Hornhaut angegriffen werden, sodaß die Lider angeschwollen und verklebt erscheinen und Trübungen der Hornhaut vorkommen. Inbetreff der Behandlung bitte ich also S. 78 nachzulesen. — Nächstdem werden Anschwellungen und Entzündungen der Augen-Bindehäute durch Erkältung hervorgebracht. Krankheitszeichen: Thränen der Augen, Anschwellen der Lider, Lichtscheu. Heilmittel: Pinseln mit lauwarmer Chlorflüssigkeit 16) oder Alaun- 1) oder Zinkvitriol- 87) Auflösung. — Ferner kann Entzündung der Bindehäute oder der Hornhaut entstehen durch Stöße oder Bisse ins Auge. Heilmittel: Kühlen mit Wasser, Einpinseln von Zinkvitriol- 87) Auflösung oder einer Auflösung von Pottasche mit Opium 71). — Innere Augen-Entzündungen, die Zürn beim Geflügel, wenn auch selten, beobachtet hat, dürften bei den Papageien ebenfalls eintreten und Blindheit (grauen Star) bringen. Heilmittel: Einpinselung auf den Augapfel von schwefelsaurem Atropin 8). — Bei den Edelsittichen habe ich mehrfach eine Augenerkrankung beobachtet, die mit Anschwellung der Lider beginnt, worauf sich Geschwürchen rings um den und sogar im Augapfel bilden, sodaß das Auge verloren geht. Ein solcher Sittich behielt die Eiterung, welche sich über eine ganze Kopfseite erstreckte und dieselbe völlig entfärbt hatte, jahrelang, während er im übrigen gesund war, denn das Pärchen nistete mit Erfolg. Als Heilmittel dürfte allenfalls Höllenstein-Auflösung 28) beizeiten anzuwenden sein. — Warzen an den Augenlidern,

Digitized by Google

Geschwülste, Verhärtungen u. a. an den Bindehäuten gibt es gleichfalls; sie lassen sich nur durch Operation entfernen.

Gicht, Rheumatismus und Lähmungen kommen leider bei den Papageien nicht selten vor. Zürn bespricht die erstre in zwei Erscheinungen, und zwar als eiternde und gichtische Gelenk-Entzündung, die jedoch für den Vogelpfleger als fast völlig übereinstimmend zusammenfallen. Ursachen: Erkältung oder Verletzung, auch Sitzen auf zu schmalen und scharfkantigen Stangen. Krankheitszeichen: Verminderung der Freßlust, Fieber, Anschwellungen an den Gelenken der Flügel und Füße, die anfangs fest, stark geröthet, sehr warm und schmerzhaft sind, dann weich werden und eine mit Blut und Eiter gemischte Flüssigkeit enthalten; späterhin werden sie wieder hart und haben einen gallertartigen und käsigen Inhalt; zuweilen tritt nach Wochen Selbsttheilung ein, doch bleibt gewöhnlich Verdickung des Gelenks zurück; in einem andern Fall tritt langsame Abmagerung, Blutarmuth (blasse Schleimhäute), sodann starker Durchfall und Tod an Erschöpfung ein. Heilmittel: Trockenheit und Wärme; wenn die Anschwellung entzündlich und heiß ist, Kühlen mit Blei- 11) oder Essigwasser, wenn hart, Einreiben mit Kampfer- 40) oder Ameisenspiritus 4) oder Pinseln mit verdünnter Jod-Tinktur 34), auch Umwicklung mit erwärmtem Wollenzeug; wenn die Geschwulst eiterig, Aufschneiden, doch keinenfalls zu früh, Ausdrücken und Auspinseln mit Karbolsäurewasser 46); innerlich in beiden Fällen eine Gabe von Salizylsäure- 73) Wasser; die untauglichen Sitzstangen müssen selbstverständlich bei Zeiten entfernt und durch gute (s. S. 31) ersetzt werden. — Rheumatische Leiden, die in schmerzhafter Lähmung ohne Gelenk-Anschwellungen eintreten und die gleicherweise durch Erkältung, besonders Zugluft oder nach einem Bade entstehen, habe ich in der Regel durch Einreiben mit warmem Oel und Umwicklung des schmerzhaften Glieds mit einem erwärmten Wollentuch, welches aber festgenäht werden muß, geheilt; selbstverständlich muß der Kranke in einem warmen Raum gehalten werden. — Anderweitige Lähmungen, die durch schwere Leiden innerer edler Organe hervorgerufen sein können, sind natürlich nur nach Erkennung durch Hebung der Ursache zu heilen; sobald solche Erkrankung richtig festgestellt ist und durch zweckmäßige Behandlung sich bessert, hört die Lähmung von selber auf.

Digitized by Google

Wunden. Es ist staunenswerth, mit welcher Kraft die Natur bei allen Vögeln selbstheilend thätig ist. Man braucht sogar bedeutende Wunden blos vermittelst eines Schwamms mit Wasser zu reinigen und zu kühlen, so erfolgt die Heilung ganz von selber, wenn man nur für Ruhe sorgt. Beim Papagei kommen meistens nur entweder mehr oder minder bedeutende Bißwunden oder zufällige Schnitt- und Rißwunden, z. B. an einer hervorstehenden Draht- oder Nagelspitze, vor. Jede Bißwunde heilt eigentlich schlecht, weil sie Quetschung und Riß zugleich bildet; Auswaschen mit Arnikawasser 7) oder wenn schlimmer mit Bleiwasser 11), dann Aufstreichen von Glycerin- 25) oder Bleisalbe 10) genügt trotzdem größtentheils. Ist die Wunde sehr tief und blutet sie stark, so muß nach sorgfältigem Reinigen vermittelst eines in das Arnikawasser 7) getauchten Schwamms blutstillende Watte aufgelegt oder blutstillendes Kollodium 53) übergepinselt werden; schlimmstenfalls ist die Wunde mit einer chirurgischen Naht zu schließen, was man am besten von einem Wundarzt oder Heilgehilfen ausführen läßt; auch über die vernähte Wunde wird Kollodium 52) gestrichen. Große klaffende Wunden, die sich nicht vernähen lassen, besonders Rißwunden, werden, selbstverständlich nach Reinigung vermittelst des in Arnikawasser getauchten Schwamms mit Karbolsäureöl 41) oder Borsäure-Auflösung 13) ausgepinselt. Schlecht heilende, stark eiternde und immer wieder aufbrechende Wunden müssen täglich ein- bis zweimal mit lauwarmem Karbolsäurewasser 48) gereinigt und dann mit einem Liniment aus dünnem Arabisch-Gummi-Schleim und Karbolsäure 59) oder Borsäure 57) ausgepinselt werden. — Bleibt nach dem Zuheilen einer Wunde eine Geschwulst zurück, so bestreicht man dieselbe täglich zweimal mit Kampferspiritus 40). — Brandwunden (ein Papagei war auf ein heißes Plätteisen geflogen, ein andrer der glühenden Ofenthür zu nahe gekommen) behandelt man wie beim Menschen am besten mit Liniment aus Kalkwasser und Leinöl 58) oder Bleiessig und Baumöl 56), im leichtern Fall mit Blei-Kollodium 9) und verbindet immer mit dickem Pausch von Watte zum Abschluß der Luft und damit der Papagei nicht an den giftigen Bleimitteln lecken kann.

Auch die Knochenbrüche heilen bei den Vögeln erstaunlich leicht. Der einfache Fußbruch über dem Knöchel, welcher mir bei Papageien mehrmals vorgekommen, bedarf lediglich der Ruhe, um

Digitized by Google

vortrefflich wieder einzuheilen, sodaß der Fuß nicht einmal ein wenig schief wird. Besser ist es natürlich, wenn man die beiden Knochenenden durch vorsichtiges Ziehen in die richtige Lage bringt, zwischen zwei glatte Hölzchen (Schienen) legt, diese ziemlich fest mit einem dicken weichen Baumwollfaden umbindet, darüber Gipsbrei oder dicken, noch warmen, doch keinenfalls heißen Tischlerleim gleichmäßig streicht, den Vogel bis zum Trocknen festhält und ihn dann in einen engen Käfig steckt. In etwa vier Wochen kann man den Verband durch Aufweichen mit Wasser vorsichtig abnehmen. Ist der Bruch am Flügel, so müssen natürlich die Federn vorher abgeschnitten, um Schmerz und Reiz zu vermeiden aber nicht ausgezupft, werden. Zürn räth, die Stelle mit einer wollenen Binde und darüber mit einer in Wasserglas-Auflösung getauchten Leinwandbinde zu umbinden und gepulverte Schlemmkreide aufzustreuen; dieser Verband soll den Vorzug haben, festzuhalten und sich dabei doch leicht abschneiden zu lassen. Als Schienen empfiehlt er Pappstreifen oder besser dünne norwegische Verbandspäne.

Geschwüre (außer den bei den inneren Krankheiten bereits erwähnten) bilden sich auch aus äußerer Veranlassung bei den Papageien wie bei allen größeren Vögeln überhaupt nicht selten. Man untersuche zunächst genau, ob die Anschwellung hart, sehr entzündet, bzl. heiß oder bereits gelb, bzl. erweicht ist und behandle sie je nach dem Befund. Das harte Geschwür sucht man durch warmen Breiumschlag mit etwas Fett zu erweichen; eine sehr entzündete Anschwellung kühlt man mit Bleiwasser 11) und erweicht sie dann gleichfalls durch warmen, oft erneuten Breiumschlag. Ein reifes Eitergeschwür kann durch einen Einschnitt gewöhnlich ohne Gefahr entlert werden und ist nach dem Ausdrücken mit einem sog. Hamburger Pflaster 26) zu belegen oder mit Karbolsäure-Oel 41) zu verbinden. — Am schlimmsten ist beim Papagei ein Balggeschwür, welches insbesondre am Kopf, neben dem Schnabel oder in der Augengegend sich bildet; es ist weder hart noch weich, mit häutiger Masse gefüllt und vergrößert sich übermäßig oder geht tiefer und verursacht dem Vogel in jedem Fall Unbequemlichkeit und Schmerzen. Solange es klein ist oder lose in der Haut sitzt, kann es wol durch Aetzen mit Höllenstein oder besser noch durch Abbinden vermittelst eines dünnen, aber sehr festen Fadens fortgebracht werden. Meistens jedoch kommen Balggeschwüre aus innerer Verderb-

Digitized by Google

niß der Säfte her, und das örtliche Fortbringen des einzelnen kann nicht viel nützen, weil immer neue entstehen. Der Papagei ist dann in der Regel verloren, falls er nicht mehr durch strengste Enthaltung von aller naturwidrigen Fütterung: Fleisch, Fett, Kuchen, Kartoffeln u. a., wiederhergestellt werden kann. Die Zugabe von Salicylsäure-Wasser 73) dürfte dabei gute Dienste leisten. — Bei frisch eingeführten Papageien, welche unterwegs schlecht verpflegt worden, bilden sich unter den Flügeln scheußliche Blutgeschwüre in Gestalt von Knollen. Inbetreff derselben bitte ich bei der Sepsis nachzulesen.

Schnabelkrankheiten. Bei allen Vögeln kommen Mißbildungen der Schnäbel und zwar theils bereits in der Freiheit, größtentheils aber erst durch den Einfluß der Gefangenschaft vor. Der Papageienschnabel ist oft übermäßig lang, zu sehr gekrümmt oder sonstwie verunstaltet. In den meisten Fällen nimmt man solch' Vorkommniß leicht — während es doch fast regelmäßig zum Untergang des betreffenden Vogels führt. Wächst der Oberschnabel so weit über den untern hinweg, daß er beim Aufnehmen von Nahrung hinderlich ist, so muß er bis auf die naturgemäße Länge zurückgeschnitten werden, am besten vermittelst eines scharfen Messers von geschickter Hand. Mit einer Kneifzange geht es zwar leichter, doch ist dies gefährlicher, indem der lebendige, bzl. fleischige Kern des Schnabels dabei beschädigt werden kann. Jedenfalls hüte man sich, so abzubrechen oder einzureißen, daß Spalten im Horn entstehen, welche bis auf den Kern führen, dann schwer oder garnicht heilen, sondern immer wieder einplatzen, dem Vogel viel Schmerz verursachen und ihn am Fressen hindern, sodaß er wol eingeht. Man soll den Schnabel daher vor dem Beschneiden mehrmals mit erwärmtem Oel einreiben. Eine Spalte im Schnabelhorn wird täglich einmal vermittelst eines Pinsels gereinigt und mit warmem Oelgemisch ausgepinselt. — Ein verletzter, manchmal sogar ein bis dahin gesunder Schnabel beginnt wol mit einmal zu wuchern, indem er an der Spitze unnatürlich wächst und zugleich sich faserig spaltet. Ursache: mangelhafte oder unrichtige Ernährung des Horns und besondrer Reiz zugleich. Solch' Schnabel wird mühelos mit der Schere zurückgeschnitten, und dennoch geht der Vogel oft daran zugrunde, weil das Schnabelhorn dann erstrecht wächst und zugleich weich, entweder bröcklig oder biegsam und untauglich zum Zerknacken

Digitized by Google

harter Körner wird. Naturgemäße Ernährung; insbesondre Zugabe von Kalk, auch Sand, Vermeidung von Matschfutter und Leckereien, dagegen Hinausbringen in freie Luft bis zum kalten Wetter sind die einzigen Heilmittel.

Fußkrankheiten. Am vernachlässigten Vogelfuß bilden sich unter der Schmutzkruste nur zu leicht Entzündung, Eiterung, kleine und größere Geschwüre, welche wol zur Entzündung der Gelenke, zum Absterben einzelner Zehen, selbst zum Verlust des ganzen Fußes führen können. Wenn man beizeiten in warmem Wasser badet, den entzündeten Fuß mit Bleiwasser 11) kühlt, die btrf. Stellen mit verdünntem Glycerin 24) bepinselt und dann dick mit feinstem Stärkemehl bestäubt, dies auch täglich wiederholt, so tritt baldige Heilung ein. In hartnäckigen Fällen bestreicht man mit Bleisalbe 10) oder wenn die Wunde näßend ist mit Bleiweißsalbe 12), dann muß der Fuß aber in ein Lederbeutelchen gesteckt und dieses fest verbunden werden, weil die Salbe giftig für den Vogel ist. — Schlimmer sind Verhärtungen, aus denen entweder Geschwüre in den Gelenken (Knollen) oder Hühneraugen entstehen. Im erstern Fall behandelt man wie vorhin angegeben, in beiden aber entfernt man die leidige Entstehungsursache, nämlich die zu dünne, harte oder sonstwie unzweckmäßige Sitzstange. Das Hühnerauge muß durch Einreiben mit erwärmtem Olivenöl erweicht und dann nach Waschen mit warmem Seifenwasser vermittelst eines Messerchens sorgsam ausgeschält werden, doch hüte man sich, wund zu schneiden. — Wenn um das Handgelenk des Fußes eine zähe scharfe Faser sich gewickelt, was freilich bei Papageien selten vorkommt, und durch Einschneiden derselben Entzündung und Eiterung sich gebildet hat, so muß dieselbe nach Erweichung und Waschen (wie vorhin angeordnet), vermittelst eines spitzen Messers herausgeholt werden; der Fuß heilt nach Bestreichen mit Glycerinsalbe 25) von selber. — Durch Druck oder Reibung des Rings an der Papageienkette werden gleichfalls Verhärtungen, Geschwüre oder gar Lähmung hervorgerufen; in allen Fällen muß der Ring sogleich entfernt und der Papagei, falls er noch nicht ungefesselt auf der Stange sitzen darf, in einen zweckmäßig eingerichteten Käfig gebracht werden, wo der Fuß meistens von selber heilt und nur im bereits sehr schlimmen Fall wie oben gesagt zu behandeln ist. — Infolge innerer Krankheiten bilden sich bei manchen Papageien gelbe geschwürige

Digitized by Google

Knoten an den Beinen, insbesondre zwischen den Zehen, die äußerlich wie andere Geschwüre behandelt werden, meistens aber erst mit der Krankheitsursache, bzl. Krankheil selber, sich heben lassen. — Noch unheilvoller ist eine Erscheinung, bei welcher der Vogel, sei es durch äußern Reiz oder krankhaften Hang veranlaßt, sich den Fuß benagt und wol gar ganze Zehen abfrißt. Auch hier dürfte eine Heilung vor Hebung der eigentlichen Ursache nicht zu erreichen sein. In einem solchen Fall wurde Aloë-Tinktur 2) u. drgl. vergeblich angewendet; der Vogel begann am andern Fuß, darauf an einem Flügel, dann am zweiten und schließlich sogar an anderen Körperstellen sich anzufressen. Baden der btrf. Theile in warmer starker Auflösung von Pottasche 70) und dann Bepinseln mit Karbolsäureöl 41), brachte bei einem derartigen Selbstfresser Hilfe. — Durch Hängenbleiben am Draht oder auch in irgend einer Spalte kann sich ein Papagei zuweilen einen Zehnagel ausreißen; dann wird die Wunde mit Arnikawasser 7) gewaschen und gekühlt, vermittelst eines weichen Tuchs getrocknet und mit Blei-Kollodium 9) bepinselt. — Fußkrätze (Kalkbeine oder Elephantiasis) kommt bei Papageien selten vor, doch habe ich sie bei einem alten Kakadu gefunden. Die Füße überziehen sich nach und nach mit Rinde oder Borke, welche sich immer dicker ansetzt, den Papagei am klettern hindert und die Beine verunstaltet; sie verursacht unausstehliches Jucken und greift den Vogel so an, daß er abmagert. Er muß von anderen abgesondert werden, weil die durch Hautmilben verursachte Krankheit sich leicht weiter überträgt. Heilverfahren: Die harten Krusten werden mit Schmierseife bestrichen, nach 24 Stunden durch warmes Wasser erweicht, mit harter Bürste vom Schorf möglichst gesäubert (doch ohne blutig zu kratzen) und dann mit Perubalsam 67) oder Karbolsäuresalbe 42) eingerieben. Schlimmstenfalls muß das Verfahren wiederholt werden. Schließlich sind die angegriffenen Füße mit Glycerinsalbe 25) zu bestreichen.

Gefiederkrankheiten werden bei den Papageien theils durch winzige Schmarotzer, die sich in der Haut oder in den Federn selbst einnisten, theils wol durch krankhafte Anlage von innen heraus verursacht. Die ersteren sind überaus mannigfaltig und bringen entweder Ausschlag-Erscheinungen (ähnlich wie die Krätze beim Menschen) oder Zerstörung der Feder selbst hervor. Um ihr Vorhandensein festzustellen, bedarf es meistens mikroskopischer Untersuchung; glück-

Digitized by Google

licherweise aber sind sie verhältnißmäßig leicht zu bekehden. Beim Geflügel und auch wol bei Stubenvögeln wendet man vielfach stark riechende Stoffe, wie Petroleum, ätherische Oele u. drgl. an, ohne zu bedenken, daß dieselben den Vögeln ebenso widerwärtig, bzl. schädlich sind, wie dem Ungeziefer; ich lasse daher von denselben allenfalls den Perubalsam 67) gelten und empfehle im übrigen als das wirksamste und zugleich unschädliche Mittel Insektenpulver 31) nebst -Tinktur 32) bei äußerster Reinlichkeit und sorgsamer Gefiederpflege überhaupt. Bemerkt man, daß der Papagei einzelne Stellen am Körper bekommt, wo die Federn mürbe werden oder er sie sich auszupft und sich immer eifrig mit dem Schnabel kratzt, wol gar wund reißt, so muß man zunächst ermitteln, ob es sich um Vogelmilben (sog. gem. Vogelläuse) handelt; diese rothen Schmarotzer sind mit bloßem Auge zu erkennen. Man bepinselt die angegriffenen Stellen mit Insektenpulver-Tinktur 32) oder bestreicht sie mit verdünntem Glycerin 24), über welches Insektenpulver 31) geblasen wird; am andern Tage werden sie mit warmem Seifenwasser vermittelst einer Bürste gewaschen und dünn mit Olivenöl überstrichen. Schlimmstenfalls muß man das Verfahren wiederholen. Bei einem stark von Milben befallnen Papagei ist der Käfig mit heißem Wasser auszubrühen, nach voller Säubrung mit Insektenpulver auszustäuben und an eine andre Stelle zu bringen. — Federlinge u. a., welche nur im Gefieder sich einnisten und dieses beschädigen, bekehdet man gleichfalls durch Bepinseln der btrf. Stellen mit Insektenpulver-Tinktur 32) oder Perubalsam 67) und nach dem Baden in Seifenwasser durch schwaches Einfetten mit Olivenöl; im übrigen sorgsame Gefiederpflege wie S. 69 angegeben. — Wenn kahle Stellen sich bilden, an denen die Haut sich abschuppt und dicke Schinn- oder gar Schorflager entstehen, so ist das wol gleichfalls in thierischen oder pflanzlichen mikroskopischen Schmarotzern begründet. Untersuchungen über solche bei den Papageien liegen noch nicht vor; ich habe die btrf. Vögel daher in gleicher Weise wie bei der Fußkrätze (S. 95) und zwar mit Erfolg behandelt. — Das Selbstausrupfen der Federn ist eine der unheilvollsten Erkrankungen größerer und nicht selten der werthvollsten Papageien. Es macht einen schauderhaften Eindruck, wenn ein gut sprechender, förmlich menschenkluger Vogel binnen kürzester Frist mit Ausnahme des Kopfs splinternackt dasteht und in widerwärtiger Weise jede hervorsprießende

Digitized by Google

Feder an seinem blutrünstigen Körper fortnagt. Längst ist es bekannt, daß diese krankhafte Sucht immer in unzweckmäßiger Verpflegung begründet liegt; ob die eigentliche Ursache aber in mikroskopischen Schmarotzern oder in mangelnder Bewegung, der Unmöglichkeit, sich auszulüften und also in dem Hautreiz, welchen die Verstopfung der Poren durch den Federstaub hervorbringt oder in Säfteverderbniß und dem durch diese bewirkten Reiz von innen heraus oder schließlich, wie Manche behaupten wollen, blos in übler Angewohnheit begründet sei, das ist bis jetzt noch keineswegs festgestellt. Wir können uns hier nur an die leidige Thatsache halten, daß das Selbstrupfen weder selten vorkommt, noch bis jetzt ein völlig sichres Heilverfahren ergeben hat. Vorbeugungsmittel: Stete Versorgung mit Holz zum Nagen, auch mit Kalk und Sand, Vermeidung aller Leckereien und naturwidrigen Nahrungsmittel überhaupt; dagegen sachgemäße Ernährung, sorgfältige Federpflege (s. S. 69) und möglichst fleißige Beschäftigung mit dem Papagei. Vorgeschlagene Mittel: Bespritzen mit Kölnisch Wasser oder verdünntem Glycerin 24) u. drgl. vermittelst des Erfrischers; Bestreichen der Stellen mit Aloë-Tinktur 2), Aufguß von Tabak- 81) oder Wallnußblättern 85) und anderen bitteren oder ekelhaften Flüssigkeiten; Bepinseln mit Insektenpulver-Tinktur 32); täglich mehrmaliges Durchblasen des Gefieders mit einem Handblasebalg; tägliches Spritzbad 80) mit abgestandnem Wasser, zu welchem Spiritus, Franzbranntwein, Rum oder Kölnisch Wasser gemischt ist. In Rotterdam legte man den Selbstrupfern blecherne Halskragen an, jedoch ohne Erfolg, wie denn überhaupt keines der genannten Mittel wirkliche dauernde Heilung gebracht hat. Am meisten Aussicht gewährt der Weg des Herrn Dulitz, den Papagei in ganz neue Verhältnisse zu bringen, ihm einen geräumigen Käfig mit trocknem Sand zum Scharren zu geben, bei kälterm Wetter ihn auf den Ofen zu stellen, dort täglich mit lauwarmem Wasser zu bespritzen, ihm nur Mais, Hafer, wenig Hanf, dagegen Obst, auch Grünfutter und Sepia zu geben und bei dieser naturgemäßen Pflege sich möglichst viel mit ihm zu beschäftigen. Herr Prediger Ottmann hat besten Erfolg dadurch erzielt, daß er den Uebelthäter hungern ließ, indem er ihm allmälig die Nahrung bis auf den dritten Theil entzog, sodaß er ganz matt wurde und die scheußliche Selbstverstümmlung unterließ.

Digitized by Google

Uebersicht der Arzneimittel nebst Angaben der Mischungsverhältnisse und Gaben.

(Alle angerathenen Arzneien kauft man in den Apotheken und zum Theil auch in den Droguen-Geschäften. Wo neben dem Namen nichts Näheres vermerkt ist, bezeichnet derselbe nur das Mittel, wie es gefordert werden muß. Wo verschiedene Verdünnungen, bzl. Auflösungen aufgezeichnet sind, wolle man vorzugsweise sorgsam auf die Nummer achten, weil dieselbe nur für den betreffenden Fall der Anwendung gilt. Das Abmessen der Verdünnung, bzl. Auflösung in verschiedenen Graden muß ich dem Urtheil des Vogelpflegers selbst überlassen, doch rathe ich, die Kraft des Kranken lieber geringer als zu hoch zu veranschlagen. Die subkutanen Einspritzungen müssen vermittelst einer kleinen Glasspritze mit ganz feiner Spitze am fleischigen Theil der Brust ausgeführt werden).

1. Alaun, Auflösung in Wasser (1 : 200).
2. Aloë-Tinktur.
3. Althee- oder Eibischwurzel.
4. Ameisenspiritus.
5. Ammoniak, kohlensaures in Pillen (A. $0{,}1-0{,}3$ gr mit Altheepulver und Wasser zu je einer kleinen Pille geformt).
6. Arekanuß, täglich etwa 1 gr.
7. Arnika-Tinktur, verdünnt mit Wasser (1—2 : 100).
8. Atropin, schwefelsaures, Auflösung in destillirtem Wasser (1 : 800).
9. Bleikollodium.
10. Bleisalbe.
11. Bleiwasser.
12. Bleiweißsalbe.
13. Borsäure, Auflösung in destillirtem Wasser (5 : 100).
14. Chinin, schwefelsaures.
15. Chlorflüssigkeit (Liquor chlori), 3 bis 5 Tropfen in Wasser als Gabe.
16. dsgl. verdünnt mit Wasser (1 : 100) zum Pinseln; ebenso zum Einspritzen jedesmal $0{,}5-2$ dcgr.
17. Chlorkalk-Wasser (Chlorwasser) zum Abscheuern von Geräthen und Desinfiziren überhaupt: Chlorkalk in Wasser beliebig angerührt.
18. Digitalis-Tinktur, 1 bis 2 Tropfen in Wasser als Gabe.
19. Dulkamara-Extrakt, Auflösung in Wasser (1 : 200).
20. Eisenoxydul, schwefelsaures, Auflösung in destillirtem Wasser (1 : 200—300).
21. Ergotin, Auflösung in Wasser (1 : 100) zum Eingeben.
22. dsgl. ebenso zum Einspritzen jedesmal 1—2 dcgr.
23. Glaubersalz, $0{,}5$ gr in Wasser als Gabe.
24. Glycerin, verdünnt mit Wasser (1—2 : 10).
25. Glycerinsalbe.
26. Hamburger Pflaster.
27. Höllenstein (Argentum nitricum fusum), Auflösung in destillirtem Wasser (1 : 300—500) zum Eingeben.
28. Höllenstein (1 : 10) zum Pinseln.
29. Hoffmannstropfen, 1 bis 2 Tropfen in Wasser als Gabe.

Digitized by Google

30. Holzessigdämpfe (Holzessig 1, heißes Wasser 50; in einem Fläschchen unter den Schnabel zu halten).
31. Insektenpulver.
32. Insektenpulver-Tinktur.
33. Jod-Tinktur.
34. dsgl. verdünnt mit Spiritus (2 : 100).
35. dsgl. verdünnt mit Wasser (1 : 1) zum Einathmen vor den Schnabel zu halten.
36. Kali, chlorsaures, Auflösung in dest. Wasser (1 : 200) zum Eingeben.
37. dsgl. Auflösung in dest. Wasser (3—5 : 100) zum Pinseln.
38. Kalmuswurzel-Aufguß (5 : 100).
39. dsgl. (2 : 60) mit doppeltkohlensaurem Natron (1 : 60).
40. Kampferspiritus.
41. Karbolsäure-Oel (K. 1—2, Olivenöl 100).
42. Karbolsäure-Salbe (K. 1, Schmalz 10).
43. Karbolsäure-Wasser (3—5 : 100) zum Eingeben [1—2 Tropfen im Theelöffel voll Wasser als Gabe], Einpinseln und Besprengen.
44. Karbolsäure-Wasser (1 : 200) zum Eingeben bei Milzbrand.
45. dsgl. (1 : 100) zum Einspritzen, jedesmal 1—3 degr.
46. dsgl. (20 : 100) zum Ausspinseln der Balggeschwüre u. a.
47. dsgl. (1 : 400) zum Bepinseln der Bürzeldrüse.
48. dsgl. (1 : 100) zum Reinigen von Wunden.
49. dsgl. (1 : 10) zum Abscheuern der Käfige.
50. Kayennepfeffer, in 1—3 Schoten täglich zu geben.
51. Kochsalz, Auflösung in Wasser (1 : 10).
52. Kollodium.
53. dsgl. blutstillendes (K. 8—10, Eisenchloridflüssigkeit 1).
54. Kreosotdämpfe (in K. 2 und Wasser 100 wird ein glühender Eisenstab gehalten).
55. Kupfervitriol, Auflösung in dest. Wasser (3 : 100).
56. Liniment aus Bleiessig und Baumöl (1 : 1).
57. dsgl. aus Borsäure und Arab. Gummi-Schleim (3—5 : 100).
58. dsgl. aus Kalkwasser und Leinöl (1 : 1).
59. dsgl. aus Karbolsäure mit Arab. Gummi-Schleim (2 : 100).
60. Magnesia, gebrannte, mit Wasser anzureiben und als dünner Brei einzuflößen.
61. Natron, salicylsaures, Auflösung in dest. Wasser (1 : 100), theelöffelweise einzugeben.
62. Natron, salicylsaures, Auflösung ebenso zum Einspritzen, jedesmal 1—2 degr.
63. dsgl. unterschwefligsaures, Auflösung in warmem Wasser, 0,5—1 gr täglich zweimal.
64. Oelgemisch (Terpentinöl 1, Olivenöl 6).
65. Opium-Tinktur, 1 bis 5 Tropfen in 30 gr Trinkwasser.
66. Ozonwasser.
67. Perubalsam.
68. Pfefferminzkraut-Aufguß (2 : 60) mit doppeltkohlensaurem Natron (1 : 60).
69. Phosphorsäure in Wasser (1 : 200), 3 bis 5 Tropfen als Gabe.
70. Pottasche, Auflösung in Wasser (1 : 10).
71. Pottasche, Auflösung in Wasser (10 : 750) mit Opium-Tinktur (3).

Digitized by Google

72. Rizinusöl, ½—1 Theelöffel voll.
73. Salicylsäure-Wasser, Auflösung in heißem Wasser (ohne Spiritus-Zusatz; 1 : 300) zum Eingeben und Pinseln.
74. Salicylsäure-Wasser, Auflösung ebenso (1 : 500) zum Einspritzen, jedesmal 1 degr.
75. Salmiakgeist, 1—2 Tropfen in Wasser zu geben.
76. Salmiak-Mixtur (S. $0_{,5}$ gr, Honig 5 gr, Fenchelwasser 50 gr).
77. Salpeter, gereinigter, $0_{,06}$—$0_{,12}$ gr in Wasser als Gabe.
78. Salzsäure, 1 Tropfen auf ein großes Weinglas voll Trinkwasser.
79. Schwefelmilch (Sulphur praecipitatum) mit Wasser (1 : 200) angerieben und täglich zwei- bis dreimal 1 Theelöffel voll einzugeben.
80. Spritzbad aus Franzbranntwein, Kölnisch-Wasser, Rum oder Spiritus mit verschlagnem Wasser (5 : 100).
81. Tabak-Aufguß (5 : 100).
82. Tannin, Auflösung in Wasser (1—2 : 100).
83. Terpentinöl, gereinigtes oder rektificirtes (innerlich 1—5 Tropfen im Wasser als Gabe).
84. Theerdämpfe (Theer 1 : mit heißem Wasser 50; in kleinem Fläschchen unter den Schnabel zu halten).
85. Wallnußblätter-Aufguß (5 : 100).
86. Zinksalbe.
87. Zinkvitriol, reines, Auflösung in dest. Wasser (3 : 500).

Digitized by Google

Die sprechenden Papageien.

Dem Titel dieses Werks gemäß muß ich hier alle Papageien behandeln, welche sich bisher als sprachbegabt gezeigt haben und zwar von den besten Sprechern herab bis zu jeder Art, von der nachgewiesen ist, daß wenigstens einer ihrer Angehörigen mindestens ein Wort aussprechen gelernt hat. Selbstverständlich werde ich das Verhältniß der so sehr verschiedenartigen Begabung entsprechend berücksichtigen, die werthvollen hervorragenden Sprecher ausführlich und die übrigen um so kürzer darstellen, je geringer sich ihre Bedeutung für diese Liebhaberei ergibt. In meinen vorhin genannten Büchern habe ich diese Vogelfamilie in zwei große Gruppen getheilt und zwar Kurzschwänze oder eigentliche Papageien und Langschwänze oder Sittiche. Die ersteren bergen in ihren Reihen die vorzüglichsten Sprecher und ich beginne daher hier mit deren Schilderung. Unter ihnen gibt es Geschlechter, deren sämmtliche Glieder Sprachbegabung gezeigt haben, wie z. B. die Grau- und Schwarzpapageien und die Amazonen, während in vielen anderen Geschlechtern sowol der Kurz- als auch der Langschwänze sich bisher nur einige Arten oder auch nur eine einzige als sprachfähig erwiesen haben. Die Geschlechter, aus denen noch keine Art als sprechend ermittelt ist, sind hier S. 6 erwähnt und ich lasse sie im weitern unberücksichtigt. Eine Seite der Lieb-

Digitized by Google

haberei für Papageien, welche in neuerer Zeit recht bedeutungsvoll geworden, die Züchtung nämlich, muß ich hier nothgedrungen, als nicht in den Rahmen dieses Buchs gehörend, vollständig übergehen. Von den kleineren und kleinsten Arten werden manche bekanntlich bereits außerordentlich erfolgreich gezüchtet, und die Jungen mit Vorliebe zur Abrichtung als Sprecher benutzt. Mit den großen werthvollsten Sprechern aber stellt man dergleichen Versuche bis jetzt kaum an, einerseits weil solch' Vogelpar einen besondern großen Raum dazu braucht und andrerseits und hauptsächlich weil man kostbare sprechende oder doch gute Aussicht für erfolgreiche Abrichtung gewährende Papageien nicht einer etwaigen Gefahr aussetzen will. Die letztre Befürchtung ist indessen auf einem Vorurtheil begründet; denn nach meinen Erfahrungen ist der Vogel während des Nistens bei sachverständiger Behandlung und Verpflegung durchaus nicht mehr als sonst gefährdet.

Das Geschlecht **Eigentlicher Papagei**, zu welchem die Graupapageien (Psittacus, *L.*) und die Schwarzpapageien (Coracopsis, *Wgl.*) vereinigt sind, zählt den hervorragendsten aller Sprecher zu seinen Angehörigen. Es sind sechs Arten und zwar zwei graue und vier schwarze, die auf den ersten Blick so verschieden erscheinen und bei näherm Kennenlernen ihrer Eigenthümlichkeiten sich auch als so wenig übereinstimmend ergeben, daß der Liebhaber sie kaum als zusammengehörig betrachten möchte, während der Systematiker sie doch an einander reiht. Ihre übereinstimmenden Kennzeichen sind: Schnabel seitlich abgerundet, mehr oder minder breit und gewölbt, mit gerundeter First, Oberschnabel ohne Zahnausschnitt, mit Feilkerben, Unterschnabel niedriger mit abgerundeter Dillenkante, vor der Spitze sanft ausgebuchtet; Nasenlöcher groß, rund; Wachshaut, Zügel und breiter Augenkreis nackt; Zunge dick, glatt, mit abgestumpfter Spitze; Flügel lang und spitz, neun bis zwölf Armschwingen; Schwanz breit, fast gerade oder abgerundet; Gefieder weich, jede Feder breit, abgestutzt; Füße stark, mit dicken Tarsen

Digitized by Google

und kräftigen stark gekrümmten Nägeln; zwischen Dohlen- bis Krähengröße. Bei den Grauen ist der Schnabel länger, mehr zusammengedrückt, mit längerer und dünnerer Spitze, der Schwanz kurz, fast gerade, die Federn sind am Ende klammerförmig; bei den Schwarzen dagegen ist der Schnabel dick, abgerundet, so hoch wie lang mit wenig hervorragender kurzer Spitze, der Schwanz länger und mehr abgerundet; beide erscheinen durch die nackten Gesichtstheile von den nächsten Verwandten (den Amazonen oder Kurzflügelpapageien aus Amerika) abweichend; bei den schwarzen Arten ist die nackte Nasenhaut meistens etwas aufgetrieben. Die Bewegungen der grauen Arten sind schwerfällig, ihr Flug ist zwar rasch, doch ungewandt, ihr Gang auf der Erde unbeholfen und selbst das Klettern ist ungeschickt, bei den schwarzen Arten sind die Bewegungen etwas behender, mindestens rascher; die natürliche Stimme der Grauen ist schrill und gellend, die der Schwarzen kurz und rauh, zuweilen auch flötend; die Sprachbegabung der ersteren ist wol die höchste unter allen Papageien überhaupt, die der letzteren zeigt sich als gering oder doch nur als mittelmäßig. Ueber das Freileben der hierher gehörenden Vögel ist bis jetzt recht wenig bekannt, umsomehr ist ihr Wesen in der Gefangenschaft in jeder Hinsicht erforscht worden. Alles Nähere werde ich in der Schilderung der einzelnen Arten mittheilen.

Der rothschwänzige graue Papagei

[Psittacus erithacus, *L.*].

Grauer Papagei oder Jako, Graupapagei, rothschwänziger Papagei und rothschwänziger Graupapagei. — Grey Parrot, Coast Grey Parrot. — Perroquet gris, Perroquet cendré, Jaco. — Grauwe of Grijze Papegaai.

Kein andrer Papagei, ja kein Vogel überhaupt steht in Hinsicht der Begabung so hoch wie der gemeine Graupapagei und zwar erstreckt sich dieselbe nach mehreren Seiten hin, denn er ist unbedingt der vorzüglichste Sprecher und ein geistig reich veranlagtes Thier zugleich. Mit Recht erfreut er sich daher der größten und allgemeinsten Beliebtheit.

Schon seit dem Alterthum her soll er bekannt sein, und

Digitized by Google

wenn es auch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden kann, daß ihn die alten Kulturvölker bereits besessen, so sprechen doch schon unsere Schriftsteller aus dem 16. Jahrhundert von ihm. Im Mittelalter wurde er häufig nach Europa gebracht, und seitdem hat die Liebhaberei für ihn sich immer weiter verbreitet.

Im Gegensatz dazu erscheint es recht verwunderlich, daß die Reisenden bisher noch keine ausreichende Erforschung seines Freilebens zu erlangen vermochten, daß seine Ernährungsweise, sein Nisten, Jugendkleid und all' dergleichen wichtige Punkte noch keineswegs bekannt sind.

Der Graupapagei ist aschgrau, an Kopf, Hals, Brust und Oberrücken jede Feder mit hellem Saum; Flügel dunkler grau ohne helle Federsäume, Schwingen grauschwarz; Mittelrücken, Unterrücken und Bürzel rein grauweiß; Schwanz, obere und untere Schwanzdecken scharlachroth; Brust, Bauch, Seiten und Hinterleib weißgrau; Schnabel schwarz; Auge je nach dem Alter schwarz, grau, gelb bis weiß; Nasenhaut, Zügel und Gegend ums Auge nackt, grauweiß; Füße bläulich bis weißgrau, mit schwarzen Schildchen, Krallen schwarz. Das Gefieder ist wie bei vielen Papageien mit Federstaub (Puderdaunen) mehr oder weniger gefüllt. Die Größe*) wechselt außerordentlich, offenbar unabhängig von Alter und Geschlecht und wahrscheinlich je nach der Heimatsgegend; sie ist etwa die einer starken Haustaube (Länge 36—40 cm [die kleinsten 30—32 cm]; Flügel 19,6—23 cm; Schwanz 7—8,9 cm). — Die Geschlechtsunterschiede sind bis jetzt mit Sicherheit noch nicht bekannt; man hat die kleinen helleren Papageien für Weibchen und die großen dunkleren mit langem Hals für Männchen gehalten; die Neger sollen behaupten, daß die Nasenlöcher beim Männchen rund, beim Weibchen länglich seien; das einzige sichre Unterscheidungszeichen dürfte (nach Soyaux) wol nur darin liegen, daß die Beckenknochen beim Männchen dicht neben einander, beim Weibchen aber so weit von einander entfernt

*) Die Angabe der populären Größe täuscht oft, deshalb füge ich stets noch die genauen Maße, nicht allein an Bälgen, sondern auch an lebenden Vögeln gemessen, hinzu.

Digitized by Google

sind, daß das Ei hindurchgelangen kann. — Das Jugendkleid ist bisher ebenfalls nicht sicher festgestellt, wenigstens hat Keiner der Afrikareisenden angegeben, ob der junge Vogel bereits mit rothem Schwanz oder, wie Jemand gesagt, der es freilich nicht beweisen kann, mit braunem Schwanz die Nesthöhle verlasse. Ueber die jungen Jakos, wie sie in den Handel kommen, schreibt Herr Otto Richter in Bremerhaven, er erkenne sie am sichersten an den braunen Nestfedern, welche mit Ausnahme des Kopfs, der Schwingen, des Schwanzes und Bauchs den ganzen Körper bedecken und nach und nach den grauen hellgerandeten weichen. Bei der Ankunft haben diese jungen Vögel meistens noch schwarze Augen, dann färben dieselben sich allmälig dunkel aschgrau, nach etwa fünf Monaten hellgrau, binnen Jahresfrist graugelb bis blaßgelb und erst nach drei bis vier Jahren maisgelb bis gelblichweiß. Der Schwanz ist hellroth, jede Feder schwach bräunlich gesäumt und verfärbt sich allmälig zu dunklerm Roth, während die schwärzlichbraune Färbung verschwindet. — Es kommen vielfache Farbenspielarten vor, von denen man die rothgescheckten selbst bis oberseits ganz rothen, die schon in ihrer Heimat sehr geschätzt und theuer sein sollen, in England Königsvogel (Kingbird oder nur King) nennt und mit hohem Preise bezahlt, man glaubt auch, daß sie größre Begabung haben, doch dürfte dies noch keineswegs feststehen; außerdem gibt es ganz graue, also ohne rothen Schwanz und in Rußland soll ein Händler kürzlich einen Graupapagei mit weißem Schwanz gezeigt haben.

Der Name Jako, mit welchem man diesen Papagei gewöhnlich bezeichnet, soll nach Buffon die Wiedergabe eines Naturlauts und zwar in portugiesischer Aussprache sein. Seine Heimat bildet das westliche und mittlere Afrika, also ein weiter Bezirk, in dem er stellenweise überaus häufig ist und gesellig in großen Schwärmen leben soll. Als seine Nahrung kennt man bisher allerlei Baumfrüchte, vornehmlich Bananen und Palmennüsse, und sodann richten die Schwärme nicht selten großen Schaden in den Maisfeldern u. a. an, wo sie noch dazu viel mehr verwüsten als verzehren. Beim Plündern der Feldfrüchte verhalten sie sich, wie übrigens fast alle Papageien, aus Vorsicht der Verfolgung wegen ganz still, während sie auf

Digitized by Google

hohen Bäumen zum Uebernachten einfallend oder in der Höhe dahinziehend, weithin schallenden Lärm machen. Keulemans berichtet, daß die Brut im September nach der Regenzeit stattfinde und zwar in einer sehr tiefen Baumhöhlung, auch meistens im unzugänglichen Waldesdickicht, sodaß es überaus schwer sei, das Nest zu erlangen. Gewöhnlich nisten sie gesellig, oft zu einigen Hundert Pärchen zusammen, doch immer nur ein solches in jedem Baum. Das Gelege soll aus 4 — 5 Eiern bestehen, welche, wie die aller Papageien, rein weiß sind, und die Jungen sollen mit langem Flaum bedeckt sein, schnell heranwachsen, schon nach vier Wochen flügge werden und nach zwei Monaten die erste Mauser durchmachen; das Auge bleibe sieben Monate lang dunkel. Näheres ist leider nicht mitgetheilt. Der letztgenannte Reisende sagt auch, daß die Alten ihre Brut wacker zu vertheidigen wissen, und darin, daß die Neger sich vor den Schnabelhieben fürchten, möge es wol begründet sein, daß sie die Jungen stets erst dann rauben, wenn dieselben bereits das Nest verlassen haben, jedoch noch nicht fluggewandt sind. Die schon vollkommen flüggen Jungen sollen mit Schlingen oder Netzen leicht zu fangen sein. Beiläufig sei erwähnt, daß die meisten Reisenden diesen Vogel als wohlschmeckendes Wildbret rühmen.

An der Goldküste bringen die Neger die jungen Graupapageien, wie schon S. 12 gesagt, in röhrenförmigen Körben massenhaft nach den Hafenstädten zum Verkauf, und hier bezahlt man sie mit etwa 3 M. nach unserm Gelde für den Kopf, während sie mehr im Innern von den Aufkäufern der Großhändler, in beträchtlicher Anzahl zusammen, natürlich viel billiger erhandelt werden. Der Preis steigt erklärlicherweise, sodaß sie auf den großen Dampfschiffen nicht selten schon 15 — 18 M. der einzelne gelten. Bereits gezähmte und abgerichtete Papageien, welche von den halbkultivirten in Missionshäusern erzogenen Negern

Digitized by Google

zum Verkauf gebracht werden und die wol bereits einige Worte in verdorbnem Englisch sprechen, stehen noch viel höher im Preise. Nach Dr. Fischer soll der Jako bei den Arabern ebenfalls sehr beliebt sein, er fand ihn im Innern überall in den arabischen Niederlassungen; in Sansibar kostete er 30—40 M.

Die Händler machen unter den eingeführten Graupapageien bedeutsame Unterschiede und zwar einerseits je nach der Gegend, aus welcher dieselben zu uns gelangen und andrerseits nach der Art und Weise der Einführung. Ussher berichtet, daß die schönsten Graupapageien aus den Wäldern von Akim nach den Städten der Kapküste und nach Akkra ausgeführt werden, wo sie 1—1½ Dollar für den Kopf preisen, und diese hellen Vögel hält man auch bei uns für die vorzüglichsten. Die großen langhalsigen dunkelgrauen Jakos, die aus dem Innern von Westafrika herkommen sollen, sind ebenfalls größtentheils vorzugsweise begabte Vögel, doch ergeben sich auch unter den ganz kleinen hellgrauen neben ihnen nicht selten vortreffliche Sprecher. Als besonders werthvoll erachtet man weiter die sog. ‚Segelschiffvögel', also Graupapageien, welche in geringrer Anzahl und daher bei bessrer Verpflegung herübergebracht worden, größtentheils auch wol beim Einkauf sorgfältiger ausgewählt sind. Sie sollen die Sicherheit gewähren, daß sie unterwegs nicht den Keim jener unheilvollen Blutvergiftung (s. S. 13 und S. 83) empfangen haben und also von vornherein mindestens für lebensfähig angesehen werden dürfen; hierin würde in der That ein bedeutsamer Werth liegen, allein in allen Fällen ist jene Voraussetzung leider nicht zutreffend. ‚Dampfschiffvögel' nennt man schließlich die, wie S. 11 erwähnt, massenhaft und unter den übelsten Verhältnissen eingeführten Graupapageien.

Unterschiede liegen sodann noch in den Bezeichnungen ‚schwarzäugige' und ‚grauäugige' Jakos. Zunächst ist dabei

Digitized by Google

auf das in der Beschreibung S. 104 Gesagte zu achten und außerdem füge ich nach Dr. Lazarus noch folgendes an: „Die meisten in den Handel gelangenden jungen Graupapageien zeigen bereits dunkelaschgraue Augen; ich erachte aber einen solchen mit graugelben Augen als für den Einkauf am vortheilhaftesten, weil derselbe nicht mehr so zart und weichlich wie ein ganz dunkeläugiger ist. Die hellgrau- bis graugelbäugigen (oder noch ganz dunkeläugigen), welche nicht groß sind, einen schlanken Hals und einen kleinen länglichen Kopf haben, ergaben sich mir stets als die gelehrigsten Vögel, während die großen mit rundem dicken Kopf und kurzem dicken Hals sehr wenig gelehrig sind. Dies dürfte sich wenigstens im allgemeinen als zutreffend erweisen." Im übrigen sei auf das hinsichtlich der verschiedenartigen Begabung S. 61 bereits Angeführte hingewiesen und meinerseits ausdrücklich bemerkt, daß ich Unterschiede in der Begabung nach der bedeutend schwankenden Größe, der hellern oder dunklern Färbung, der mehr schlanken oder mehr gedrungnen Gestalt, dem gleichfalls verschiednen, größern und kräftigern oder kleinern, Schnabel und allen übrigen derartigen Merkmalen nicht gefunden habe und an solche auch nicht glaube. Herr Kreisgerichtsrath Heer hält die Farbe der Augen für nicht im entferntesten Ausschlag gebend. „Ich erhielt," schreibt er, einen gelbäugigen Jako von Fräulein Hagenbeck, der ganz ausgezeichnet sprechen gelernt hat. Er sagt z. B. ohne allen Anstoß: ‚'s war Einer, dem's sehr nahe ging, daß ihm der Zopf so hinten hing, er wollt' es anders haben.' Wer das hört, bricht in ein schallendes Gelächter aus."

Wie schon eingangs erwähnt, sprechen bereits die ältesten Schriftsteller auf unserm Gebiet förmlich mit Begeistrung von den Fähigkeiten des Jako. Buffon lobt ihn „sowol wegen der Annehmlichkeit seiner Sitten als seines Talents und seiner Ge-

Digitized by Google

lehrigkeit" und sagt, die Gesellschaft eines solchen Vogels, dessen Verkehr zwischen uns und ihm durch die Sprache vermittelt werde, sei entschieden angenehmer als die eines Affen, welcher nur durch sonderbare Nachahmung unserer Gebehrden Interesse erwecken könne. „Der sprechende Vogel unterhält, zerstreut und ergötzt uns, bietet uns in der Einsamkeit Umgang, spricht und antwortet uns, bewillkommnet uns, läßt zärtliche Töne hören, lacht oder erscheint ernsthaft wie ein Mensch, welcher Denksprüche redet. Seine Worte belustigen manchmal, weil sie garnicht passen und überraschen zuweilen, weil sie so genau zutreffen. So ist sein Spiel mit Worten ohne Gedanken verwunderlich und grotesk ohne lerer zu sein als manches menschliche Geschwätz. Mit der Nachahmung unserer Worte scheint der Papagei zugleich etwas von unseren Neigungen und Sitten anzunehmen: er liebt und haßt, zeigt Anhänglichkeit, Eifersucht und Laune, hat bestimmte Lieblingsgegenstände, bewundert sich selbst, spendet sich Beifall, macht sich Muth, ist fröhlich oder traurig, bei Liebkosungen scheint er in Bewegung zu gerathen und wird sehr zärtlich, er küßt förmlich mit Inbrunst; in einem Trauerhause lernt er seufzen, und wird er gewöhnt, den Namen einer geliebten Person, welche abwesend ist, zu nennen, so verursacht er empfindlichen Seelen Freude oder Leid."

In diesen Worten des ältern Schriftstellers, welche wir bei den neueren mit mancherlei Abwechselungen immer wiederholt sehen, liegt mindestens in allgemeinen Umrissen eine durchaus zutreffende Kennzeichnung des Jako; zugleich haben wir in den geschilderten Vorzügen, bzl. Leistungen aber auch eine Erklärung für die außerordentlich lebhafte Liebhaberei, Neigung und Vorliebe für den Graupapagei, welche wir von den rohen Völkern seiner Heimat bis über die ganze gebildete Welt verbreitet finden.

Unwillkürlich fragen wir nun aber, wie weit erstreckt sich

Digitized by Google

die Begabung des sprechenden Vogels, und da ergibt eine sachgemäße Antwort große Schwierigkeiten. Wir sehen, daß die bedeutendsten Schriftsteller in ihren Urtheilen entweder über die Thatsächlichkeit hinaus gehen oder vor derselben zurückbleiben. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. habe ich eine Gegenüberstellung derartiger Aussprüche gegeben, aus welcher nachzuweisen ist, daß die Wahrheit hier wie in den meisten Lebensverhältnissen überhaupt in der Mitte liegt. Die nachstehend angeführten Beispiele mögen zur Erläuterung dienen.

Es gibt zunächst Schilderungen von einigen Papageien, welche von einer Naturgeschichte in die andre hinübergenommen werden und dadurch gleichsam historisch geworden sind; könnten wir sie nach ihrem wahren Werth prüfen, so würden wir uns sicherlich davon überzeugen, daß mindestens starke Uebertreibung regelmäßig vorhanden ist.

Levaillant erzählt, daß ein Papagei in Amsterdam eine große Anzahl von Redensarten deutlich sprach, ohne nur eine Silbe zu vergessen; „er konnte als wahrer Cicero gelten und man hätte ein ganzes Buch mit seinen Redensarten füllen können. Auch machte er allerlei Kunststücke holte auf Befehl Nachtmütze und Pantoffeln u. s. w." Der Papagei des Präsidenten v. Kleimayrn in Wien „sprach, sang und pfiff ganz ebenso wie ein Mensch"; selbst eine Arie aus der Oper „Martha" trug er vor. „Zuweilen zeigte er sich in Augenblicken der Begeistrung als Improvisator" (!). „Er zeigte durchaus menschlichen Verstand"; wenn er im Zimmer seines Herrn war, blieb er so lange ruhig wie derselbe schlief. „Als im Frühjahr eine Wachtel neben ihm zum erstenmal schlug, wandte er sich gegen sie um und rief bravo". Brehm schildert den Graupapagei einer Dame, „welcher in drei Sprachen schwatzte, so deutlich wie ein Mensch, dabei aber oft Redewendungen auffaßte, welche

Digitized by Google

ihm niemals vorgesagt worden (!) und die er dann zum Erstaunen Aller gelegentlich passend anwandte. Er brachte auch holländische Worte sinnig (!) zwischen deutschen an, wenn ihm in der ersten Sprache das passende Wort mangelte oder nicht einfiel." Dann folgt ein Beispiel seines Scharfsinns, welches denn doch Alles übertrifft, was bisher in solcher Hinsicht von einem Papagei behauptet worden. „Ein dicker Major, welchen er gut kannte, machte eines Tags Versuche, ihn Kunststücke zu lehren. ‚Geh' auf den Stock, Papchen, auf den Stock!' befahl der Krieger. Der Papagei war entschieden verdrossen. Da plötzlich lacht er laut und sagt: ‚Major auf den Stock, Major!'" Brehm nennt dies freilich einen der Witze des Vogels und fügt dann hinzu: „Was der Papagei sonst noch Alles gesprochen und gethan, vermag ich nicht aufzuzählen; er war ein halber Mensch."

Im Gegensatz zu derartiger überschwenglicher Auffassung steht der Ausspruch von Dr. Jäger: „Das Sprechen der Papageien ist von dem ihres Lehrmeisters, des Menschen, weit verschieden, weniger der Form nach, denn in dieser Beziehung ist es eine vollkommene Nachahmung des vorgesprochnen Worts in Höhe, Klang und Betonung, als vielmehr darin, daß das Thier das Wort blos als Laut auffaßt und es nur gerade so nachahmt, wie es ausgesprochen worden." Dr. Finsch geht darüber noch hinaus, indem er hinzufügt, „das Thier kennt die Bedeutung des menschlichen Worts nicht." Aber auch diese Urtheile sind sicherlich nicht zutreffend, sondern von vornherein leicht zu widerlegen, indem man sich unschwer davon überzeugen kann, daß der Papagei sehr wohl die Bedeutung der Worte kennen lernt und sie mit voller Erwägung anzuwenden weiß. Meine persönliche Meinung über das Sprechen aller Papageien habe ich bereits S. 8 und 64 dargelegt und ich brauche hier nichts mehr hinzuzufügen; nur den Aus-

Digitized by Google

spruch möchte ich noch wiederholen: trotz zahlloser Schilderungen, trotzdem hervorragende Männer ihre Federn um der gefiederten Sprecher willen in Bewegung gesetzt, ergibt sich dennoch die leidige Thatsache, daß unsere Beobachtungen, selbst gründlichen Forschungen, noch keineswegs auf so festem Boden stehen, um uns völlige Klarheit inbetreff des Seelenlebens jener Thiere gewähren zu können. Wir sollten uns demnach mit der Feststellung der Thatsächlichkeit begnügen, ohne bis jetzt aus derselben durchaus sichere Schlüsse ziehen zu dürfen.

Fast unzählige Schilderungen sprechender Graupapageien hat meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt" im Laufe von mehr als zehn Jahren gebracht, und zur Kennzeichnung der so überaus mannigfach verschieden begabten und gearteten Jakos will ich hier eine Blumenlese aus solchen Mittheilungen anfügen.

Ueber den Graupapagei des Herrn Direktor Kastner in Wien, vielbekannt und bewundert als ein ausgezeichneter Vogel, wird folgendes berichtet: In der ersten Zeit nach seiner Ankunft sprach er nur, wenn Niemand im Zimmer war; bald aber fing er an zu plaudern, ohne sich um die Umgebung zu kümmern. Er lacht im herzlichen Ton mit, wenn es von Anderen geschieht u. s. w.; bei leisem Pfeifen ruft er sogleich ‚Karo, wo ist der Karo' und pfeift den Hund dann selbst herbei. Er flötet mit seltner Kunstfertigkeit die verschiedensten Melodien, und namentlich täuschend ahmt er allerlei Thierstimmen nach. Sobald die Tischglocke erschallt, ruft er mit immer höherer Stimme die Aufwärterin ‚Katti', bis sie erscheint. Auf Anklopfen ruft er ‚herein', doch läßt er sich nicht täuschen, wenn es Jemand im Zimmer thut. Sieht er, daß eine Flasche entkorkt werden soll, so ahmt er, lange bevor der Pfropf herauskommt, genau den Laut nach. Mit sich selber spricht er in sanftem zärtlichen Ton ‚du gutes, gutes Jackerl' u. s. w. Mit kräftiger Männer-

Digitized by Google

stimme ruft er ‚Wach' heraus' u. s. w. und macht die Trommellaute ‚tra, ta, tra, ta' nach oder schlägt sie mit dem Schnabel am Käfig an; dann zählt er ‚eins, zwei, drei' u. s. w., und irrt er sich oder spricht er sonst ein Wort undeutlich aus, so verbessert er sich solange, bis er es richtig und deutlich gesagt hat. Wenn der neben ihm stehende grüne Papagei schreit, so sucht er ihn erst durch den Zuruf ‚pstt' zu beschwichtigen und wenn dieser nicht hilft, so schilt er mit erhobner Stimme ‚wart', wart', du!' Ueberhaupt spricht er mit außerordentlich wechselndem Ausdruck, zärtlich zu seinem Herrn und dessen Frau u. s. w., bittend, wenn er etwas haben will und scheltend, wenn er es nicht bekommt. Spät abends pflegt er noch mit sich selber zu plaudern und schließt dann regelmäßig mit den Worten ‚gute Nacht, gute Nacht, Jackerl.'

Zu den hervorragendsten Graupapageien gehört der des Herrn Ch. Schwendt: „Einen Beweis dafür, daß man keinenfalls die Geduld verlieren darf, wenn ein Jako durchaus nicht sprechen lernen will, hat der meinige in auffallender Weise gegeben; ich mußte volle 8 Monate warten bis er nur das eine Wort ‚Jakob' herausbrachte, denn aber wurde ich reichlich entschädigt, denn nun lernte er fast an jedem Tage etwas Neues hinzu und heute, nach vier Jahren, weiß er soviel, daß es mir unmöglich ist, alles anzuführen, was er spricht. Es gibt fast keinen Ausdruck der täglichen Unterhaltung in der Familie, welchen er nicht nachsprechen gelernt hat — und wie trefflich weiß er die Worte richtig anzuwenden! Er redet alle im Hause befindlichen Menschen und Thiere mit ihren Namen an, ruft und befiehlt den Hunden und Katzen, pfeift den ersteren, lockt die letzteren oder schilt sie, ‚marsch hinaus' u. s. w. Läßt das Schwarzköpfchen sich hören, so heißt es sogleich ‚wart' Schwarzkopf', schreit die Amsel, so ruft er, ‚bist still oder ich komm' und du kriegst Wichse, Hex' (so heißt die Amsel). Gleicher-

Digitized by Google

weise unterscheidet er das ‚Hanserl', den Kanarienvogel, ‚'s Rothkehle' und die ‚Papageile' (Wellensittiche), ohne je deren Benennungen zu verwechseln. Von dem Ausdruck der zärtlichsten Schmeichelnamen bis zum barschen Kommando ‚faßt das Gewehr an' u. s. w. vermag seine Stimme in staunenswerther, richtiger Betonung und deutlicher Aussprache zu wechseln. Dann sagt er Verse her und lobt sich selbst, wenn er keinen Fehler macht; geschieht dies aber, so sagt er ‚'s ist nix, dummer Kerl!' Jeden Gruß bringt er der Tageszeit entsprechend richtig vor, alles was er haben möchte, weiß er zu fordern. Er vermag bis 8 richtig zu zählen."

Herr Major Freiherr von Siegroth erzählt: „Unser junger Jako begann schon am Morgen nach seiner Ankunft wie eine Henne zu gackern, und als er dann das Frühstück sah, rief er ‚backe backe Kuchen' und wieder ‚gib dem Papagei'; weiter plauderte er viele Redensarten, wie solche die Händler den Papageien beibringen. Bei uns lernte er dann leicht und mit großem Verständniß außerordentlich viel hinzu. Es sei nur einiges von seinen Kenntnissen angeführt. Dem Hunde rief er zu: ‚Karo, schöne machst du!' und dabei stampfte er mit dem Fuß und nickte mit dem Kopf, wie er es von mir gesehen. Spaßhaft war es, wenn der kleine Hund diesem Befehl wirklich Folge leistete. Der Friseur, welcher täglich ins Haus kam, trat an den Käfig, grüßte militärisch mit der Hand und machte eine Verbeugung. In kurzer Zeit ahmte der Vogel dies nach, hob den Fuß in drolliger Weise nach dem Kopf und machte gleichfalls einen tiefen Bückling, indem er ‚Guten Morgen' sagte. Unter anderen bemerkenswerthen Leistungen erwähne ich noch derer, daß er, wenn ich oder meine Frau nach der Klingel gehen, sogleich den Namen des Dieners ‚Klaus' ruft." Dies ist übrigens der bereits S. 63 erwähnte Graupapagei, welcher einer Amazone Unterricht im Sprechen gab. Der Herr Major

Digitized by Google

zählt nun zahlreiche Worte und ganze Redensarten auf und fährt dann wie folgt fort. „Ueberaus täuschend ahmt er Hundegebell, Katzenmiauen und das Hahnenkrähen nach. Erzählt Jemand etwas Komisches und wir lachen, so fallen beide Vögel schallend ein. Wenn von der Dienerschaft die Stube aufgeräumt oder sonst etwas vorgenommen wird, was dem Jako unangenehm ist, so fängt er an, den Uebelthäter mit all' seinen Schimpfworten zu überschütten. Diese und andere häßliche Reden hat er von den Straßenjungen gelernt, als er den Sommer hindurch am offnen Fenster gestanden."

Ein bemerkenswerthes Beispiel der so sehr verschiedenartigen Begabung gab der Graupapagei des Herrn W. Stücklen. Er war kein hervorragender Sprecher und hatte vielleicht nur einen Sprachschatz von 10 bis 12 Worten aufzuweisen, aber er zeigte erstaunliche Klugheit. „Wenn ich ihn frei ins Zimmer lasse und er an den Möbeln herumzunagen beginnt, so genügt ein einziges Wort und er unterläßt es sofort. Wenn er meinen Schritt hört, so begrüßt er mich mit lautem Ruf, bevor ich noch die Thür geöffnet habe und wenn ich an seinen Käfig trete, scharrt und bettelt er so lange, bis ich ihn aus dem Käfig nehme. Beim Frühstück wendet er sich, während er mich sonst nie verläßt, an meine Mutter, da er deren größre Freigebigkeit kennt. Er ist ein Feinschmecker ersten Rangs und kommt von seinem besondern Stuhl am Eßtisch auf den letztern, wenn er nicht von sämmtlichen Speisen etwas erhält. Bier trinkt er sehr gern und öffnet sich das Deckelglas selber, auch vermag er eine Flasche zu entkorken, indem er, sich mit den Füßen an den Flaschenhals hängend, den Stöpsel Stück für Stück herausnagt. Abends zwischen 8 und 9 Uhr, aber nie zu andrer Zeit, sagt er, sobald ich den Stuhl rücke, ‚gute Nacht'. Morgens wird er mir von meinem Burschen ins Zimmer gebracht und klettert dann sogleich am Bett in die Höhe. Stelle ich mich

Digitized by Google

schlafend, so berührt er mit dem Schnabel leise meine Lippen und bleibt regungslos solange sitzen, bis ich die Augen aufschlage. Jeden Scherz läßt er sich gern gefallen. Als er einst als Puppe ausgeputzt und in ein Wickelkissen gesteckt wurde, fühlte er sich augenscheinlich dadurch geschmeichelt, daß ihn Alle belachten. Wenn er sich bei einem schlechten Streich ertappt sieht, so duckt er demüthig den Kopf auf den Tisch. Als ich ihn einst, da er sich die Federn abzukneifen begonnen, die Stümpfe auszupfte und ihn auf den Rücken gelegt hatte, dachte er trotzdem nicht daran, mich zu beißen, sondern er unterwarf sich geduldig, obwol mir bei jedem Federriß ein kurzer Aufschrei bewies, wie schmerzhaft ihm das Rupfen war, und küßte meine Finger, wie um mich zu bitten, daß ich einhalten möge" u. s. w.

Hierher gehört schließlich auch noch als eigenartig begabt der Jako des Afrikareisenden Soyaux, „ein alter und wilder Vogel, der auch nicht sehr zahm geworden, aber um seiner Größe willen, immer bewundert wurde. Er sprach fast garnichts, sondern sagte nur selten einmal das Wort ‚Kusu' (Bezeichnung der Papageien bei den Loango-Negern). Seine Hauptstärke lag im Pfeifen, und ich habe niemals etwas derartiges von einem andern Papagei gehört. Nicht etwa, daß er besonders kunstvoll oder ganze Lieder pfiff, aber die Klangfarbe war wunderbar, mächtig, voll und glockenrein wie hohe Orgeltöne, er rollt z. B. die Tonleiter hinauf und hinab, stets jedoch so, daß er immer einen Ton überspringt und den ausgelaßnen erst nach dem zweiten bringt. Sein ‚hu' und sein ‚au' in den klarsten Tönen klingt herrlich. Dann aber bewundre ich sein Gedächtniß für Vogelstimmen aus Afrika, er ahmt den Ruf des Regenpfeifers, der Schildkräbe u. a. m. treu nach".

Den Abschnitt „Einkauf" (S. 16 ff.) muß ich inbezug auf den Graupapagei noch in Folgendem ergänzen: Anfängern in

Digitized by Google

dieser Liebhaberei widerrathe ich entschieden den Ankauf eines schwarzäugigen, also ganz jungen Jako, weil selbst beim billigsten Einkauf ihm immer Verlust bevorsteht; namentlich aber auch weil das trostlose Hinsterben solchen Vogels einen unendlich betrübenden und zugleich nur zu sehr abschreckenden Eindruck macht. Mehrmals habe ich allerliebste noch ganz junge Graupapageien, wie solche Seeleute selber mitzubringen pflegen, in der Voraussetzung angekauft, daß sie unterwegs besser behandelt und also lebensfähig sein würden, in allen Fällen aber starben auch sie unrettbar dahin. Endlich fand ich folgende Erklärung. Bei der Ueberführung, wenn die Vögel massenhaft in den Kästen zusammengepfercht sind, werden die jüngeren regelmäßig von den älteren gefüttert, und solange dies geschieht und sie zugleich in der hohen Wärme bleiben, sind sie nicht der Erkrankung ausgesetzt; sie sterben aber um so rascher, sobald diese beiden Bedingungen fortfallen. Ganz ebenso oder doch ähnlich verhält es sich mit den erwähnten von Matrosen eingeführten noch ganz jungen Graupapageien; sie sind nicht allein gleichfalls im schwülen Schiffsraum gehalten, sondern man hat sie, ebenso wie die Neger sie aufgezogen, bis zum letzten Augenblick aus dem Munde mit gekautem Mais gefüttert. Es ist nun zum Erbarmen mit anzusehen, wie ein solcher vom Liebhaber angekaufter hilfloser Vogel nach Futter aus dem Munde seines bisherigen Ernährers jammert, ohne daß der neue Besitzer eine Ahnung davon hat, woran der Papagei zugrundegeht. Nur wer es kann und mag, ihn aus dem Munde weiterzufüttern, sollte einen solchen ganz jungen Jako kaufen. Dann wird diese Mühe freilich in der glänzendsten Weise belohnt, denn man hat die begründete Aussicht, nicht allein einen durchaus zahmen, sondern auch meistens reich begabten Vogel zu erlangen.

Wenn der Graupapagei frisch eingeführt in den Besitz des

Digitized by Google

Liebhabers gelangt, nachdem er den S. 15 geschilderten Weg wol durch soundsoviel Hände schon zurückgelegt, so hat er damit vor allem den Beweis von seiner außerordentlichen Lebenskraft gegeben. Obwol Bewohner des heißen Afrika, vermag er nach sachgemäßer Eingewöhnung unser Klima gut zu ertragen, wie dies Beispiele von entkommenen, die sich manchmal lange Zeit in der Freiheit erhalten und weder durch die Witterungsbeschwerden, noch durch die veränderte in allerlei Früchten und Sämereien sich bietende Nahrung gelitten haben, beweisen. Trotzdem darf man es jedoch niemals außer Acht lassen, daß selbst der seit vielen Jahren in der Gefangenschaft befindliche und vielmehr natürlich der soeben von der Reise angekommene, vielleicht noch jugendliche, andrerseits besonders aber der durch die Unbillen der Reise angegriffne oder bereits krankhafte Jako gegen Witterungseinflüsse, selbst gegen Temperaturschwankungen und selbstverständlich auch gegen unzweckmäßige Ernährung überaus empfindlich ist, wie ich dies in den Abschnitten über Empfang und Gesundheitspflege dargelegt habe. Bei den Graupapageien kommen leider nur zu sehr und in bedeutenderm Maße als bei irgendwelchen anderen Vögeln die S. 12 erörterten schlimmen Einflüsse der Ueberfahrt zur Geltung und vornehmlich unheilvoll wird für sie das Vorurtheil, daß sie kein Wasser bekommen dürfen oder der Umstand, daß für sie auf dem Schiff kein solches übrig ist. Infolge des quälenden Durstes fressen sie dann ihre eigenen Entlerungen, und namentlich dadurch, wie denn auch durch die übrigen üblen Einwirkungen, insbesondre der heißen, qualmigen Luft, wird der Grund gelegt zu jener verherenden Krankheit, die man als Sepsis oder Blutvergiftung bezeichnet und die ich S. 13 erwähnt und S. 83 besprochen habe. Es sei hier nur nochmals hervorgehoben, daß der krankhafte Zustand sich äußerlich garnicht erkennen läßt, daß die Vögel bei der Ankunft wie in bester Beschaffenheit erscheinen, während

Digitized by Google

sie doch bereits den Todeskeim tragen und durch kein Mittel zu retten sind. Man befolge also, um sich vor Verlusten zu bewahren, die im Abschnitt über Einkauf gegebenen Rathschläge. Will man einen Versuch mit billigen jungen Graupapageien machen, so beachte man auch den Rath von Dr. Lazarus, daß man solche nur dann anschaffe, wenn junger in Milch stehender Mais in Kolben zu haben ist (von Ende Juli bis November), indem diese Nahrung, reichlichst gegeben, das Trinkwasser wenigstens einigermaßen ersetzt und so eine allmälige Gewöhnung an das letztre möglich macht. Aus Vorsicht reiche man übrigens einem frisch angekauften Graupapagei, auch wenn man von seiner Gesundtheit überzeugt ist und der Verkäufer ausdrücklich versichert, daß er an Wasser gewöhnt sei, solches doch niemals ohne weitres in Fülle; man benutze es vielmehr zugleich als Zähmungsmittel (s. S. 56), reiche es ihm zunächst nur täglich ein- bis zweimal und lasse ihn jedesmal etwa drei Schluck nehmen. Ferner achte man in der ersten Zeit auf die Entlerungen des Vogels, ob ihm das veränderte Trinkwasser, auch wenn es wie S. 48 vorgeschrieben behandelt ist, nicht etwa Durchfall verursacht, in welchem Fall man nur täglich einmal einige Schluck spenden darf und wol auch Opiumtinktur (3—5 Tropfen in 30 gr Wasser) hinzufügen muß. Gerade beim Graupapagei halte man als wichtige Regel fest, daß man einen solchen, der kein Trinkwasser bekommen soll, niemals kaufen darf. Im übrigen bitte ich, alle im allgemeinen ertheilten Rathschläge, besonders aber die in den Abschnitten über Einkauf, Empfang und Ernährung, dem Graupapagei gegenüber vorzugsweise sorgsam auszuführen. Unrichtige Ernährung, besonders die leider nur zu vielfach übliche Fütterung mit allerlei menschlicher Kost, bringt ihm wie S. 43 erörtert, eine der schlimmsten Erkrankungen, das Selbstrupfen nämlich. Nur der gut gepflegte Jako erhält sich für die Dauer und erreicht

Digitized by Google

ein hohes Alter, welches nach vielfachen Erfahrungen 50 — 80 und selbst 100 Jahre und darüber währen kann.

Die Einführung der Graupapageien hat in der letztern Zeit außerordentlich zugenommen; es vergeht keine Woche, in der nicht in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt" neue Ankömmlinge dieser Art angezeigt werden, und ihre Gesammtzahl beträgt wol viele Tausend Köpfe alljährlich. Wer bedenkt, daß diese kostbaren Vögel mit verhältnißmäßig wenigen Ausnahmen von vornherein dem Tode verfallen sind, wird meinen Worten (S. 13) wol zustimmen und mit mir wünschen, daß der unselige Handel in dieser Weise ehemöglichst ein Ende nehme.

Preise: frisch eingeführte ganz rohe Graupapageien stehen im Großhandel manchmal, wenn auch selten, auf 4,50—6 Mark für den Kopf, häufiger bis zu 15 M.; bei den Händlern zweiter Hand gelten sie: selten 15 bis 16 M., meistens 22—24 M.; ausgeboten werden schwarzäugige Graupapageien à 18—20 M.; dieselben an Wasser gewöhnt à 30 M.; akklimatisirte Graupapageien à 36 M.; Segelschiffvögel à 30—45 M.; sprechende Graupapageien à 50—100 M., 300, 500, 600 bis 1000 M. und sogar noch darüber.

Der braunschwänzige graue Papagei [Psittacus timneh, *Frs.*] — Timneh, Timneh-Papagei, Timneh-Jako — Timneh Parrot — Perroquet timneh — Timneh Papegaai — unterscheidet sich von dem vorigen auf den ersten Blick nur dadurch, daß er dunkler grau ist, schokoladen- bis rothbraunen Schwanz und keinen ganz schwarzen, sondern auf der First und am Grunde blaßröthlichgrauen Schnabel hat, auch bemerkbar kleiner ist. Man hielt ihn früher für das Jugendkleid oder eine Spielart des gem. Graupapagei, doch ist er jetzt mit Sicherheit als selbständige Art festgestellt. Heimat: der Norden Westafrikas. Sein Freileben ist unbekannt. Im Handel erscheint er selten, doch ist er auf den Berliner Vogelausstellungen mehrmals vor-

Digitized by Google

handen gewesen. Frau Baronin Sidonie von Schlechta schildert ihn als anmuthig von Gestalt und sein Benehmen recht komisch, auch als überaus zutraulich gegen Jedermann. Er pfeife einen wundervoll reinen Ton und spreche deutlich, aber eigenthümlich langgezogen, doch nur verhältnißmäßig wenig. Das grunzende Geschrei des Jako habe er nicht, sondern einen hellen schrillen Ruf. Nach mehrmaliger alljährlicher Mauser bekam er stets den rothbraunen Schwanz wieder und sein ganzes Gefieder blieb gleichmäßig. Fütterung: Sonnenblumensamen, sowie scharf gebackner, geriebner und mit Milch oder Wasser angefeuchteter Zwieback. Für die Liebhaberei wird der Timneh immer nur geringe Bedeutung haben, da er weder schöner, noch begabter als der Verwandte ist und nur den Reiz der Seltenheit gewährt. Preis zwischen 30—75 M.

Der große schwarze Papagei

[Psittacus vaza, *Shw.*].

Vasa oder Vaza, großer Vaza-Papagei, großer Schwarzpapagei, Mohrenpapagei. — Greater Vaza Parrot. — Grand Vaza, Perroquet Vaza. — Groote Vaza Papegaai.

Die Bedeutung der schwarzen Papageien kommt auch nicht annähernd der des Jako gleich; denn kein einziger von ihnen hat sich bis jetzt trotz zahlreicher eifrigen Abrichtungsversuche als hervorragender oder auch nur bemerkenswerther Sprecher gezeigt. Noch dazu kann man sie keinenfalls als besonders schöne Schmuckvögel ansehen, indem sie in ihrem schlichten eintönigen Schwarz recht anspruchslos gefärbt erscheinen. Der einzige Vorzug, den man ihnen nachrühmt, liegt darin, daß sie laut und wohlklingend pfeifen, vortrefflich Liederweisen nachflöten und auch Vogelgesang nachahmen lernen; ferner nehmen sie ebenso gern allerlei andere Laute, wie Hundegebell, Miauen

Digitized by Google

der Katze, Hahnenschrei u. a. täuschend an. Im übrigen sind sie sehr ruhige, stille Vögel, die nur zeitweise etwas lebhafter werden, dann schnell mit den Flügeln schlagen und den Schwanz ausbreiten, sonst aber stundenlang träumerisch dasitzen. Im Käfig haben sie sich als kräftig und ausdauernd erwiesen.

Der große Schwarzpapagei ist am ganzen Oberkörper tief und matt schwarz, zuweilen bräunlich oder gräulich; Schwingen, Flügeldecken und Schwanzfedern bräunlich- bis rußschwarz (schiefergrau) mit schwachem violettgrünem Metallglanz; Schnabel zur Paarungszeit rein- bis röthlichweiß, nach derselben dunkel- bis schwarzbraun; Wachshaut fleischfarbenweiß, zeitweise schwärzlich; Auge dunkelbraun; Augenkreis fleischfarbenweiß; Füße graubraun mit schwarzen Krallen; Krähengröße (Länge 52—54,5 cm; Flügel 26,6 bis 31,9 cm; Schwanz 16,8—22,2 cm). Gegen die Mauserzeit hin nimmt nach Audebert das Gefieder eine verschoßne, röthliche Färbung an, auch wird der Schnabel dann dunkel. — Heimat: Die Insel Madagaskar.

Herr J. Audebert, welcher lange Zeit auf Madagaskar geweilt, gibt eine überaus interessante Schilderung, von der ich im Nachstehenden wenigstens einen Auszug hier anfügen will, da über das Freileben dieser Art bisher fast noch garnichts und über das Gefangenleben wenig bekannt ist: „Der Mohrenpapagei lebt eigentlich nur im Hochwald, wo er überall häufig ist und in kleinen Flügen von vier bis sechs Köpfen, doch stets gesondert von denen der kleinern Art, die Reis- und Maisfelder heimsucht, in denen er großen Schaden anrichtet und zehnmal mehr verwüstet als er verzehrt, beim Fressen sich lautlos verhaltend. Seine Nahrung bilden außerdem vornehmlich Baumfrüchte und Beren; gegen Abend besucht er die am Waldrande wachsenden wilden Himbersträucher. Da er auch gern und massenhaft Baumknospen frißt, so wird er in Obstanlagen ebenfalls besonders schädlich. Von Natur scheu oder wol mehr durch Verfolgungen mißtrauisch und

Digitized by Google

vorsichtig geworden, fliegt er stets sehr hoch und gut, ist daher schwierig und nur zufällig zu erlegen. Wenn man aber eine Schar überrascht und einen davon krank geschossen hat, so lockt dessen klägliches Geschrei die übrigen herbei und sie umflattern ihn klagend lange — wie dies ja auch bei manchen anderen Papageien und Krähenvögeln der Fall ist — sodaß man noch einen oder einige herabschmettern kann, bevor sie endlich davoneilen. Im Fluge läßt er zeitweise den flötenden Ruf ‚tui, üi, üi' erschallen. Gegen den Oktober hin hört man im Walde oft sein scharfes widerwärtiges Geschrei ‚gäk, gäk, gäk!' welches die um die Weibchen heftig mit einander kämpfenden Männchen ausstoßen; zu Ende dieses Monats sieht man die Pärchen, welche beständig kosen, dabei das Gefieder aufblähen, die Augen verdrehen und ein aus klirrenden, knarrenden, brummenden Tönen bestehendes Gemurmel oder Geplauder hören lassen. Das Nest befindet sich in der Höhlung eines hohen und starken Baums inmitten des Urwalds oder auf schwer zugänglichen Felsen. Wahrscheinlich werden zwei Bruten in jedem Jahre gemacht und jede dürfte zwei Junge ergeben. Während das Weibchen brütet, läßt das Männchen unermüdlich von morgens 4 Uhr bis abends, beim Mondschein sogar bis 9 Uhr, seine langgezogenen Flötentöne, wechselnd mit leiseren Kehllauten, erschallen. Das Jugendkleid gleicht dem der Alten, doch haben die Federn noch keinen Metallschimmer; Schnabel und Augenring sind gelb. Auch das alte Weibchen zeigt während des Nistens den Schnabel und dessen Umgebung gelb, welche Färbung, wie es scheint, durch irgend einen Nahrungsstoff hervorgebracht wird; außerdem habe ich keine Geschlechtsunterschiede auffinden können. Sein Fleisch ist sehr sehnig und zähe, daher kaum genießbar, liefert aber eine kräftige Brühe. Bei den Malgaschen findet man ihn selten in der Gefangenschaft, dann jedoch sperren sie solche Papageien nicht ein, sondern ver-

Digitized by Google

stutzen ihnen einige Schwingen, und man sieht dieselben dann gewöhnlich auf dem Dach der Hütte sitzen. Sie werden mit rohem oder gekochtem Reis und Bananen gefüttert. Auf der Erde watscheln sie zwischen den Hühnern u. a. unbeholfen umher oder hüpfen auf beiden Füßen zugleich rasch vorwärts. Ich kenne wenige Papageien, die ihrem Pfleger so viel Freude machen und solche Anhänglichkeit zeigen, wie dieser: er schreit und nagt nicht, ist gutmüthig, läßt sich ohne Furcht mit den Händen anfassen, herumtragen und beißt niemals. Jung aufgezogen pfeift er ausgezeichnet und lernt ziemlich gut sprechen; außerdem ahmt er alle Thierstimmen nach und verwebt damit seine natürlichen Töne. Am besten hält man ihn auf einem Ständer. Eingesperrt vertragen sie sich schlecht, freigelassen aber bekümmern sie sich nicht um einander. Als Allesfresser darf der schwarze Papagei ohne Bedenken mit menschlichen Nahrungsmitteln gefüttert werden; die meinigen bekamen gekochtes oder gebratnes Fleisch, Fleischbrühe, Fisch, Gemüse, rohen und gekochten Reis, Bananen, Zuckerrohr u. a.; rohes Fleisch berührten sie nie. Von allen Dingen, die sie nicht kennen, wie Gläsern, Flaschen u. drgl., halten sie sich ängstlich fern; niemals benagte einer Tische oder Stühle. Ein sehr begabter Mohrenpapagei wußte jeden Ton der menschlichen Stimme zu deuten und folgte sofort jedem Befehl; ich kann diese Art also als gelehrigen und treuen Vogel empfehlen, doch setze ich voraus, daß man einen jungen, noch unverdorbnen Schwarzpapagei erhalte. Auf Madagaskar sind sie leicht in größrer Anzahl zu erlangen. Der Preis beträgt dort nur 40 bis 100 Pfennige für den Kopf."

Bei uns im Handel kommen sie, wenn auch nicht gerade selten, so doch nur vereinzelt vor und werden eigentlich nur von besonderen Liebhabern gehalten. Preis nach der Einführung 40 bis 45 M., zahm und sprechend 60 Mk.

Digitized by Google

Der kleine schwarze Papagei

[Psittacus niger, *L.*].

Kleiner Schwarzpapagei, kleiner Vaza-Papagei, blos Schwarzpapagei. — Lesser or Smaller Vaza Parrot. — Petit Vaza. — Kleene Vaza Papegaai.

Außer der unbedeutenden Verschiedenheit, daß das Gefieder in der Regel nicht so tief schwarz, sondern stärker bräunlich oder gräulich erscheint und die Größe etwa um ein Drittel geringer ist (Länge 34—36 cm; Flügel 22—25 cm; Schwanz 12—14 cm), stimmt diese Art mit der vorigen völlig überein; Schnabel fleischfarbenweiß bis schwärzlichbraun; Wachshaut weißgrau bis bräunlichfleischfarben; Auge dunkelbraun, Augenkreis mehr oder minder reinweiß; Füße dunkelhorngrau, Krallen schwarz. — Heimat: gleichfalls Madagaskar. Freileben ganz unbekannt. Er erscheint, wenigstens nach meinen persönlichen Erfahrungen, noch stiller als der vorige und auch störrisch und ungelehrig. Sein Kreischen ist anhaltend und nicht angenehm, wechselt jedoch mit melodischem Flöten. Ich konnte keine Sprachbegabung bei ihm entdecken. Im übrigen gilt alles über die schwarzen Arten im allgemeinen Gesagte von ihm ebenfalls. In den Handel kommt er wie der vorige vereinzelt. Preis 30—45 M.

Der rußbraune Papagei [Psittacus Barklyi, *Newt.*] und **der schwarze Papagei von den Komoren** [Psittacus comorensis, *Ptrs.*]. Die beiden letzten Schwarzpapageien haben für uns hier bis jetzt fast garkeine Bedeutung; ich zähle sie daher nur der Vollständigkeit halber mit. Der rußbraune Papagei (Dohlenpapagei — Praslin Parrot, Barkly's Vaza Parrot — Perroquet de Barkly — Barkly's Papegaai) ist am ganzen Körper rauchbraun, unterseits kaum etwas, nur die unteren Schwanzdecken deutlich heller; Schwingen und Schwanzfedern an der Außenfahne düster braungrau, olivengrünlich scheinend, an der Innenfahne dunkel rauchbraun; Schwanzfedern dunkelrauchbraun mit braunen Schäften, unterseits die Schäfte weißlichhorngrau; Schnabel dunkelhornbraun mit hellerer Spitze, Wachshaut braun; Auge dunkelbraun; Zügel

Digitized by Google

und Augenkreis braun; Füße und Nägel braunschwarz; Größe noch fast um ein Drittel geringer als die des kleinen schwarzen Papagei (Länge 28 cm; Flügel 15—17 cm; Schwanz 10—13 cm). Seine Heimat sind die Seyschellen, doch soll er nur noch auf der Insel Praslin vorkommen. Er wird des Schadens wegen, welchen er an Mais u. a. Feldfrüchten verursacht, so arg verfolgt, daß sein Aussterben wol bevorsteht. Ueber seine Lebensweise ist nichts bekannt. Seit d. J. 1867 ist er zweimal in den zoologischen Garten von London, im ganzen in 5 Köpfen, gelangt, und i. J. 1881 hat ihn A. H. Jamrach in London in einigen Exemplaren ausgeboten.—Der schwarze Papagei von den Komoren (Komoren-Vazapapagei, -Vaza und -Schwarzpapagei; Perroquet des Comores; Comoren Parrot; Comoren Papegaai) ist mit dem vorigen fast übereinstimmend, rauchbraun, an Schwingen, Deck- und Schwanzfedern dunkler schwarzbraun mit eigenthümlichem mattgraugrünem Schimmer; Schnabel und Wachshaut schwarzbraun; Auge fast schwarz, nur ein kleiner nackter Kreis unter dem Auge; Füße schwarzbraun mit schwarzen Krallen. Viel größer als der vorige (Länge 47—48 cm; Flügel 28—29 cm; Schwanz 18—19 cm). Heimat also die Komoren, wo ihn Professor Dr. Peters entdeckt und beschrieben hat. Er ist sogar als Balg in den Sammlungen selten, trotzdem jedoch schon lebend eingeführt und zwar in 3 Köpfen nach dem zoologischen Garten von Hamburg.

* * *

Wie unter den Papageien der alten Welt die Arten des soeben behandelten Geschlechts eigentlicher Papagei oder vielmehr nur eine derselben, der rothschwänzige Graupapagei, so stehen unter denen der neuen Welt die Amazonen in Sprach- und geistiger Begabung überhaupt am höchsten; ja, es herrscht vielfach die Streitfrage, ob jene erstre von manchen der letzteren nicht mindestens erreicht oder gar übertroffen werde. Ich will mich bemühen, diese in gleicher Weise wie jenen Sprecher zu schildern, um dann das Urtheil dem Ermessen und der besondern Neigung der Liebhaber selbst zu überlassen.

Digitized by Google

Die **Amazonenpapageien** (Chrysótis, *Swns.*) unterscheiden sich von den erwähnten Verwandten zunächst durch die Färbung, denn sie sind sämmtlich — wie freilich beiweitem die meisten Papageien — grün, mit gelben, rothen und blauen Abzeichen, entweder in allen drei Farben zugleich oder nur in einer oder zweien. Im übrigen gleichen sie dem Graupapagei in der kräftigen gedrungnen Gestalt. Als ihre besonderen Kennzeichen sind hervorzuheben: Schnabel groß, kräftig, mäßig gewölbt, stark nach unten gebogen, First nach hinten scharfkantig abgesetzt, leicht gefurcht, Oberschnabel mit ansehnlich überhängender Spitze und gerundeter oder winkliger Ausbuchtung, Unterschnabel so hoch wie der obre, mit breit abgerundeter Dillenkante und gerundet ausgebuchteten Schneiden; Nasenlöcher groß, frei; Wachshaut kurz, bogig, mit Borstenfederchen besetzt; Zunge breit, gewölbt, fleischig, glatt, mit abgestumpfter Spitze; Auge groß, rund, ausdrucksvoll; Flügel breit und stark, länger als der Schwanz; letztrer kurz, breit, abgerundet; Füße stark mit kräftigen Tarsen und stark gekrümmten, kräftigen Krallen; Gefieder knapp anliegend, Federn klein, breit, abgestutzt, einander schuppenförmig deckend, bei einigen Arten mit Puderdaunen; Dohlen- bis nahezu Rabengröße. Fast alle Amazonen, vornehmlich aber die Guatemala-Amazone, zeigen die Eigenthümlichkeit, daß sie bei Beängstigung, z. B. beim Nahen eines Hundes, mehr oder minder die Nackenfedern sträuben und dann dem späterhin zu beschreibenden Kragenpapagei ähnlich erscheinen.

In ihrer Heimat, Südamerika, sind sie von den Laplatastaten bis Südmexiko, vornehmlich aber im Norden und Osten Brasiliens, in den Urwäldern längs des Amazonenstroms und anderer Flüsse, sowie der Küste zu finden; nur wenige leben auch in den Steppenwaldungen oder im Gebirge; manche sind auf den westindischen Inseln heimisch. Die meisten Arten haben nur ein beschränktes Verbreitungsgebiet. Alle sind eigentliche Baumvögel; klettern geschickt, gehen auf dem Erdboden dagegen watschelnd; ihr Flug ist schwerfällig und mäßig langsam, mit raschen Flügelschlägen, doch manchmal sehr hoch. Nächst den Mittheilungen, welche die reisenden Naturforscher, Prinz von Wied, Burmeister, v. Tschudi, Schomburgk u. A. über ihr Treiben gemacht, liegt eine hübsche Schilderung von Karl Petermann vor, und nach allen diesen Berichten will ich im Folgenden eine kurze Uebersicht der Lebensweise geben. Als das eigentliche Sinnbild des Urwalds erscheint die Papageienschar und dem aufmerksamen Beob-

Digitized by Google

achter fällt zunächst die Regelmäßigkeit in allen ihren Verrichtungen auf. Sobald das Frühroth den anbrechenden Tag kündet, beginnt das Geschwätz und der Lärm auf den Schlafplätzen der Schwärme; sie putzen das Gefieder und beginnen unter lautem Geschrei nach und nach in kleinen Trupps, immer pärchenweise zusammenhaltend, davonzuziehen; bald stehen die bis vor kurzem so belebten Baumgruppen wieder in der Stille des Urwalds da. In weiter Entfernung fallen die Flüge an bestimmten Ruhepunkten ein, laut rufend und lockend, mit antwortendem Geschrei folgen die übrigen und unter betäubendem Lärm erhebt sich dann der ganze Schwarm, um nach den wol noch meilenweit entfernten Futterplätzen abzustreichen. Hier stürzen sie nun mit Heißhunger über die Fruchtbäume her, doch die argen Schreier sind jetzt still geworden und man hört nur das Geräusch, welches die herabfallenden Reste verursachen. Ein Flug nach dem andern kommt lautlos herbei, nur das Zirpen Futter empfangender Jungen, das Rascheln einer abgerißnen herabfallenden Frucht verräth die Fresser in den dichten Kronen der Bäume. Nachdem sie sich gesättigt und aus den mit Regenwasser gefüllten Kelchen der auf den Bäumen wachsenden Orchideen getrunken haben, halten sie Ruhe, während welcher sie leise, gleichsam murmelnde Töne von sich geben; bei sehr heißer Witterung, wenn das Wasser in den Blüten verdunstet ist, müssen sie manchmal weit zur Tränke fliegen und dies geschieht ebenfalls stets zur bestimmten Zeit. Gegen Abend beginnen einzelne lärmend kurze Flüge zu machen, immer mehrere werden lebendig und mit der sinkenden Sonne tritt ein Trupp nach dem andern die Rückkehr an. Auf die Sammelplätze kommen sie mit durchdringendem Geschrei, gleicherweise mit schrillen Rufen begrüßt von denen, die bereits angelangt waren, und jeder stimmt aus Leibeskräften in das wirre Gekreisch ein; erst in voller Dunkelheit erstirbt die Geschwätzigkeit und der Zank um die besten Ruheplätze. Solch' Treiben setzen sie während der ganzen Herbst- und Winterszeit fort, indem sie von einem Bezirk, in welchem infolge ihrer Plünderungen oder durch Ueberreife eine Frucht auf die Neige geht, nach einem andern, der neue lockende Früchte bietet, übersiedeln. Bei Mißwachs oder auch aus anderen Ursachen verlassen sie wol eine Gegend für längre Zeit. In der Nistzeit, vom September oder Oktober bis zum März, sondern die Pärchen sich ab. Als Nisthöhle wird ein meistens sehr tiefes Astloch hoch oben im gewaltigen Ur-

Digitized by Google

waldsbaum, welches daher schwer zugänglich ist, alljährlich von einunddemselben Pärchen bezogen und das Gelege besteht in zwei bis vier sehr runden und wie bei allen Papageien reinweißen Eiern. In jedem Jahr soll nur eine Brut stattfinden. Aus Vorsicht verhalten sich die Amazonen, wie ja übrigens die meisten Vögel überhaupt, in der Nähe des Nests lautlos, sodaß die Reisenden sagen, man könnte meinen, sie haben zur Nistzeit ihre Stimme verloren. Ihre Nahrung besteht in fleischigen und saftigen Beren und Früchten, besonders auch Schotenfrüchten, ferner in Nüssen, Fruchtkernen und dann vornehmlich in allerlei Sämereien, Mais und anderm Getreide. Wenn sie in das letzte einfallen, verhalten sich die Schreier gleichfalls ruhig. Des von ihnen verursachten Schadens, aber auch ihres wohlschmeckenden Fleisches und selbst der Federn wegen, werden sie viel verfolgt; auf den Märkten der Hafenstädte soll man sie zur Zeit der Wanderungen massenhaft als Wildbret finden.

Auch sie sind seit altersher bekannt, jedenfalls ebenso lange wie der Jako, doch erst in der neuesten Zeit sind die einzelnen Arten sicher unterschieden und genau beschrieben. Das größte Verdienst in dieser Hinsicht — wie um die Darstellung aller Papageien überhaupt — hat Dr. Otto Finsch sich durch seine hier schon S. 6 erwähnte Monographie erworben. Herr Karl Hagenbeck, Besitzer der großartigen Handelsmenagerie in Hamburg, hat sodann dadurch, daß er in den Jahren 1878/79 eine Sammlung aller bisher lebend eingeführten Amazonen zusammenbrachte und dieselbe mir zum Studium zur Verfügung stellte, die Gelegenheit dazu gegeben, daß ich in der Klarstellung mancher Arten sichere Ergebnisse erreichen und nach den lebenden Vögeln vor mir die Beschreibungen von Dr. Finsch ergänzen konnte. So habe ich in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. die beiden Arten gemeine und Venezuela-Amazone (Psittacus aestivus, *Lth.*; P. amazonicus, *L.*), welche in sämmtlichen Händler-Preislisten, in allen volksthümlich geschriebenen und selbst in manchen wissenschaftlichen Büchern bis dahin verwechselt worden, zuerst mit Entschiedenheit aus einander gehalten, ferner die rothschwänzige Amazone (P. erythrurus, *Khl.*), welche Dr. Finsch noch für ein Kunsterzeugniß ansah, nach dem lebenden Vogel als sichre Art festgestellt und eine bis dahin noch unbekannte Art, Hagenbeck's Amazone (P. Hagenbecki, *Rss.*) als neu beschrieben.

Die Amazonen werden von den Eingeborenen Südamerikas

Digitized by Google

größtentheils in früher Jugend aus den Nestern geraubt und aufgefüttert und von ihnen gilt hauptsächlich das S. 14 Gesagte. Deshalb sind sie fast sämmtlich oder doch wenigstens in der größten Mehrzahl bei der Einführung schon mehr oder minder gezähmt und viele sprechen einige spanische und von der Ueberfahrt her englische oder holländische Worte. Von den bisher bekannten 37 Arten sind bis jetzt 33 Arten lebend eingeführt. Manche kommen alljährlich regelmäßig und in sehr großer Kopfzahl, andere seltner und in wenigen Köpfen und die meisten nur einzeln und zufällig in den Handel.

Ueber ihre Sprachbegabung lauten die Urtheile recht verschiedenartig und zwar nicht allein inbetreff der einzelnen Arten, sondern auch über das Verhältniß, in welchem sie dem Graupapagei gegenüberstehen. Dr. Lazarus meint, sie seien ihm wol in vieler Hinsicht gleich, aber sie bleiben hinter ihm darin zurück, daß sie nicht, wie er, die menschliche Sprache täuschend nachahmen können, sondern daß ihr Sprechen doch immer eigenthümlich, wenn man so sagen dürfe, papageienartig, ertöne. Eine Amazone, behauptet er, werde stets in demselben Tone sprechen, gleichviel ob sie von einem bejahrten Mann, einem Jüngling oder einer Frau abgerichtet sei; sie habe nicht die Schmiegsamkeit der Sprache, daß sie so wie der Jako mit bittender, schmeichelnder oder zürnender Stimme zu sprechen vermöge; ihre Worte bleiben immer in gleicher Tonlage und Tonart. Bei sehr großer Zahmheit vermöge sie doch niemals die kluge Anhänglichkeit des Grauen zu äußern; es mache nie den Eindruck, als ob ihre Leistungen, die Aeußerung ihrer Wünsche u. a. m. gleicherweise selbstbewußt wären. Während der Graupapagei mit der Zeit in eigner Selbständigkeit immer neue überraschende Seiten seiner Begabung, ja gewissermaßen ein vermenschlichtes Wesen, entwickle und man darüber vergesse, daß er ursprünglich scheu und wild gewesen und erst durch die Erziehung herangebildet worden, erinnere die Amazone stets daran, daß sie doch nur ein abgerichtetes Thier sei. Der gezähmte und abgerichtete Jako lege seine kreischenden Naturlaute mit der Zeit völlig ab, dies sei bei der Amazone niemals der Fall, denn auch der hervorragendste Sprecher aus ihren Reihen überlasse sich zeitweise mit wahrem Wohlbehagen seinem Geschrei. Im allgemeinen mag dieses Urtheil wol zutreffend sein; nur sollte man nicht vergessen, daß unter den verschiedenen Arten der Amazonenpapageien doch eine sehr bedeutsame Mannigfaltigkeit in der Begabung sich

Digitized by Google

ergibt; außerdem behaupte ich mit Entschiedenheit, daß unter den großen gelbköpfigen, gemeinen oder Rothbug-, Surinam-, gelbnackigen Amazonen u. a. einzelne Sprecher vorkommen, welche hinter dem gelehrigsten Graupapagei in keiner Hinsicht zurückbleiben. Die letztgenannten Arten gelten als die begabtesten, doch zählt man mehr oder minder mit Vorliebe auch noch die Müller-, rothrückige und Venezuela-Amazone hinzu, während die beiden weißköpfigen mit und ohne rothen Bauchfleck, namentlich aber die Taubenhals-, Dufresne's u. a. bereits beiweitem weniger gelehrig sein sollen, die kleineren, wie der kleine Gelbkopf, Sallé's, die weißstirnige, rothstirnige u. a. offenbar weit weniger hochbegabt, als vielmehr nur ihres niedlichen und komischen Wesens halber beliebt sind.

In der Regel werden die Amazonen bei den Händlern mit Hanf, Mais und eingeweichtem Weißbrot gefüttert; ich bitte das über die Fütterung der großen Papageien Gesagte zu beachten. Da aber aus den bisherigen Nachrichten über ihre Lebensweise hervorgeht, daß sie Fruchtfresser sind, so wolle man es nicht versäumen, ihnen zeitweise gute süße Früchte und vornehmlich auch Wall-, Hasel- u. a. Nüsse zu reichen. Bei keinen anderen Papageien kommen sodann die schlimmen Folgen naturwidriger Ernährung so übel zur Geltung wie gerade bei diesen. Nach sachgemäßer Eingewöhnung und bei guter Verpflegung zeigen sie sich dagegen als sehr kräftig und ausdauernd und erreichen dann gleich dem Graupapagei ein hohes Alter. Sie gehören entschieden und mit Recht zu den beliebtesten aller Papageien. Alles Nähere werde ich bei den einzelnen Arten mittheilen; über Einkauf, Verpflegung, Zähmung und Abrichtung bitte ich in den btrf. Abschnitten nachzulesen.

Eine absonderliche Beobachtung, welche Herr Alex. Bau gemacht, sei hier noch erwähnt. Seine junge, vollständig gesunde und kräftige Amazone wurde im Sommer eines Sonntags nachmittags plötzlich von Krämpfen befallen; sie sträubte die Federn, zitterte und wurde eiskalt; dabei sah sie fortwährend nach dem Himmel empor. Gegen Abend legte sich die Krankheit und die ganze folgende Woche blieb der Vogel gesund. Am nächsten Sonntag Nachmittag aber traten genau dieselben Erscheinungen mit dem gleichen Verlauf ein. Da der Papagei keinen Blick vom Himmel wegwandte, so wurde er in ein andres Zimmer gebracht, wo er überraschend schnell sich wieder erholte. An seinen gewöhnlichen Platz zurückversetzt, kam der Krampf-

Digitized by Google

anfall sogleich wieder. Jetzt folgte man seinen angsterfüllten Blicken — und da ergab sich als Ursache ein großer, sehr hoch stehender Papierdrachen. „Das sonderbare Benehmen des Vogels hielt während der ganzen Drachenzeit an; erst mit dem Aufhören derselben im Spätherbst blieben die Anfälle fort und bis zum Verkauf der Amazone im folgenden Frühjahr sind sie auch nicht wiedergekehrt." Diese Wahrnehmung ergibt, daß auch die Amazonen, gleich anderen Papageien, vor Beängstigungen und Erregungen möglichst zu bewahren sind.

In der Benennung habe ich mich an die in der Liebhaberei und zum Theil auch in der Wissenschaft gebräuchliche Bezeichnung Amazonen gehalten, während Dr. Finsch sie Kurzflügelpapageien und A. E. Brehm Grünpapageien heißt.

Der Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug

[Psittacus aestivus *Lth.*].

Gemeine Amazone, blos Amazone oder Amazonenpapagei, blaustirnige, gewöhnliche, blau- und gelbköpfige Amazone, Rothbugamazone, Rothbug-Amazonenpapagei und Kurzflügelpapagei mit rothem Flügelbug. — Blue-fronted Amazon or Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à front bleu, Perroquet Amazone à calotte bleu, Perroquet Lord du Brésil. — Gewone Amazone Papegaai.

Die allbekannte gemeine Amazone, mit rothem Flügelbug, wurde, wie schon S. 127 gesagt, bis zur neuesten Zeit mit der nächstfolgenden Venezuela-Amazone, mit grünem Flügelbug, vielfach verwechselt, weil der letztern von Linné der lateinische Name Amazonenpapagei beigelegt war. Erstre ist in folgender Weise gefärbt: Stirnrand blau; Oberkopf, Wangen und Kehle gelb; Flügelbug, Spiegelfleck im Flügel und Grund der Schwanzfedern roth; ganzes übriges Gefieder grün, an der Oberseite jede Feder mit deutlichem dunkeln Endsaum; die kleinen und großen Flügeldecken gelbgrün gesäumt; ganze Unterseite hellgrün; an Brust und Bauch jede Feder mit schmalem grünlichen Endsaum; Schenkelgegend gelblich; Schnabel einfarbig schwärzlichbraun bis schwarz; Wachshaut schwarz; Auge gelb bis orangeroth, nackte Haut ums Auge bläulich; Füße blaugrau, Krallen schwarz. Die Geschlechter

Digitized by Google

sind bis jetzt noch nicht mit Sicherheit unterschieden. Jugendkleid matter in den Farben; Auge schwarz bis graubraun. Etwa Krähengröße (Länge 36,5 — 41,5 cm; Flügel 20,5 — 22,4 cm; Schwanz 10,5 — 13 cm). Es kommen zahlreiche Farbenspielarten vor, bei denen sich die blaue und gelbe Färbung am Kopf mehr oder minder ausdehnt, die eine oder andre zuweilen ganz fehlt, das Roth am Flügelbug kleiner oder größer, zuweilen gelbroth bis gelb ist u. a. m.; ja es gibt ganz gelbe Amazonen, die allerdings sehr selten sind. Heimisch ist diese Amazone im Süden von Südamerika, Brasilien, Paraguay bis zum Amazonenstrom. Obwol sie die gemeinste und häufigste Art ist, hat man ihr Freileben bis jetzt doch noch keineswegs völlig erforscht; im allgemeinen gilt für sie die Schilderung in der einleitenden Uebersicht der Amazonen-Papageien S. 127. Sie soll vornehmlich in Orangegärten überaus großen Schaden verursachen.

Von den Eingeborenen wird sie am höchsten geschätzt, weil sie für die Abrichtung am zugänglichsten von allen sich zeigen soll. Man trifft sie daher überall bei den Indianern und sie wird auch unter allen Arten am zahlreichsten in den Handel gebracht. Bei uns halten die Liebhaber sie ebenfalls für sehr werthvoll. Man hat Beispiele von erstaunlich reich begabten Amazonen und diese ergeben sich nicht allein im Sprechenlernen, sondern ebenso im Nachsingen von mehreren Liedern oder im Nachflöten von drei bis vier Weisen als bewundernswerth gelehrig. Wie bei allen großen Sprechern kommen aber auch unter diesen Vögel vor, welche weniger oder wol garnichts lernen wollen — die man aber trotzdem niemals als untauglich bezeichnen sollte; Seite 52 habe ich in dieser Beziehung näheres mitgetheilt. Der Einkauf ist im übrigen bei der Amazone fast noch mehr, als bei jedem andren sprechenden Papagei Glückssache und ich bitte die in dieser Hinsicht die Seite 16 ff. gegebenen Rathschläge niemals außer Acht zu lassen. Die meisten Amazonen gelangen mit den großen Dampfschiffen, welche zwischen

Digitized by Google

Brasilien, bzl. Südamerika und Europa regelmäßig fahren, in den Handel und man findet sie bei allen Groß- und Kleinhändlern. Der Preis beträgt im Großhandel für die frisch eingeführte, noch rohe Amazone selten unter 20 M., meistens aber 24 bis 30 oder wol 40 M.; der sprechende Vogel wird je nach der Leistung mit 45 bis 60 M, 75 bis 90 M., 150 bis 500 M. und darüber bezahlt.

Der Amazonenpapagei mit grünem Flügelbug

[Psittacus amazonicus, *L.*].

Venezuela-Amazone; Kurzflügelpapagei mit grünem Flügelbug; fälschlich blos Amazonenpapagei, gemeine Amazone oder gar Neuholländer-Papagei. — Orange-winged Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à ailes oranges. — Groenboeg Amazone Papegaai.

Im Handel viel seltner als die vorige, ist sie auch beiweitem nicht so beliebt. Sie erscheint in folgender Weise gefärbt: Stirnrand und Zügelstreif blau; Vorderkopf und Wangenfleck unterhalb des Auges bis zum Schnabel brandgelb; Flügelbug grün, nur an der Handwurzel gelb; Flügelspiegel gelblichroth; Schwanzfedern am Grunde orangeroth; das ganze übrige Gefieder grün, die Federn am Hinterhals dunkler gesäumt; ganze Unterseite heller grün, an der Brust mit schwachem Anflug von Puder; Schnabel weißlichgraugelb (horngraugelb) mit dunkelbrauner Spitze und am Grunde des Oberschnabels ein gelber Fleck; Auge hellgelb bis zinnoberroth; Füße bräunlichhorngrau. Das Weibchen soll die Kopffärbung matter zeigen. Größe etwas geringer als die des vorigen (Länge 34 — 36 cm; Flügel 18 — 20 cm; Schwanz 8,7 — 9 cm). Alle eingeführten Vögel dieser Art erscheinen in fast genau übereinstimmender Färbung. Als ihre Heimat ist der Osten Brasiliens bekannt, wo sie sich in den Küstenwäldern manchmal in Schwärmen von unzähligen Köpfen aufhält. Ihre Nahrung soll in allerlei Baumfrüchten bestehen, vornehmlich denen der Mangrove- oder Manglebäume. Sie wird von den Ansiedlern als der eigentliche Schreier unter allen Verwandten bezeichnet. Um sie jung

Digitized by Google

zu erlangen, werden manchmal hohe unersteigliche Nistbäume gefällt. In der Heimat heißt sie Kurika und gilt dort als sehr gelehrig; auch Dr. Lazarus bestätigt dies, und wenn diese Amazone trotzdem bei uns nicht so beliebt wie die vorige ist, so liegt dies wol darin, daß sie auch als sprechender Vogel ihr arges Geschrei nicht unterläßt. Von Venezuela aus wird sie meistens durch die Matrosen der großen Dampfschiffe mitgebracht. Der Preis beträgt gewöhnlich nur 30 M.; beim abgerichteten Vogel steigt er natürlich im entsprechenden Verhältniß.

Der große gelbköpfige Amazonenpapagei

[Psittacus Levaillanti, *Gr.*].

Großer oder doppelter Gelbkopf, große gelbköpfige Amazone, Levaillant's Amazonenpapagei, Levaillant's Kurzflügelpapagei. — Levaillant's Amazon Parrot, Double-fronted Amazon. — Perroquet Amazone de Levaillant, Perroquet à tête jaune. — Dubbele Geelkop Papegaai.

Viele Liebhaber sprechender Papageien schätzen den großen Gelbkopf höher als alle anderen, ja meinen sogar, daß er an Begabung in jeder Hinsicht selbst den Graupapagei übertreffe. Solche Behauptung kann jedoch von vornherein nicht als zutreffend gelten, denn man darf weder von der einen, noch von der andern Art mit Entschiedenheit sagen, daß sie am hervorragendsten begabt sei. Ueberblickt man die außerordentliche Stufenreihe und Mannigfaltigkeit in der Befähigung der einzelnen Individuen innerhalb einunddersel ben Art, so staunt man über die Verschiedenheit ihrer Begabung und gelangt zu der Einsicht, daß sich solche bei allen hierher gehörenden Arten überhaupt wiederholen und sichere Vergleiche unter einander nur zu sehr erschweren, wenn nicht geradezu unmöglich machen. Die Berechtigung, hier eine bestimmte, auch nur einigermaßen feststehende Reihenfolge aufzustellen, spreche ich daher Jeder-

Digitized by Google

mann entschieden ab. Allenfalls möge man sagen, diese Art gehöre zu den mehr, jene zu den minder begabten; das ist aber auch alles und darüber hinaus sollte man keinenfalls gehen. Ohne Frage steht der große Gelbkopf als sprechender Papagei hoch da, ihn jedoch für den allerbedeutendsten auszugeben, ist durchaus nicht berechtigt.

Er ist an Stirn und Gegend um den Schnabel weißgelb, am übrigen Kopf, Nacken und Hals schwefelgelb; Flügelbug, Spiegelfleck im Flügel und Grundhälfte der Innenfahne an den vier äußersten Schwanzfedern lebhaft scharlachroth; ganze Oberseite dunkel-, Unterseite heller grün, überall ohne dunkle Federnsäume; Schenkelgegend gelb; Schnabel gelblichweiß; Wachshaut fast reinweiß; Auge gelbbraun bis braunroth, um die Pupille ein gelber oder grauer Ring; nackter Augenkreis bläulichweiß, manchmal gelbgrau; Füße weißblau, Krallen grau. Geschlechtsunterschiede sind nicht bekannt. Das Jugendkleid ist nur an Stirn, Oberkopf und Kopfseiten gelb; die rothen Abzeichen sind hell und matt. Nahezu Rabengröße (Länge 38—44 cm; Flügel 21—23,5 cm; Schwanz 11—14 cm).

In seiner Heimat Mexiko soll er nur im Süden und Westen, sowie auf der Dreimarieeninsel vorkommen; er wird unter allen Amazonenpapageien am weitesten nach dem Norden hinauf gefunden. Sein Freileben ist fast garnicht bekannt. Gleicherweise wie bei uns wird er auch in seiner Heimat als Stubenvogel sehr geschätzt und darum steht er höher im Preise als alle Verwandten. Die Indianer rauben die Jungen aus den Nestern und so gelangen alle Vögel dieser Art stets schon mindestens halbzahm und einige Worte sprechend, doch immer nur einzeln oder in wenigen Köpfen, in den Handel. Unmittelbar nach der Ankunft sind sie weichlich und bedürfen großer Fürsorge (siehe die Abschnitte über Eingewöhnung und Verpflegung), eingewöhnt aber gehören auch sie zu den ausdauerndsten aller Papageien.

Ein besondrer Vorzug des großen Gelbkopf ist seine bedeutende Fassungsgabe, welche ihn vorgesagte Worte sogleich

Digitized by Google

und ſtets ſehr deutlich nachſprechen läßt. Im Gegenſatz dazu gibt es auch unter den Angehörigen dieſer Art einzelne, welche durchaus nichts lernen wollen; ſtets ſoll man jedoch den ſchon S. 52 ausgeſprochnen Erfahrungsſatz beachten, einen ſolchen Vogel nicht zu früh als unverbeſſerlich fortzugeben, weil nämlich der mehrfach beobachtete Fall eintreten kann, daß er noch nach vielen Jahren wol gar ein vortrefflicher Sprecher wird. Darauf möchte ich noch hinweiſen, daß auch ſogar der hervorragendſte Vogel dieſer Art zeitweiſe ſein wüſtes Naturgeſchrei erſchallen läßt. Der Preis beträgt bereits für den rohen friſch eingeführten großen Gelbkopf 60, 66, meiſtens aber 75 M. und ſteigt ſehr raſch für den Sprecher von 100 bis 250, 320, 450, ſelbſt 600 M. und noch darüber.

Der gelbſcheitelige Amazonenpapagei

[Psittacus ochrocephalus, *Gml.*].

Surinam-Amazone und Surinam-Papagei, gelbſcheiteliger Kurzflügelpapagei und Gelbſcheitel-Amazone. — Yellow-fronted Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à front jaune, Perroquet de Cayenne. — Geelvoorhoofd Papegaai; Geelvlek Papegaai.

Alle Papageien, welche man in der Geſammtbezeichnung Amazonen zuſammenfaßt, zeigen jeder in ſeiner Färbung und ſeinen beſonderen Abzeichen ſo auffallende Merkmale, daß ſelbſt ein oberflächlicher Kenner bei der Beſtimmung und Unterſcheidung der einzelnen Arten nicht in Zweifel geräth; trotzdem ſehen wir, daß von altersher bis zur neuern Zeit gleicherweiſe bei Wiſſenſchaftern wie bei Liebhabern die hierhergehörenden Arten und vornehmlich der Surinampapagei fortwährend mit anderen verwechſelt worden. Auch jetzt noch werden im Handel die beiden nächſtfolgenden Arten meiſtens ohneweitres mit ihm zuſammengeworfen. Die Leſer wollen daher die in der Beſchreibung angegebenen Merkmale recht aufmerkſam beachten.

Digitized by Google

Der gelbscheitelige Amazonenpapagei ist an der Stirn bis zur Kopfmitte und mehr oder minder zum Hinterkopf hochgelb mit einem breiten grünen Streif über dem Auge; Zügel, Kopfseiten und Kehle sind gelbgrün; Hinterkopf, Wangen und Nacken dunkelgrün, jede Feder fein schwärzlich gesäumt; die ganze übrige Oberseite ist dunkelgrasgrün ohne dunklere Federnränder; Flügelrand roth; Flügelspiegel und Innenfahne der vier äußersten Schwanzfedern rothgelb bis scharlachroth; ganze Unterseite heller grün als die obre; Schenkelgegend röthlichgelb; Schnabel schwarzbraun bis schwarz, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein röthlichweißer Fleck, Unterschnabel schwärzlichhorngrau; Wachshaut schwärzlich, dicht mit schwarzen Härchen besetzt; Auge orangeroth mit feinem gelben und dann breiterm braunen Rande um die Pupille; nackter Augenkreis bläulichweiß; Füße bläulichweiß, Krallen fast reinweiß. Auch diese Art erscheint in Abänderungen: das Gelb am Kopf ist enger oder weiter, zuweilen bis über den ganzen Vorderkopf, auch über die Umgebung der Augen und den Unterschnabel; zuweilen fehlt es oder beschränkt sich auf einzelne Federn an der Kopfmitte und den Zügeln, die gelben Federn sind manchmal stellenweise roth gerandet, der Stirnrand ist grün; die rothe Zeichnung im Flügel ist kleiner oder größer; der Schnabel ist heller oder dunkler schwarzbraun mit fahlrothem Fleck; Iris mit gelbem bis bräunlichem innern und rothem äußern Ring; Augenkreis grau. Weibchen und Jugendkleid nicht sicher bekannt. Die in den Handel gelangenden jungen Vögel haben nur wenig Gelb und die rothen Abzeichen sind matter gefärbt: Etwas unter Rabengröße (Länge 37 — 40,5 cm; Flügel 20,5 — 23 cm; Schwanz 10,9 — 13,5 cm).

Seine Heimat erstreckt sich über den Norden von Südamerika. Die Reisenden berichten, daß er in Surinam, Guiana und Venezuela überaus zahlreich und gemein sei. Die geringen Nachrichten über sein Freileben besagen nichts Absonderliches. Auch er wird des Fleisches und der Federn wegen gejagt, vornehmlich aber aus den Nestern geraubt. Die Indianer, welche ihn für einen der gelehrigsten Papageien halten, sollen ihn mit besondrer Sorgfalt aufziehen und abrichten. Häufig sehe man Surinamamazonen um die Indianerhütten halbwild

Digitized by Google

mit etwas gestutzten Flügeln umherfliegen, doch kehren sie abends immer wieder zurück. Bei uns gehört diese Art zu den gewöhnlichsten im Handel, da sie etwas zahlreicher als die vorige eingeführt wird. Man schätzt sie als tüchtigen Sprecher, indem einzelne sich in hervorragendster Weise entwickeln, nicht blos gut und deutlich sprechen, sondern auch lachen, weinen, singen und hübsch pfeifen lernen, während andere zurückbleiben, doch nicht häufig; als gute Mittelvögel ergeben sich die meisten. Der Preis beträgt für den rohen Vogel zwischen 24, 30 bis 36 M.; für die erstre Summe ist er jedoch nur selten zu haben. Der sprechende kostet 45, 50, 100, 150 bis 300 M.

Der Panama-Amazonenpapagei [Psittacus panamensis, *Cb.*] — Panaman Amazon Parrot — Perroquet Amazone de Panama — Panama Amazone Papegaai — unterscheidet sich von dem vorigen nur durch den vorherrschend gelben Schnabel und das Fehlen des rothen Flecks am Grunde desselben, sowie durch die auffallend geringre Größe; außer dieser von Cabanis gegebnen kurzen Bemerkung war nichts über die Art bekannt, obwol sie schon längst neben der verwandten in den Handel gelangte. Auf der großen „Ornis"-Ausstellung in Berlin i. J. 1880 hatte Herr Hagenbeck, wie schon erwähnt, alle Amazonenpapageien neben einander, und so konnte ich auch diesen nach dem lebenden Vogel genau beschreiben: Stirn blaßgelb, Oberkopf blaugrün; breiter Streif oberhalb des Auges grün; Zügel gelb und grün gemischt; Hinterkopf, Nacken, Kopf- und Halsseiten grasgrün; Gegend um den Schnabel und Kehle blaugrün, ganze Oberseite grasgrün, ohne schwärzliche Federränder; Spiegelfleck im Flügel, Flügelbug und Handrand roth; Schwanzfedern mit Ausnahme der beiden mittelsten an der Innenfahne roth; ganz Unterseite kaum heller grün (Schenkelgegend nicht gelb); am Unterleib ein meerblauer Fleck; Schnabel weißlichhorngrau, Oberschnabel an den Seiten schwärzlich mit weißlichem Fleck am Grunde (zuweilen der ganze

Digitized by Google

Schnabel weiß); Nasenhaut weiß bis schmutzighorngrau, ohne Härchen; Auge roth mit schmalem gelben Streif um die Iris; nackter Augenrand bläulichweiß, Füße bläulichfleischfarben, Krallen weiß (zuweilen die Füße ganz weiß). Ein wenig über Dohlengröße, (Länge 33—35 cm; Flügel 20—22 cm; Schwanz 11,5—12 cm). Heimat: Panama und Veragua. Die Amazone, welche ich einige Wochen beherbergt, war sehr zahm und liebenswürdig, sprach jedoch nur wenig und undeutlich. Daraufhin kann ich selbstverständlich kein entschiednes Urtheil über die Befähigung der Art abgeben, vielmehr muß ich die Vermuthung aussprechen, daß sie ebenso begabt wie die nächstverwandten sein wird. In allem übrigen, auch im Preise, stimmt sie mit der vorhergegangnen überein.

Hagenbeck's Amazonenpapagei [Psittacus Hagenbecki, *Rss.*] — Hagenbeck's Amazon Parrot — Perroquet Amazone de Hagenbeck — Hagenbeck's Amazone Papegaai — ist die dritte Art, welche als Surinampapagei, wenn auch viel weniger als die beiden anderen, in den Handel kommt. Er ist an der Stirn bis zur Kopfmitte und den Zügeln gelb bis röthlichgelb; Binde über den Oberkopf bis zu den Mundwinkeln grünblau; Hinterkopf, Nacken und Hals grün, ohne dunklere Federnränder; vordere Wangen und Oberkehle blaugrün; Flügelrand und -Bug grün, nur zuweilen mit einzelnen rothen Federchen; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth; Schwanzfedern grün, nur mit schwach röthlichem Fleck; übrige Oberseite grasgrün, ohne dunklere Federnränder; Unterseite hellgrün; Schenkelgegend gelb; Schnabel hornweiß mit schwärzlicher Spitze, am Ober- und Unterschnabel ein röthlich-wachsgelber Fleck; Nasenhaut weißgelb, ohne Härchen; Auge roth mit sehr schmalem gelben und breitem braunen Ring um die Pupille; Füße blaugrau, Krallen grau. Etwa Krähengröße (Länge 36,5—42 cm; Flügel 20,3—22,6 cm; Schwanz 11—13,2 cm). Von der Surinam-Amazone unterscheidet er sich durch den weißen Schnabel, von der Panama-Amazone durch das fast völlige Fehlen von Roth am Flügelrand und im Schwanz, sowie die abweichende Zeichnung des letztern, ferner

Digitized by Google

noch durch viel heller gelbgrünen Unterkörper und ansehnlich bedeutendere Größe. Er gelangt höchst selten zu uns und seine Heimat ist noch nicht bekannt.

Der gelbschulterige Amazonenpapagei

[Psittacus ochrópterus, *Gml.*].

Kleiner Gelbkopf oder Sonnenpapagei, gelbflügeliger Kurzflügelpapagei, gelbflügeliger Amazonenpapagei, Gelbflügel-Amazone. — Yellow-shouldered Amazon Parrot, Single Yellow-headed Amazon.—Perroquet Amazone à épaulettes jaunes, Perroquet Amazone ochroptère. — Kleene Geelkop Papegaai.

In den Reihen der gewöhnlichsten Papageien des Handels stehend, ist der kleine Gelbkopf bei manchen Freunden gefiederter Sprecher sehr beliebt, während Andere auf ihn, wie auf alle kleinen Amazonen überhaupt nur mit Verachtung blicken. Dies mag darin begründet sein, daß die einzelnen Vögel von dieser Art eine geradezu erstaunliche Verschiedenheit in der Sprachfähigkeit zeigen. Es liegen Schilderungen von zuverlässigen Kennern (Baronin von Schlechta, Dr. Jung, Lehrer Neu u. A.) vor, nach denen es einzelne außerordentlich reich begabte Sonnenpapageien gibt, die zugleich dadurch werthvoll sind, daß sie ungemein zahm werden, im Benehmen überaus drollig erscheinen und namentlich allerlei Thierstimmen, wie Hahnenkrähen, Hennengackern, Taubengirren, Katzenmiauen, Hundegebell u. drgl. treu nachahmen; im Gegensatz dazu kommen natürlich auch recht viele kleine Gelbköpfe vor, welche wol liebenswürdig sich zeigen, aber durchaus nichts lernen wollen. Einen gewissen Werth hat jeder von ihnen von vornherein dadurch, daß er zu den am leichtesten und vollständigsten zahm werdenden Stubenvögeln gehört.

Der gelbschulterige Amazonenpapagei läßt sich nach den Geschlechtern unterscheiden. Das Männchen ist an Stirn und Zügeln gelblichweiß; Vorder- und Oberkopf, Wangen, Kopfseiten,

Digitized by Google

Ohrgegend und Oberkehle gelb; Flügelbug mit großem gelbem Fleck; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth; die vier äußeren Schwanzfedern am Grunddrittel über beide Fahnen zinnoberroth; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, jede Feder mit schwärzlichem Rand, nur die oberen Schwanzdecken einfarbig gelbgrün; Unterseite kaum bemerkbar hellergrün, jede Feder gleichfalls dunkel gerandet; Schenkelgegend gelb; Schnabel hornweiß, mehr oder weniger bläulichgrau; Wachshaut grauweiß; Auge dunkelbraun, gelblichbraun bis rothgelb mit rothem äußern Kreis der Iris; nackte Haut ums Auge weiß; Füße und Krallen weißlichhorngrau. Das alte, ausgefärbte Weibchen ist in allen Farben matter und um den Unterschnabel mehr oder minder weit über die Wangen an Unterbrust und Bauch meerblau. Das Jugendkleid hat gleichfalls die meerblaue Färbung, und dieselbe erstreckt sich zuweilen auch über Kopfseiten und Kehle. Bei manchen alten Vögeln sind die grünen Federn an Kopf, Wangen, Kehle, Hals und Flügelbug mehr oder minder mit gelben oder orangefarbenen gemischt. Etwa Dohlengröße (Länge 32—34 cm; Flügel 18—20,2 cm; Schwanz 9,6—11,5 cm).

Er ist von den älteren Schriftstellern, so von Brisson (1760) bereits gut beschrieben, und Buffon gibt sogar eine recht hübsche Schilderung seines Lebens im Käfige, allein es herrschten inbetreff seiner bis zur neuesten Zeit wunderliche Irrthümer und ich muß einige derselben, um manche meiner Leser vor Zweifeln zu bewahren, berichtigen. Dahin gehört vor allem, daß der bedeutendste Forscher auf diesem Gebiete, Dr. Finsch, sich nicht allein in der Schnabelfärbung, sondern auch in der Größe irrt, daß A. E. Brehm diese Art gleichfalls zu den größten stellt und daß ein neuerer junger Schriftsteller auch noch Maße angibt, die um ein volles Drittel zu groß sind. Der kleine Gelbkopf ist an der geringern Größe, den dunklen Federrändern an der Ober- und Unterseite und dem breiten gelben Flügelbug sogleich von allen Verwandten zu unterscheiden. Der Preis beträgt für den frisch eingeführten Vogel selten 15 M., gewöhnlich 18 bis 20 M., für den eingewöhnten zahmen und schon sprechenden 24, 30 45 und wol bis 100 M.

Digitized by Google

Der in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. als besondre, von G. Lawrence neu beschriebne Art angeführte Amazonenpapagei mit milchweißer Stirn (Psittacus lactifrons) fällt fort, weil er nach Sclater's Untersuchung mit dem vorhergegangnen als übereinstimmend sich ergeben hat.

Der bepuderte Amazonenpapagei

[Psittacus farinosus, *Bdd.*].

Müller-Papagei, Müller oder Müller amazone, weißbepuderter Amazonenpapagei, bereifter Kurzflügelpapagei. — Mealy Amazon Parrot. — Perroquet Amazone poudrée, Meunier. — Muller Amazon Papegaai.

Wieder ein recht beliebter Sprecher, der entschieden zu den begabtesten gezählt werden darf und zugleich sanft und liebenswürdig sich zeigt, leider aber auch zu den schlimmsten Schreiern gehört und selbst als abgerichteter und völlig zahmer Vogel es nicht lassen kann, zeitweise ohrenzerreißenden Lärm zu machen.

Der bepuderte Amazonenpapagei ist an Stirn und Wangen gelbgrün; Scheitelmitte gelb, zuweilen fein roth gefleckt; am Oberkopf jede Feder violett gerandet; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, an Hinterkopf, Nacken und Hinterhals jede Feder mit schwärzlichem Endsaum; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth; Schwanzfedern grün ohne Roth; ganze Unterseite heller gelblichgrün; untere Schwanzdecken grüngelb; Schnabel weißlichhorngrau, am Grunde des Ober- und Unterschnabels jederseits ein orangegelblicher Fleck; Nasenhaut schwärzlich; Auge dunkelbraun bis rothbraun; Iris mit kirschrothem Ring; nackter Kreis ums Auge weiß; Füße dunkelbraun, Krallen schwarz. Geschlechtsunterschiede und Jugendkleid nicht bekannt. Besondere Kennzeichen: Die Federn erscheinen wie mit Mehl bepudert und daher sieht die Oberseite graugrün aus, beim Stillsitzen ist der ganze Vogel einfarbig graugrün; weiter hat er bei rothem Flügelspiegel kein rothes Abzeichen im Schwanz und sein Gefieder ist mehr als das aller anderen Papageien mit Puderstaub gefüllt. Auch bei dieser Art kommen Abänderungen vor, bei manchen fehlt das Gelb am Scheitel, bei anderen erstreckt es sich über den ganzen Oberkopf; zuweilen zeigt einer die Puderdaunen garnicht. Raben-

Digitized by Google

größe und darüber (Länge 47—49 cm; Flügel 22,2 — 25,6 cm; Schwanz 11—14,6 cm). Er gehört also zu den größten unter allen Amazonenpapageien.

Seine Heimat ist Südamerika (mittleres Brasilien, Guiana, Ekuador, Bolivia bis Panama) und er soll besonders in Guiana sehr zahlreich vorkommen. Ueber seine Lebensweise ist nichts weiter bekannt, als daß sie im wesentlichen mit der aller anderen übereinstimmt. Auch er wird viel gefangen, läßt sich leicht zähmen und abrichten und lernt recht gut sprechen, doch ist er eben seines Schreiens wegen nicht in dem Maße geschätzt wie die meisten vorhergegangenen Verwandten. Preis für den rohen Vogel 30, 36 bis 45 M., als abgerichteter Sprecher 75, 90 bis 100 M.

Der gelbnackige Amazonenpapagei

[Psittacus auripalliatus, *Lss.*].

Gelbnacken oder Gelbnacken-Amazone, gelbnackiger Papagei, Goldnacken-Amazone oder -Amazonenpapagei, blos Goldnacken und gelbnackiger Kurzflügelpapagei. — Golden-naped Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à collier d'or. — Goudnek Amazone Papegaai.

Dem vorigen nahe verwandt, ist diese Art doch für den Kenner leicht zu unterscheiden. Sie erscheint an Stirn, Oberkopf und Wangen hellgrasgrün; Scheitel meerbläulich; Scheitelmitte mehr oder minder, manchmal garnicht gelb; Augengegend meerblau, jede Feder schwärzlich gerandet; Nacken zitrongelb; Flügelrand nur zuweilen roth, manchmal mit einzelnen rothen Federn, doch auch bis zu großen rothen Achseln; Spiegelfleck im Flügel roth; Schwanzfedern am Grunddrittel der Innenfahne roth; ganze übrige Oberseite grasgrün, nur an Hinterhals und Halsseiten jede Feder mit schwärzlichem Endsaum; Unterseite mehr gelbgrün; Schnabel dunkelhorngrau, am Grunde ein gelblicher Fleck; Wachshaut schwärzlich mit schwarzen Borstenfederchen; Auge braun- bis röthlichgelb, Augenkreis weißlich; Füße bräunlichhorngrau, Krallen schwarz. Jugendkleid nach Hagenbeck ohne den gelben Nackenfleck. Besondere Kennzeichen:

Digitized by Google

die meerblaue Färbung an Scheitel und Augengegend, der gelbe Nacken und die schwarzen Borstenfederchen auf der Nasenhaut. Im übrigen ist er der Surinamamazone sehr ähnlich. Nahezu Rabengröße (Länge 37—40 cm; Flügel 19,4 — 21,3 cm; Schwanz 11,6 — 12,4 cm). Heimat: Mittelamerika bis Nikaragua. Nach Angaben des Reisenden Dr. v. Frantzius soll er in Kostarika als Käfigvogel sehr beliebt und als leicht lernender Sprecher hoch geschätzt sein. Bei uns ist er im Handel etwas seltner als die nächsten Verwandten, doch gehört er immerhin zu den bekanntesten Papageien. Frau Hedwig v. Prosscheck schildert eine gelbnackige Amazone, welche Vieles sprach, auch sang und lachte, als überaus liebenswürdig. Der Preis beträgt schon für den frisch eingeführten Gelbnacken 50 bis 75 M. und für den abgerichteten Sprecher 100, 120 bis 150 M.

Natterer's Amazonenpapagei

[Psittacus Nattereri, *Fnsch.*].

Natterer's Kurzflügelpapagei, Grüne (!) Amazone. — Natterer's Amazon Parrot. — Perroquet Amazone de Natterer. — Natterer's Amazone Papegaai.

Der österreichische Reisende Natterer hatte im Jahr 1829 diesen Papagei nur in einem einzigen Kopf im nordwestlichen Brasilien erlegt, und nach demselben hat Dr. Finsch die Art beschrieben und dem Forscher zu Ehren benannt. Dann wurde Natterer's Amazone von Fräulein Chr. Hagenbeck im Jahre 1877 zuerst lebend eingeführt und seitdem ist sie nach und nach mehrfach einzeln in den Handel gelangt. Sie ist an Stirn, Kopfseiten und Kehle blaugrün; Augenbrauenstreif gelb; Hinterkopf mit bläulichaschgrauem Fleck; großer Spiegelfleck im Flügel roth; Schwanzfedern durchaus ohne Roth; ganze Oberseite dunkelgrün, an Nacken und Mantel jede Feder dunkler gesäumt; Unterseite kaum heller grün; Brust meerblau angeflogen, unterseitige Schwanzdecken gelblichgrün; Schnabel horngrau, Spitze schwärzlich, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein weißgelber Fleck; Wachshaut grauweiß; Auge braun

Digitized by Google

bis orangeroth mit schmalem braunen Ring um die Iris; nackter Augenkreis weißgrau; Füße blaugrau, Krallen schwarz. Weibchen oder Jugendkleid: düstergrün, dem weißbepuderten Amazonenpapagei ähnlich, doch mit allen Artmerkmalen des Männchens. Besondere Merkmale: die bläuliche Färbung an Stirn, Zügeln und Augengegend; durchaus ohne gelben Scheitel; Flügelbug und Rand des Unterarms roth. Etwa Rabengröße (Länge 47—49 cm; Flügel 22,2 — 24,7 cm; Schwanz 11,8 — 14,6 cm). Als Heimat ist nur das nordwestliche Brasilien bekannt. Ueber das Freileben ist Näheres nicht angegeben. Für die Liebhaberei hat diese Amazone erst geringe Bedeutung; bei häufigerer Einführung würde sie wol den vorhergegangenen nächsten Verwandten in jeder Hinsicht gleichen. Preis 50 M.

Der Guatemala-Amazonenpapagei

[Psittacus guatemalensis *(Hrtl.)*].

Guatemala-Amazone, Blauscheitel-Amazonenpapagei, blauscheiteliger Kurzflügelpapagei. — Guatemalan Amazon Parrot. — Perroquet Amazone de Guatemale. —. Guatemala Amazone Papegaai.

Unter den frisch eingeführten Amazonenpapageien sieht man in der Regel mehrere Arten zusammen, welche, aus denselben oder doch naheliegenden Gegenden herstammend, von den Aufkäufern gleichzeitig auf die Schiffe gebracht werden; so kommt stets die Guatemala- mit der Mülleramazone herüber, doch ist sie viel seltner als letztre. Karl Hagenbeck sagt, sie sei wol schon vor länger als 20 Jahren, jedoch stets nur in einigen Köpfen alljährlich, zu uns gelangt. — Sie ist an Stirn, Oberkopf bis Nacken himmelblau; die Kopfseiten sind lebhaft grün; Nacken, Hinterhals, Mantel und Schultern grünlichgrau; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth; Flügelrand ohne Roth; Schwanzfedern durchaus ohne Roth; ganze Oberseite dunkelgrasgrün; Unterseite kaum heller grün; Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel schwärzlich, Oberschnabel mit röthlichweißem Fleck; Wachshaut bläulichgrau; Auge karminroth, Iris mit breitem braunen Rand;

Digitized by Google

Augenrand bläulichweiß; Füße weißgrau, Krallen schwarz. Das Weibchen ist an der Stirn grün, jede Feder nur blau gesäumt; Oberkopf und Nacken mehr lilablau; Wangen, Kopfseiten und Kehle grasgrün; Schnabel heller, schwärzlichhorngrau, nur mit weißlichem Fleck am Grunde des Unterschnabels; der rothe Ring in der Iris des Auges viel schmaler. Besondere Kennzeichen: der bläuliche Oberkopf; kein Roth am Flügelrand und im Schwanz; Puderdaunen am Rückengefieder. Fast über Rabengröße (Länge 47 — 48 cm; Flügel 22 — 23 cm; Schwanz 11,6 — 12 cm). Als Heimat ist Mexiko, vornehmlich der Süden, von den Reisenden angegeben; über das Freileben ist aber garnichts bekannt. Im Wesen weicht die Guatemala-Amazone von den Verwandten durchaus nicht ab, namentlich gleicht sie dem Müller, und wie alle anderen wird sie leicht zahm und lernt gut sprechen, ist aber zeitweise ein unleidlicher Schreier. Preis für den rohen Vogel schon 60 bis 75, für den Sprecher 90 bis 100 M.

Der Amazonenpapagei mit gelbem Daumenrand [Psittacus mercenarius, *Tschd.*] — Kurzflügelpapagei mit gelbem Daumenrand, Soldaten-Amazone(!) — Mercenary Amazon Parrot — Perroquet Amazone mercénaire — wurde von J. von Tschudi in Peru entdeckt, und dieser Reisende hebt besonders die Regelmäßigkeit in allen Verrichtungen seines Freilebens hervor, die Eingeborenen nennen ihn daher ‚Tagelöhner', doch sagt Herr K. Petermann, daß jene Angabe während der Nistzeit nicht zutreffend sei. Als Heimat sind auch noch Neugranada und Ekuador bekannt. Diese Art steht der Venezuela-Amazone am nächsten, doch ist sie durch den Mangel von gelber oder blauer Färbung am Kopf bei rothem Spiegelfleck im Flügel zu unterscheiden. Sie ist an Ober- und Hinterkopf grün, jede Feder mit schwärzlichem Endsaum; am Oberrücken sind die Endsäume undeutlich; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth; Flügelrand grün; Daumenrand röthlichgelb; roth im Schwanz; ganze Oberseite dunkelgrasgrün; Unterseite heller grün; an Hals und Brustseiten jede Feder mit schwärzlichem Endsaum; untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel gelblichhorngrau;

Digitized by Google

Spitze des Ober- und Grund des Unterschnabels braun; Auge gelb; Füße braun, Krallen schwärzlich (nach Tschudi und Finsch). Etwas unter Krähengröße (Länge 32—35 cm; Flügel 18—20 cm; Schwanz 9—10 cm). Die Amazone mit gelbem Daumenrand gehört zu den wenigen bis jetzt noch nicht lebend eingeführten Arten.

Der graunackige Amazonenpapagei [Psittacus canipalliatus, *Cb.*] ist von Cabanis beschrieben und zwar als dem gelbnackigen Amazonenpapagei sehr ähnlich, aber: Oberkopf graulich; breites Nackenband hellgrau; vordrer Flügelrand gelb, rother Flügelfleck fast garnicht vorhanden, nur an den beiden vordersten Armschwingen ein kleiner rother Längsfleck; Borstenfederchen auf der Nasenhaut grün; Schnabel und Füße schwärzlich; in der Größe wenig von der vor. verschieden. Im Berliner Museum befindet sich ein in Neugranada gesammelter Balg. Sclater in London behauptet, daß dieser Vogel, der ihm wohlbekannt und im Londoner Museum mehrfach vorhanden sei, nur als das Jugendkleid der Amazone mit gelbem Daumenrand gelten könne — und deshalb sei er hier nur beiläufig angeführt.

Bouquet's Amazonenpapagei [Psittacus Bouqueti, *Bchst.*] — Blaukopf, Bouquet's Kurzflügelpapagei — Blue-faced Amazon or Bouquet's Amazon Parrot — Perroquet Amazone de Bouquet — Bouquet's Amazone Papegaai — eine Art, welche bereits von Edwards (1758) gut abgebildet und also den älteren Schriftstellern bekannt war, hat trotzdem bis zur neuesten Zeit Anlaß zu Irrthümern gegeben, und, obwol als lebend eingeführt in der Liste der Thiere des zoologischen Gartens von London verzeichnet, war sie thatsächlich dort noch nicht vorhanden, sondern Dr. Sclater hatte sich insofern geirrt, als er sie mit einer andern verwechselt. Sie war in jenem Verzeichniß also jahrelang, als in 3 Köpfen in der Sammlung befindlich, fälschlich mitgezählt. An Stirn, Ohrgegend, Wangen und Oberkehle violettblau, hat sie die ganze Oberseite dunkelgrasgrün; Halsseiten heller; Spiegelfleck im Flügel roth; Flügelrand grün; seitliche Schwanz-

Digitized by Google

federn am Grunde der Innenfahne scharlachroth; Kehle und Oberbrust roth; übrige Unterseite hellgrasgrün; Schnabel horngrau, Oberschnabel federseits mit orangegelbem Fleck; Nasenhaut grauweiß; Auge orangegelb, nackter Augenkreis hellfleischfarben; Füße schwärzlichgrau, Krallen schwarzbraun, Krähengröße. Die Heimat war bisher nicht bekannt, neuerdings aber hat Herr Lawrence diese Art als neu unter dem Namen P. Nicholsi nach einem Exemplar von St. Dominique beschrieben, welches sich im Nationalmuseum von Washington befindet. Für die Liebhaberei ist der Vogel bis jetzt ohne Bedeutung.

Der blaumaskirte Amazonenpapagei [Psittacus cyanops, *Vll.*] — blaumaskirter Kurzflügelpapagei — Blue-faced Amazon Parrot — Perroquet Amazone à face bleue — Blauwmasker Amazone Papegaai — war es, welchen Dr. Sclater für die vorige Art gehalten hatte, während er nun festgestellt, daß die erwähnten drei als Bouquet's Amazonen in der Liste verzeichneten Vögel dieser Art angehören. Beide, sagt der Gelehrte, kommen auf benachbarten Inseln vor, beide erscheinen grün mit blauem Gesicht und rother Flügelzeichnung und unterscheiden sich nur dadurch, daß die Deckfedern der Schwingen erster Ordnung bei der erstgenannten Art grün und bei der letztern blau sind. Hiernach haben wir in dieser einen lebend eingeführten Amazonenpapagei vor uns, der jedoch zu den allerseltensten gehört und daher für die Liebhaberei kaum größre Bedeutung als die noch garnicht herübergebrachten Arten hat. Er ist an Vorderkopf, Zügeln und vorderen Wangen dunkelultramarinblau; Scheitel, Ohrgegend und Oberkehle blau; ganze Oberseite dunkelgrasgrün, an Hinterkopf, Hals und Rücken jede Feder schwarz gesäumt, obere Schwanzdecken gelbgrün; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth; Deckfedern der ersten Schwingen blau; die beiden äußersten Schwanzfedern an der Innenfahne mit rothem Fleck; Kehle, Brust und Bauch weinroth; Schenkel, Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel bräunlichhorngrau; Auge?; Füße und Krallen schwarzbraun. Besondere Kennzeichen: weinrothe Unterseite,

Digitized by Google

blaue Deckfedern der ersten Schwingen und rother Spiegelfleck im Flügel. (Beschreibung nach Dr. Finsch). Krähengröße. Heimat St. Lucia in Westindien.

Der braunschwänzige Amazonenpapagei [Psittacus augustus, *Vgrs.*] — braunschwänziger Kurzflügelpapagei, Blaukopf, Kaiser-Amazone (!) — Imperial Amazon or August Amazon Parrot — Perroquet Amazone impériale — Bruinstaart Amazone Papegaai — soll die größte unter allen Amazonen sein. Sie ist am Oberkopf düster röthlichbraun mit bläulichem Schein; Hinterkopf grünlichgrau; Zügel und Wangen braun; Nacken, Hinterhals und Halsseiten violettschwarz; Oberrücken, Flügeldecken und Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken grasgrün, bläulich scheinend; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth; Handwurzelfleck roth; Schwanz düster purpurbraun; ganze Unterseite röthlichbraun, mit blauviolettem Schein; Schnabel horngrau, Oberschenkel am Grunde gelblich; Auge?; Füße und Krallen dunkelhornbraun. Rabengröße. (Beschreibung nach Dr. Sclater). Heimat Dominika. Diese Art ist erst einmal lebend eingeführt und soll selbst in ihrem Vaterlande überaus selten sein. Sie hat daher für die Liebhaberei nur geringe Bedeutung.

Guilding's Amazonenpapagei [Psittacus Guildingi, *Vgrs.*] — Guilding's Amazone, Guilding's Kurzflügelpapagei, St. Vincent-Amazone, Königs-Amazone (!) — Guilding's Amazon Parrot — Perroquet Amazone de Guilding — Guilding's Amazone Papegaai — gehörte bis vor kurzem selbst als Balg noch zu den seltensten Vögeln der Museen, ist aber seit d. J. 1874 in zwei Köpfen in den Londoner, dann i. J. 1880 in den Amsterdamer zoologischen Garten und neuerdings durch A. Jamrach in London und Fräulein Chr. Hagenbeck in Hamburg mehrfach in den Handel gelangt. Er ist einer der prächtigsten: an Stirn, Ober-, Hinterkopf und Gegend ums Auge weiß; Nacken, Schläfe, untere Wangen und Ohrgegend blau; Hinterhals und Halsseiten düstergrünlich; Mantel, Rücken und Schultern grünlich, kastanienbraun verwaschen; Hinterrücken und obere Schwanzdecken mehr kastanienrothbraun; Spiegelfleck im Flügel lebhaft orangegelb; Handrand und Schwanz-

Digitized by Google

federn am Grunddrittel gleichfalls orangegelb; ganze Unterseite kastanienbraun, an Brust und Bauch schwärzlich, an Bauchmitte und Schenkeln grünlich scheinend; Hinterleib und untere Schwanzdecken grüngelb, schwach bläulich scheinend; Schnabel horngrau; Wachshaut grauweiß; Auge dunkel- bis rothbraun; nackter Augenkreis bläulichweiß; Füße horngraubraun, Krallen schwärzlich. Nahezu Rabengröße (Länge 40 cm; Flügel 22 cm; Schwanz 14 cm.). Heimat: Die Insel St. Vincent. In seinen Eigenthümlichkeiten und also auch in der Sprachbegabung wird er wol mit den vorhergegangenen Verwandten übereinstimmend sich zeigen. Hoffentlich kommt er demnächst häufiger in den Handel.

Der gelbbäuchige Amazonenpapagei [Psittacus xanthops, *Spx.*] — gelbbäuchiger Kurzflügelpapagei, Goldbauch-Amazone (!) — Yellow-bellied Amazon Parrot — Amazone à ventre jaune — Geelbuik Amazone Papegaai — befand sich in zwei Köpfen, jedenfalls den ersten, welche lebend eingeführt worden, in der hier schon mehrfach erwähnten Sammlung des Herrn Karl Hagenbeck auf der ersten „Ornis"-Ausstellung in Berlin. In der Liste des zoologischen Gartens von London v. J. 1877 war die Art als in einem Vogel vorhanden angegeben, doch ist sie in der nächsten Ausgabe fortgelassen und also irrthümlich vermerkt gewesen. Der gelbbäuchige Amazonenpapagei ist an Stirn und Vorderkopf bis zur Kopfmitte gelb; Ober- und Hinterkopf grün; Wangen und Kopfseiten grüngelb, Wangenfleck zuweilen dunkelgelb; kein rother Spiegelfleck im Flügel; Deckfedern am Unterarm gelb; die äußeren Schwanzfedern mit rothem Fleck über beide Fahnen; ganze übrige Oberseite olivengrünlichgrasgrün; Unterseite heller grün; Bauch mit breiter gelber, jederseits in einen rothen Fleck endender Binde; Schnabel horngelb, Spitze weißlich, Nasenhaut weiß; nackte Haut weiß; Auge braungrau bis gelbroth mit orangegelbem Ring um die Iris; nackte Haut weiß; Füße und Krallen bräunlichhorngrau. Zuweilen ist ein breiter schwach blauer Stirnrand vorhanden; der ganze Kopf, Hals und die Oberkehle sind gelb; im Nacken einige grüne Federn; Ohrgegend röthlichorangegelb; Schwingen zweiter Ordnung an der

Digitized by Google

Außenfahne breit roth, im Schwanz dagegen kein Roth; Achseln, Brust und Oberbauchseiten gelblichzinnoberroth; Unterseite röthlich-orangegelb; Schenkel, Hinterleib und untere Schwanzdecken grün. Krähengröße (Länge 36,5 — 40 cm; Flügel 20,2 — 22 cm; Schwanz 10,5 — 12,5 cm). Heimat: westliches Brasilien. Die Reisenden Spix und Natterer hatten zahlreiche Exemplare eingesammelt und meinen, daß diese Vögel sehr stumpfsinnig sich zeigten, jedenfalls weil sie das furchtbare Feuerrohr noch nicht kannten. Ueber das Freileben ist kein besondrer Bericht vorhanden. Für die Liebhaberei hat dieser Papagei noch keine Bedeutung.

Der blaukehlige Amazonenpapagei

[Psittacus festivus, *L.*].

Blaubart, blaubärtige Amazone, rothrückiger Amazonenpapagei, rothrückige Amazone, blaukinniger Kurzflügelpapagei. — Festive Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à dos rouge, Perroquet Tavoua. — Blauwkeel Amazone Papegaai.

Seit Linné her bekannt, wurde diese Amazone von den älteren Schriftstellern, so besonders von Buffon, als Sprecher gerühmt, der sogar den Graupapagei übertreffen solle, doch habe sie zugleich sehr böse Eigenschaften, denn sie sei falsch und boshaft und beiße, während man sie liebkose. Auch neuere Reisende, wie Schomburgk, behaupten, daß sie zu den gelehrigsten Papageien gehöre, sehr deutlich sprechen und Lieder nachpfeifen lerne. Aufmerksame Beobachtung in letztrer Zeit hat aber ergeben, daß diese Aussprüche größtentheils unrichtig sind. Falsches, tückisches Wesen zeigen alle Papageien, welche schlecht erzogen worden, und unter allen bis hierher geschilderten lebend eingeführten Amazonen steht diese an Sprachbegabung ganz entschieden beträchtlich zurück.

Sie zeigt Stirnrand und Zügel blutroth; Augenbrauen- und Schläfenstreif hellblau; Oberkopf mit breitem grünen Fleck; Hinterkopf bis zum Nacken blau; Kopfseiten grün; Hinterrücken und Bürzel

Digitized by Google

scharlachroth; Flügel ohne rothen Spiegelfleck; Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel dunkelblau; nur die äußerste Schwanzfeder beiderseits am Grunde roth; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün; Unterseite heller grün; Kehle blau; untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel blaßfleischfarben; Wachshaut schwärzlich; Auge braun bis karminroth mit dunkelbraunem Ring um die Iris; nackte Haut ums Auge weißlichgrau; Füße grauweiß bis bräunlichhorngrau, Krallen schwarzbraun. (Bei manchen sind Hinterrücken, Bürzel und Schwanz einfarbig grün; ob dies das Kleid des Weibchens oder das Jugendkleid sei, ist noch nicht bekannt. Auch der rothe Zügel fehlt zuweilen; der grüne Fleck auf dem Oberkopf erstreckt sich mehr oder minder weit; der Hinterkopf ist bis zum Nacken blau). Krähengröße (Länge 36,5 cm; Flügel 19,2 — 20 cm; Schwanz 8,9 — 9,6 cm). Burmeister und nach ihm Brehm stellen diese irrthümlich zu den größten Amazonen. Heimat: Brasilien, Bolivia, Guiana und Venezuela; trotz der weiten Verbreitung ist aber über ihr Freileben fast garnichts bekannt. Im Handel erscheint sie nicht häufig und daher mag es kommen, daß sie schon als roher Vogel ziemlich hoch bezahlt wird. Preis 36, 50, 60 bis 75 M.

Bodinus' Amazonenpapagei [Psittacus Bodini, *Fnsch.*] — Rothstirn-Amazone — Bodinus' Amazon Parrot — Perroquet Amazone de Bodinus — Bodinus' Amazone Papegaai. — Unter den vielen Beispielen, in denen die Liebhaberei und der Vogelhandel der Wissenschaft große Dienste geleistet, steht die Einführung dieser Amazone hoch obenan. Ein solcher Vogel befand sich im Jahr 1872 im zoologischen Garten von Berlin, wurde von Finsch beschrieben und dem Direktor Dr. Bodinus zu Ehren benannt. Er hat eine breite scharlachrothe Stirnbinde bis zur Kopfmitte; Zügelstreif schwärzlich; Kopfseiten bläulich; Unterrücken und Bürzel scharlachroth; ganze übrige Oberseite (auch obere Schwanzdecken und Flügelrand) grün; nur die beiden äußersten Schwanzfedern am Grunde der Innenfahne roth; kein rother Spiegelfleck im Flügel; Wangen, Kehle und übrige Unterseite dunkelgrasgrün, ohne schwärzliche Federränder; Schnabel schwärzlich; Wachshaut graugelb; Auge braun bis orangegelb; nackte Haut weißlich; Füße schwärzlichgrau,

Digitized by Google

Krallen schwarz. Krähengröße (Länge 35—36 cm; Flügel 19,5—20 cm; Schwanz 9—9,9 cm). Heimat: Venezuela. Der blaukehligen Amazone sehr ähnlich, unterscheidet sich diese durch den schwärzlichen Zügelstreif und das Fehlen des blauen Augenbrauen- und Schläfenstreifs, die bläulichen, anstatt grünen Kopfseiten, die grünen oberen Schwanzdecken, den grünen und nicht blauen Flügelrand, die dunklere Unterseite und den schwärzlichen Schnabel. Im Jahre 1879 brachte Fräulein Hagenbeck eine zweite Bodinus' Amazone auf die Berliner Vogelausstellung und seitdem sind noch mehrere in den Handel gelangt. Irgend etwas Näheres über das Frei- oder Gefangenleben ist bis jetzt noch nicht veröffentlicht, doch dürfte sie in jeder Hinsicht den vorangegangenen nächsten Verwandten gleichen. Ein feststehender Preis läßt sich der Seltenheit wegen kaum angeben.

Sallé's Amazonenpapagei

[Psittacus Sallei, *Scl.*].

St. Domingo-Amazone, weißstirnige Portoriko-Amazone, Blaukrone, Sallé's Kurzflügelrapagei. — Sallé's Amazon Parrot. — Perroquet Amazone de Sallé, Perroquet de St. Domingo. — Sallé's Amazone Papegaai.

Mit dieser Art beginnt eine Gruppe kleiner Amazonen, welche von den Händlern gewöhnlich sämmtlich Portoriko-Papageien genannt werden. Sie bleiben, wie schon S. 131 erwähnt, an Sprachbegabung und Klugheit hinter den voraufgegangenen großen Sprechern entschieden weit zurück, dagegen werden sie stets ungemein zutraulich und liebenswürdig, während sie freilich immer als arge Schreier gelten müssen.

Sallé's Amazonenpapagei ist an Stirn und Zügeln weiß; Vorderkopf und Scheitel düsterblau; Wangen grün; Ohrgegend schwarz; obere Schwanzdecken gelbgrün; Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel blau; äußere Schwanzfedern an der Grundhälfte scharlachroth, welche Färbung nach Innen zu an Ausdehnung abnimmt; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, jede Feder schwärzlich gesäumt; Unterseite heller grasgrün; Hinterleib mit rundem

Digitized by Google

düster scharlachrothem Fleck; Schenkelgegend bläulichgrün; Schnabel gelblichhorngrau; Wachshaut weißgrau; Auge dunkelbraun bis rothbraun; nackter Augenkreis fast reinweiß; Füße weißgrau, Krallen horngrau. Besondere Kennzeichen: Der Mangel des rothen Stirnrands, Augenbrauenstreifs und Spiegelflecks im Flügel; die Stirn ist zuweilen gelblichweiß. Etwa Dohlengröße (Länge 31,5—33 cm; Flügel 17,2—18,7 cm; Schwanz 9,6—10 cm. Heimat: die Insel St. Domingo.

Der niedliche Papagei wurde schon von Brisson (1760) beschrieben und war also den älteren Schriftstellern bekannt, doch hielt man ihn für das Weibchen der weißköpfigen Amazone und erst Dr. Sclater (1857) hat ihn mit Sicherheit als Art festgestellt. Ueber sein Freileben sind keine Mittheilungen zu finden. Er gelangt verhältnißmäßig selten in den Handel und ist auch nicht besonders beliebt. Im übrigen gilt von ihm das vorhin von allen kleinen Amazonen Gesagte. Preis 20 bis 24 M. für den frisch eingeführten und 75 bis 120 M. für den gezähmten und abgerichteten.

Der rothstirnige Amazonenpapagei

[Psittacus vittatus, *Bdd.*].

Rothstirnige Portoriko-Amazone, blos Portoriko-Amazone, rothstirniger Kurzflügelpapagei. — Red-fronted Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à front rouge, Perroquet Amazone de St. Domingo. — Roodvoorhoofd Amazone Papegaai.

Auch diese Art wurde als das Weibchen einer andern angesehen. Sie ist von Boddaert (1783) beschrieben, doch war bis zur neuern Zeit nichts über sie bekannt. Sie hat scharlachrothen Stirnrand; ihre ganze Oberseite ist dunkelgrasgrün, jede Feder mit breitem schwarzen Endsaum; Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel düsterblau; Flügelrand meistens grün; äußerste Schwanzfedern am Grunde mit rothem Fleck; Kehlfleck roth; ganze Unterseite hellgrün, an Hals und Brust jede Feder schwarz gesäumt; Bauch und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel horngrau.

Digitized by Google

Oberschnabel am Grunde graugelb; Wachshaut weiß; Auge braun- bis rothgelb; nackter Augenkreis weißlich; Füße bräunlichfleischfarben, Krallen braun. Abänderungen: Zuweilen auch Gesicht und Oberkehle roth; Flügelrand lebhaft gelb; der rothe Kehlfleck fehlt. Besondere Kennzeichen: bei rothem Stirnrand und blauen Deckfedern und Eckflügel, kein rother Spiegelfleck im Flügel. Dohlengröße (Länge 33,8 cm; Flügel 16,6—18 cm; Schwanz 9—10,5 cm). Von dem Reisenden Moritz wurde sie auf Portoriko beobachtet, und nach seinen Angaben weicht sie in der Lebensweise von der aller größeren Verwandten nicht ab. Sie soll scharenweise die Maisfelder verheren. Aus dem Nest geraubt und von Frauen aufgezogen und abgerichtet, lerne sie alle möglichen Töne von Menschen und Thieren nachahmen. Zu den gemeinsten Vögeln im Handel gehörend, wird sie auch von einzelnen Liebhabern recht geschätzt, im ganzen gilt jedoch inbetreff ihrer Begabung das über die kleinen Arten Gesagte ganz entschieden und ihr Preis steht dementsprechend auch keineswegs hoch, denn man kauft sie zwischen 20 bis 30, 40 bis höchstens 60 M.

Der weißköpfige Amazonenpapagei mit rothem Bauchfleck

[Psittacus leucocephalus, *L.*].

Rothhalsige Kuba-Amazone, blos Kuba-Amazone, rothbäuchiger Kurzflügelpapagei. — White-fronted Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à tête blanche, Perroquet Amazone de Cuba. — Havana of Cuba Amazone Papegaai.

Er gehört zu den am längsten bekannten amerikanischen Papageien, denn er wird schon von Aldrovandi erwähnt. Von Edwards zuerst beschrieben, hat ihn Linné wissenschaftlich benannt. Die alten Schriftsteller lobten ihn sehr und Catesby heißt ihn sogar Paradispapagei; auch Bechstein zählt diese zu den gelehrigsten Arten und hebt hervor, daß sie sehr viel plaudre und überaus zahm werde.

Digitized by Google

Sie ist an Stirn, Oberkopf, Zügeln und Augenrand weiß; Wangen, Ohrgegend und Kehle sind purpurroth; obere Schwanzdecken gelbgrün; Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel blau; Schwanzfedern an der Grundhälfte der Innenfahne scharlachroth; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, jede Feder mit breitem schwarzen Endsaum; Unterseite grasgrün, jede Feder nur schmal schwarz gesäumt; Bauch purpurviolett; Schenkel hellblau; untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel schwach gelblichweiß; Wachshaut reinweiß; Auge bräunlich- bis röthlichgelb; Augenkreis weiß; Füße weißlichfleischfarben; Krallen fleischfarben. Beim Weibchen soll der rothe Kehlfleck sich bis auf die Oberbrust ausdehnen und auch die Unterbrust purpurviolett sein. Jugendkleid: nur die Stirn weiß; Ohrfleck mehr grauschwärzlich; Wangen grün mit einzelnen rothen Federn. Besondere Kennzeichen: Mangel des rothen Stirnrands und Augenbrauenstreifs; Flügel ohne rothen Spiegelfleck; dagegen der purpurviolette Bauch. Stark Dohlengröße (Länge 32 — 34 cm; Flügel 17,6 — 19,6 cm; Schwanz 10,5 — 11 cm). Heimat: nur die Insel Kuba. Ueber das Freileben hat Dr. Gundlach berichtet und ich bitte das in der Uebersicht der Amazonen S. 127 Gesagte nachzulesen. „Dieser Papagei verursacht besonders am Obst Schaden, doch auch an anderen Nutzgewächsen und wird deshalb, wie auch seines Fleisches wegen, welches jedoch hart sein soll, verfolgt. Durch das Herunterschlagen des Gehölzes wird er immer mehr in den Urwald zurückgedrängt. Die Nistzeit beginnt im April und dauert bis Juli; als Nest wird ein Astloch vornehmlich in einer verdorrten Palme benutzt, und das Gelege besteht in 3 bis 4 Eiern. Die Jungen werden vielfach geraubt und aufgefüttert und man schätzt sie, weil sie leicht Worte und Sätze nachsprechen lernen, sehr zahm und zutraulich werden, angenehmes Wesen und schönes Gefieder haben."

Unsere Liebhaber loben ihn ebenfalls als gelehrig, gutmüthig und leicht zähmbar. Er plappert sehr gern, sagt Herr K. Petermann in Rostock, und anhaltend, jedoch meistens unverständlich, und wenn er auch bedeutendes Unterscheidungsvermögen und ein

Digitized by Google

vorzügliches Gedächtniß hat, so bleibt er doch an Begabung in jeder Hinsicht hinter dem Graupapagei und den hervorragenden Amazonen zurück. Dieser Ausspruch ist entschieden zutreffend. Der genannte liebevolle Vogelpfleger hat eine solche Kubaamazone, welche in 22 Jahren niemals krank gewesen ist. Der Preis steht nicht hoch, selten auf 20 bis 24, meistens 28, 30 bis 45 M.

Der weißköpfige Amazonenpapagei ohne rothen Bauchfleck

[Psittacus collarius, *L.*].

Weißköpfige Amazone; Jamaika-Amazone, Jamaika-Amazonen-Papagei, weißköpfiger Kurzflügelpapagei. — Red-throated Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à gorge rouge, Perroquet Amazone de la Martinique. — Witkop Amazone Papegaai.

Mit der vorigen früher vielfach verwechselt oder zusammengeworfen und ihr auch überaus ähnlich, ist diese weißköpfige Amazone gleichfalls schon längst bekannt, von Brisson (1760) beschrieben und von Linné benannt. Sie erscheint an Stirn und Zügeln reinweiß; der übrige Oberkopf ist bläulichgrün bis blau; die Kopfseiten und Oberkehle, auch meistens der Hinterhals sind weinroth; Gegend unterm Auge blaßblau; Ohrgegend grünlichblau; obere Schwanzdecken gelbgrün; Deckfedern der ersten Schwingen bläulichgrün; alle Schwanzfedern mit Ausnahme der beiden mittelsten reingrünen an der Grundhälfte scharlachroth; ganze übrige Oberseite grasgrün, an Nacken und Hinterhals jede Feder schwärzlich gesäumt; Unterseite schwach heller grün; Schenkel, Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel wachsgelb, Spitze des Oberschnabels grauweiß (hellhornfarben, am Grunde blaßschwefelgelb); Wachshaut grauweiß; Auge dunkel- bis rothbraun; Augenkreis grauweiß; Füße bräunlichgelbgrau, Krallen schwarz. Stark Dohlengröße (Länge 32—33 cm; Flügel 17 — 17,4 cm; Schwanz 9,4 — 10,3 cm). Unterscheidungszeichen von der vorigen Art: Oberseite einfarbig grasgrün ohne die breiten schwarzen Federsäume, die nur an Nacken und Hinterhals schmal und schwach sich zeigen; der rothe Bauchfleck

Digitized by Google

fehlt. Heimat nur Jamaika; dort soll er ziemlich häufig sein, sich vornehmlich von Orangen ernähren und in der Lebensweise und allem übrigen mit den nächstverwandten übereinstimmen. Auch ihn schätzen manche Liebhaber als gelehrig, doch dürfte er noch kaum den vorigen erreichen, ihm höchstens gleichkommen. In den Handel gelangt er verhältnißmäßig selten und daher steht sein Preis etwas höher 40, 50 bis 60 M.

Der weißstirnige Amazonenpapagei

[Psittacus albifrons, *Sprrm.*].

Brillen-Amazone, weißstirnige Amazone, Weißstirn-Amazone, weißzügeliger Kurzflügelpapagei. — White-browed Amazon Parrot, Spectacle Parrot. — Perroquet à front blanc, Perroquet à joues rouges. — Witvoorhoofd Amazon Papegaai.

Schon von Hernandez i. J. 1651 beschrieben, war dieser Papagei trotzdem in den Museen als Balg bisher noch immer selten, während er im Handel längst, wenn auch keineswegs zu den häufigen, doch zu den bekannteren gehörte; neuerdings ist er auch mehrmals auf den Vogelausstellungen aufgetaucht. Er erscheint an Stirn und Vorderkopf weiß mit blauem Scheitelfleck; schmaler Stirnrand, Zügel und Streif oberhalb des Auges und Gegend breit ums Auge neben dem Schnabel scharlachroth (der rothe Stirnrand fehlt zuweilen); Hinterkopf und Nacken bläulichgrün; Wangen und Ohrgegend gelbgrün; Eckflügel und Deckfedern der ersten Schwingen scharlachroth; Flügelrand grün; die vier äußeren Schwanzfedern an der Grundhälfte über beide Fahnen roth; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, jede Feder schwärzlich gesäumt; Unterseite schwach heller grün mit verwaschenen dunkelen Federsäumen; Bauch und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel graulichwachsgelb; Nasenhaut gelbgrau; Auge gelb- bis röthlichbraun; nackte Haut ums Auge schieferschwarz; Füße bräunlichgrau, Krallen schwärzlich. Etwa Dohlengröße (Länge 31—32 cm; Flügel 18,5—19 cm; Schwanz 9,6 — 11 cm). Heimat: Mexiko, Honduras, Guatemala, Nikaragua und auch Kostarika.

Digitized by Google

Diese bis dahin wenig beachtete Amazone ist von Herrn Friedrich Arnold in München neuerdings mit großer Liebe geschildert worden. „Sie spricht sehr viel, aber nur wenige Worte deutlich; sie lernt sehr rasch und vergißt ebenso schnell. Im übrigen ist sie ein herziger Hausfreund, der sich von den Kindern alles gefallen, im Puppenwagen spazieren fahren läßt u. s. w.; sie neckt auch gern selbst, klettert z. B. am Vorhang genau so hoch, daß ihre kleinen Freunde sie nicht erreichen können und fordert nun diese durch fortwährende Zurufe auf, sie vermittelst Stuhl und dann Tisch weiter zu verfolgen, bis sie endlich auf der Vorhangsstange in sichrer Höhe gleichsam würdevoll auf- und abschreitet. Ihren verschiedenen Wünschen, wie Köpfchen krauen, Pfote geben und Erlangung von Milchbrotstückchen oder Apfelschnittchen, muß immer bald folgegeleistet werden, denn wenn man diese bescheidenen Ansprüche nicht beachtet, so zieht sie sich zurück und weist jeden Versöhnungsversuch mit Schnabelhieben ab. Im übrigen zerstört sie Alles, was sie erreichen kann und wenn sie bestraft werden soll, so weiß sie mit wirklich bewundernswerther Verschlagenheit durch ganz außerordentliche Liebenswürdigkeit die Aufmerksamkeit abzulenken. Sie ist und bleibt daher der Liebling aller Familienmitglieder." Auch hier haben wir also eine Bestätigung des Urtheils über die Begabung der kleineren Amazonenarten, wie ich es Seite 131 ausgesprochen, vor uns. Der Preis beträgt der Seltenheit wegen schon 36 Mark für den soeben angekommenen, selten 30 Mark, steigt aber auch nur bis zu 50 Mark für den abgerichteten Vogel.

Unter dem Namen weißstirniger Amazonenpapagei mit schmalem rothem Augenring [Psittacus apophoenicus, *Rchn.*] hatte ich in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III eine von Reichenow aufgestellte neue Art aufgenommen, aber sogleich die Vermuthung ausgesprochen, daß es nur eine Spielart sein werde. Schon im Nachtrag zu dem genannten Werk konnte ich berichten:

Digitized by Google

Dr. Sclater sagt, sie sei nur das Weibchen der weißstirnigen Amazone. „Von derselben unterscheidet sie sich dadurch, daß das Weiß der Stirn weniger ausgedehnt ist und das Roth nur einen schmalen Ring ums Auge bildet, daß die Deckfedern der großen Schwingen nicht scharlachroth, sondern grün sind." Diese Art muß also gestrichen werden.

Der weißstirnige Amazonenpapagei mit gelbem Zügel und Kopfstreif [Psittacus xanthol*o*rus, *Gr.*] — Gelbzügel-Amazone, gelbzügeliger Kurzflügelpapagei — Yellow-lored Amazon Parrot — Perroquet Amazone à oreilles jaunes — Geeloor Amazone Papegaai — eine Art, von der noch Dr. Finsch (1867/68) sagt, sie sei den meisten Ornithologen unbekannt und selten in den Museen vorhanden, auch werde sie immer mit der vorhergegangnen verwechselt, hatte ich trotzdem in einem hübschen Exemplar bereits im Jahre 1872 vor mir, und habe sie dann auch seitdem mehrfach im Handel und namentlich auf den Ausstellungen gesehen. Sie ist am Vorderkopf und bis über die Scheitelmitte mehr oder minder weit hinauf reinweiß; Augenbrauen und breiter Streif unterm Auge scharlachroth; Zügel und schmaler Streif oberhalb der rothen Augenbrauen um die Stirnplatte zitrongelb; an der Ohrgegend ein runder bräunlichschwarzer Fleck; Deckfedern der ersten Schwingen scharlachroth; Schulterrand, Flügelbug und Achseln roth; äußere Schwanzfedern mit rothem Fleck am Grunde der Außen- und Innenfahne; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, jede Feder breit schwarz gesäumt; ganze Unterseite heller grün, gleichfalls jede Feder breit schwarz gesäumt; unterseitige Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel düsterwachsgelb; Nasenhaut rußschwarz; Auge braun- bis orangeroth; nackte Haut ums Auge blau; Füße bräunlichgelb, Krallen braun. Besondere Kennzeichen: Gelber Zügel; breite weiße Stirn; geringes oder garkein Blau am Oberkopf; schwarzer Ohrfleck; geringes Roth im Schwanz; Eckflügel grün, doch zuweilen breit roth; am Ober- und Unterkörper deutliche dunkele Federsäume. Etwa Dohlengröße (Länge 28—30 cm; Flügel 16—18 cm; Schwanz 8,5—9 cm). Eine der kleinsten Amazonen. Heimat: Honduras und Yukatan. Uebrigens ist die Gelbzügel-

Digitized by Google

Amazone von Kuhl i. J. 1821 beschrieben und von Gray i. J. 1859 benannt. Im Wesen und in der Begabung, namentlich in der Liebenswürdigkeit, gleicht sie durchaus den vorigen. Preis 30 bis 60 M.

Prêtre's Amazonenpapagei [Psittacus Prêtrei *Tmm.*] — Prêtre's Kurzflügelpapagei, Pracht-Amazone (!) — Prêtre's Amazon Parrot — Perroquet Amazone de Prêtre — Prêtre's Amazone Papegaai — ist eine von den Arten, über welche wir bis jetzt leider noch fast garnichts wissen. Sie erscheint an Stirn, Vorderkopf, Zügeln und Augenkreis scharlachroth; Deckfedern der ersten Schwingen, Eckflügel, Unterarm und Handrand gleichfalls scharlachroth; Schwanzfedern ohne Roth und wie die ganze übrige Oberseite olivengrünlichgrasgrün, an der Endhälfte mehr grüngelb, am Grunde der Innenfahne mattbräunlichschwarz; Unterseite grasgrün; Schenkelgegend scharlachroth; Hinterleib und untere Schwanzdecken reingelbgrün; Schnabel bräunlichhorngrau, am Oberschnabel jederseits ein röthlicher Fleck; Auge?; Füße und Krallen dunkelhornbraun. Besondere Kennzeichen: Das viele Roth, insbesondre am Kopf, und der Mangel desselben in den Schwanzfedern. (Beschreibung von Dr. Finsch). Ein Balg befindet sich im britischen Museum, doch ohne Angabe des Sammlers; in der Heine'schen Sammlung ist ein Exemplar vorhanden, welches H. Knorre im südlichsten Brasilien erlegt hat, und das Berliner Museum enthält ein solches aus Uruguay. Damit ist alles über diese Art Bekannte erschöpft.

Der Amazonenpapagei mit rothen Flügeldecken [Psittacus ágilis, *L.*] — Rothspiegel-Amazone, Kurzflügelpapagei mit rothen Schwingendecken — Active Amazon Parrot — Perroquet Amazone active — Roodvleugel Amazone Papegaai — war wiederum den älteren Schriftstellern schon bekannt, denn bereits Edwards (1751) hat ihn beschrieben und Linné (1767) benannt. Buffon bezeichnet ihn als den eigentlichen Krik, nach welchem alle hierhergehörenden Amazonen gleichfalls mit diesem

Digitized by Google

Namen belegt worden. Er ist am Oberkopf grünlichblau; erste Schwingen an der Außenfahne, zweite an der Endhälfte blau; Deckfedern der ersten Schwingen zinnoberroth; Schwanzfedern am Grunde der Innenfahne gelb mit rothem Fleck, die beiden mittelsten Schwanzfedern jedoch einfarbig grün; ganze übrige Oberseite (auch Eckflügel, Flügelbug und die übrigen Deckfedern) grasgrün; Unterseite kaum heller grün; untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel grauschwarz, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein hellerer Fleck; Wachshaut schwärzlichaschgrau; Auge dunkelbraun; Füße und Krallen grauschwarz. (Bei manchen, wahrscheinlich jungen Vögeln ist das Roth der Deckfedern der ersten Schwingen sehr blaß oder es fehlt beinahe ganz). Beschreibung nach Finsch und Gosse. In der Größe gleicht er den beiden weißstirnigen Amazonenpapageien und dies wird auch wol in allen übrigen Eigenthümlichkeiten der Fall sein. Heimat: Jamaika. Der letztgenannte Forscher berichtet, daß der Amazonenpapagei mit rothen Flügeldecken in Scharen von 6 bis 20 Köpfen in den Wäldern lebe, zur Erntezeit aber, wie alle diese Papageien, in großen Schärmen die Pflanzungen überfalle und vielen Schaden verursache. Trotzdem ist er bis jetzt erst einmal in den zoologischen Garten von London gelangt und sonst noch garnicht eingeführt worden. Wahrscheinlich wird er demnächst und vielleicht recht zahlreich in den Handel gelangen.

Der rothmaskirte Amazonenpapagei

[Psittacus brasiliensis, *L.*].

Rothmasken-Amazone, rothmaskirter Kurzflügelpapagei. — Red-masked Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à masque rouge. — Roodmasker Amazone Papegaai.

Als ein vorzugsweise interessanter Papagei steht diese Amazone, die nicht mehr zu der Gruppe der kleinen gehört, sondern im Gegentheil eine der größten ist, vor uns. Auch sie zählt zu denen, welche von Edwards zuerst beschrieben und von Linné benannt sind, doch haben die älteren Schriftsteller gar-

Digitized by Google

nichts Näheres über sie angegeben und bis zur neuern Zeit mangelte inbetreff ihrer Lebensweise, ja selbst ihrer Heimat, jede Nachricht. Sie ist an Stirn und Oberkopf scharlachroth (Zügel und Stirnseiten mattscharlachroth, Stirnmitte und Vorderkopf fahlroth, mit gelblichgrünem Schein); Wangen und Ohrgegend blauröthlich (Streif über dem Auge und Ohrgegend kornblumenblau); Hinterkopf und Nacken grün (jede Feder mit rothem Fleck in der Mitte); Schwingen erster und zweiter Ordnung an der Außenfahne mehr oder minder gelb; Schwanzfedern an der Endhälfte scharlachroth mit grüngelber Spitze, die beiden mittelsten ohne Roth; ganze übrige Oberseite grasgrün, ohne dunkele Federränder (doch an Mantel, oberen Flügeldecken und Schultern mit kräftig schwarzblauem Schein, Rücken, Bürzel und obere Schwanzdecken reingrün); ganze Unterseite gelbgrün; Oberkehle blauröthlich; Schnabel bräunlichhorngrau mit heller First, schwärzlicher Spitze und jederseits am Oberschnabel ein gelbgrauer Fleck, Unterschnabel gelblichhorngrau; Nasenhaut grau; Auge braun mit orangerothem Ring (zuweilen dunkelblau); nackte Haut graublau; Füße grau, Krallen schwarz. Als *besondres Kennzeichen* ist der schwarzblaue Schein des Gefieders zu betrachten. Fast über Rabengröße (Länge 39—45 cm; Flügel 22—24 cm; Schwanz 11—15 cm). Als Heimat ist neuerdings Südbrasilien ermittelt.

Im Jahre 1828 befand sich eine rothmaskirte Amazone in der Sammlung lebender Vögel des Kaisers von Oesterreich in Schönbrunn, viele Jahrzehnte später hatte der Graf Hollstein eine solche von seiner Reise aus Brasilien mitgebracht, die dann in den Besitz des Herrn Karl Hagenbeck überging, welcher sie auf der großen „Ornis"-Ausstellung in Berlin in der schon mehrfach erwähnten Amazonen-Sammlung zeigte. Die dritte Amazone dieser Art erlangte Herr K. Petermann in Rostock durch den Vogelhändler A. Schäffer in Hamburg. Nach den beiden letzteren ist die von Finsch gegebne Beschreibung vervollständigt worden. Hagenbeck sagt und Petermann bestätigt es, daß diese Amazone überaus zahm wird und so sanft sich zeigt, daß man alles Mögliche mit ihr beginnen kann,

Digitized by Google

ohne daß sie beißt. Eine besonders hohe Sprachbegabung traut man ihr nicht zu, doch läßt sie auch nicht das häßliche Geschrei erschallen. Vielleicht kommt der interessante Vogel demnächst häufiger herüber.

Der rothschwänzige Amazonenpapagei

[Psittacus erythrurus, *Khl.*].

Rothschwänziger Kurzflügelpapagei, Rothschwanz-Amazone. — Red-tailed Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à queue rouge. — Roodstaart Amazone Papegaai.

In alter Zeit kam es vielfach vor, daß die Eingeborenen und zwar ebensowol in Amerika wie in Indien, aus den Federn, bzl. Bälgen der verschiedensten Arten einen Vogel zusammensetzten und ihn als absonderlich schöne, seltene oder noch nicht bekannte Art verhandelten; selbst gegenwärtig wird diese Kunst noch, wenn auch nicht häufig, betrieben. Früher wurde sie mit solcher Geschicklichkeit ausgeführt, daß sich sogar hervorragende Gelehrte zuweilen täuschen ließen. Die rothschwänzige Amazone zeigt nun aber gerade einen entgegengesetzten Fall, indem Dr. Finsch das einzige vorhandne Exemplar (im Pariser Museum), welches er freilich nicht selber gesehen, für solch' Artefakt hielt. Drei lebende Amazonen dieser Art nun aber brachte Herr Karl Hagenbeck auf die „Ornis"-Ausstellung nach Berlin i. J. 1879, und somit konnte ich nach dem vor mir stehenden lebenden Vogel die Beschreibung geben. Stirnrand bis fast zur Mitte des Oberkopfs und Streif oberhalb des Auges scharlachroth; Oberkopf, Zügel, Gegend unterm Auge, Wangen und Kehle blau; Hinterkopf und Nacken grasgrün, jede Feder fein schwärzlich gerandet; Mantel und Rücken dunkelgrün, jede Feder breit gelb gerandet; Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken gelblichgrün; übrige Oberseite grasgrün; Flügelrand mit schmalem scharlachrothen Streif; Flügelbug und Handrand grün; Schwanzfedern über beide Fahnen scharlachroth, am Grunde grün, am Ende gelbgrün; ganze Unter-

Digitized by Google

seite grün, jede Feder fein schwärzlich gerandet; Schnabel grauweiß mit schwärzlicher Spitze; Wachshaut bleiblau; Auge orangeroth, nackte Haut reinblau; Füße blaugrau, Krallen schwarz. Krähengröße (die Maße vermag ich nicht anzugeben, doch werden dieselben mit denen der gemeinen Amazone wol genau übereinstimmen). Von Hagenbeck's rothschwänzigen Amazonen gelangte eine in den Besitz des Herrn Direktor Westerman in Amsterdam, die zweite in den zoologischen Garten von London und die dritte als Balg in die Sammlung des Herrn Dr. Sclater. Es sind offenbar die einzigen bis jetzt bei uns vorhandenen Exemplare. Die Heimat ist mit Sicherheit noch nicht ermittelt; dagegen kann ich hinsichtlich der Begabung dieser Art die Annahme aussprechen, daß sie in derselben, wie im ganzen Wesen von den nächsten Verwandten nicht verschieden sein und als Sprecher etwa zu den mittelmäßigen gehören wird.

Der weinrothe Amazonenpapagei

[Psittacus vináceus, *Pr. Wd.*].

Weinrothe Amazone, Taubenhals-Amazone, rothschnäbeliger Kurzflügelpapagei. — Vinaceous Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à couleur de vin; Amazone à bec coleur de sang. — Roodbek Amazone Papegaai.

Obwol bereits Brisson (1760) bekannt, ist diese Art doch erst von Prinz Max von Neuwied (1820) genau beschrieben. Die weinrothe Amazone, wie sie in der Liebhaberei und im Handel meistens genannt wird, erscheint in ihrer Färbung recht schön und zwar ist sie: an Stirnrand und Zügel blutroth; Stirn dunkelgrün; Wangen gelblicholivengrün; Kopf und Oberrücken dunkelgrasgrün, jede Feder schmal schwärzlich gerandet; Hinterhals lilablau, jede Feder schwärzlich gesäumt; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth (Schwingen zweiter Ordnung breit roth über Außen- und Innenfahne); Handrand roth; äußere Schwanzfedern über beide Fahnen scharlachroth; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün; Wangen hellgrün; Kehle mit scharlachrothem Fleck (der zuweilen fehlt); Brust und Bauch dunkelweinroth (zuweilen bis über den Hinterleib); Schenkel

Digitized by Google

und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel hell- bis kräftig blutroth, Spitze grauweiß, Unterschnabel röthlichgrau; Wachshaut grünlich- oder bräunlichgrau; Auge braun- bis orangeroth; nackter Augenring grünlich oder bräunlichgrau; Füße bläulichweiß, Krallen horngrau. Etwa Krähengröße (Länge 34 cm; Flügel 19,2—21,3 cm; Schwanz 10,9—11 cm). Heimat: Südbrasilien und Paraguay.

Ueber das Freileben haben Prinz von Wied, Natterer, Azara und Burmeister Mittheilungen gemacht, die zwar sämmtlich kurz sind, aus denen jedoch hervorgeht, daß diese Art sich nicht wesentlich von den anderen unterscheidet. Herr Petermann, der sie gleichfalls in der Heimat beobachtet, traf sie in den hohen üppigen Urwäldern der Küsten von St. Katharina mehrmals in großen lärmenden Schwärmen, auch hat er sie vielfach im Käfig gehalten. In der Erregung sträubt sie die Nackenfedern und, so schreibt Herr Petermann, ihre orangerothen Augen verrathen unbändigen Trotz, doch ist sie nicht bösartig, sondern sanft, und selbst alte flügellahm geschossene wurden bald zahm. In der Gefangenschaft zeigt sie sich überaus ruhig, aber klug und gelehrig, doch lernt sie nur verhältnißmäßig wenig und auch nicht besonders deutlich sprechen; sie dürfte in dieser Beziehung unter den Amazonen nur zu denen gehören, welche den zweiten Rang einnehmen. Sie gelangt nicht häufig in den Handel und steht ziemlich hoch im Preise: 75 bis 120 M. für den frisch eingeführten Vogel.

Der scharlachstirnige Amazonenpapagei

[Psittacus coccinifrons, *Sne.*].

Scharlachstirnige Amazone, Grünwangen-Amazone, grünwangiger Kurzflügelpapagei. — Green-cheeked Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à front d'écarlate, Perroquet Amazone à joues vertes. — Groenwang Amazone Papegaai.

Auch diese gehört zu den erst in neuerer Zeit bekannt gewordenen Arten, denn sie wurde von Lesson (1844) erwähnt

Digitized by Google

und von Caſſin (1853) zuerſt beſchrieben. Sie iſt an Stirn, Zügeln und Vorderkopf (zuweilen auch Ober- und Hinterkopf) ſcharlachroth; Wangen ſmaragdgrün; Streif oberhalb der Augen um Schläfe und Ohr blau; Spiegelfleck im Flügel ſcharlachroth (Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne roth); Flügelrand und -Decken grün; äußerſte Schwanzfedern nur an der Innenfahne ſchwach röthlich; ganze übrige Oberſeite dunkelgrasgrün, jede Feder ſchwarz geſäumt; Unterſeite gelbgrün mit ſchmalen und verwaſchenen dunklen Federſäumen; Schnabel weißgelblichgrau, Oberſchnabel jederſeits mit gelblichem Fleck; Wachshaut grauweiß, Auge blaßſtrohgelb bis röthlichgelb; nackte Haut grauweiß; Füße gelblichhorngrau, zuweilen blaugrau, Krallen ſchwärzlich. Beſondere Kennzeichen: einfarbig grüne Unterſeite ohne ſchwarze Endſäume der Federn und am Grunde grüne Schwingen erſter Ordnung. Etwa Krähengröße (Länge 35,5—36 cm; Flügel 20—21 cm; Schwanz 10,5—11 cm). Heimat: Neu-Granada, Ekuador, Kolumbia; über ihr Freileben iſt garnichts bekannt. Im Jahre 1863 gelangte ſie in den zoologiſchen Garten von London, wurde i. J. 1878 von Fräulein Hagenbeck in zwei Köpfen eingeführt, wie ſich auch ein ſolcher in der Sammlung des Herrn Karl Hagenbeck befand; ſeitdem iſt ſie hin und wieder einzeln angeboten worden; doch blieb ſie immer noch ſelten; trotzdem ſteht ſie aber nicht zu hoch im Preiſe, denn man kauft den friſch eingeführten Vogel für 27, 30, 36 M. und ſprechende für 60 bis 100 M. Ueber ihre Sprachbegabung iſt nichts bekannt; beſondern Werth hat ſie wol nur für Liebhaber ſeltener Vögel.

Finſch' Amazonenpapagei [Psittacus Finschi, *Scl.*] — Grünwangen-Amazone, Blaukappen-Amazone, Finſch' Kurzflügelpapagei — Finsch' Amazon Parrot — Perroquet Amazone de Finsch' — Finsch' Amazone Papegaai — wurde bis vor kurzem immer mit dem vorigen verwechſelt, dann aber von Dr. Sclater beſchrieben und nach dem hochverdienten Papageienkundigen benannt. Er erſcheint in folgender Weiſe gefärbt: Stirnrand (zuweilen faſt bis zur Kopfmitte) und Zügel dunkelblutroth; am Oberkopf jede

Digitized by Google

dunkelgrasgrüne Feder mit lilablauem Endsaum; am Nacken jede Feder mit breitem schwarzen Endsaum, am Mantel undeutlicher; Wangen und Ohrgegend grasgrün; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth (Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne roth); Eckflügel und Flügelrand grün; Schwanzfedern ohne Roth; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün; ganze Unterseite kaum heller grün, jede Feder deutlich schwarz gesäumt; Schnabel gelblichhorngrau, Oberschnabel mit dunkelgelbem Fleck; Wachshaut grauweiß; Auge röthlichgelb; nackte Haut blaugrau; Füße und Krallen blaugrau. Besondere Kennzeichen: Ober- und Hinterkopf blau; Grundhälfte der ersten Schwingen schwarz; Unterseite mit deutlichen schwarzen Federsäumen. Etwas unter Krähengröße (Länge 32,5—34 cm; Flügel 20,4—23,4 cm; Schwanz 10—10,7 cm). Heimat: nur Mexiko. Ueber das Freileben ist bis jetzt garnichts bekannt. Hin und wieder kommt er einzeln in den Handel und auf die Ausstellungen. Preis 50, 60 bis 90 M.

Der gelbwangige Amazonenpapagei

[Psittacus autumnalis, *L.*].

Gelbwangige Amazone, Gelbwangen-Amazone, Herbst-Amazone, Herbst-Papagei, gelbwangiger Kurzflügelpapagei. — Yellow-cheeked Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à joues jaunes. — Geelwang Amazone Papegaai.

Die Herbstamazone, wie sie in der Liebhaberei gewöhnlich heißt, wurde, obwol schon lange bekannt, nämlich von Edwards (1750) abgebildet und beschrieben und von Linné benannt, doch bis zur neuesten Zeit von den Vogelkundigen gleicherweise wie von den Händlern fast immer mit der Diademamazone verwechselt oder zusammengeworfen, und dies geschieht nicht selten noch gegenwärtig. Sie ist an Stirnrand und Zügeln scharlachroth; Oberkopf grün, jede Feder mit lilablauem Endsaum (zuweilen kräftig blau scheinend); Wangen grasgrün; Wangen- oder Bartfleck hoch- bis rothgelb; Nackenfedern grasgrün, fein schwärzlich gesäumt; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth; (Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne roth); Flügelbug grün; nur die äußersten Schwanzfedern mit verwaschen rothem Fleck; ganze übrige Oberseite grasgrün; Unter-

Digitized by Google

seite gelbgrün (zuweilen mit schwärzlichen Federnrändern); Schnabel horngrau, Spitze und Unterschnabel schwarz; Wachshaut fleischfarbenweiß; Auge roth mit feinem gelben Irisrand; nackter Augenkreis weißlich; Füße weißlichgrau, Krallen schwärzlich. Etwa Krähengröße (Länge 36,5 cm; Flügel 18—20,2 cm; Schwanz 10—10,7 cm). An den besonderen Kennzeichen: rother Stirn und rothen Zügeln, mehr oder minder lebhaft blauem Oberkopf und hochgelbem Wangen- oder Bartfleck ist er von den Verwandten, vornehmlich der Diadem-Amazone, zu unterscheiden; zuweilen ist die Kehle roth gefleckt. Heimat: Mittelamerika, südliches Mexiko, Honduras und Guatemala; nach Dr. v. Frantzius auch Kostarika. Ueber das Freileben ist nichts bekannt. Die gelbwangige Amazone gelangte i. J. 1869 zuerst in den zoologischen Garten von London und kommt etwa seit 1878 auf den Ausstellungen und in den Vogelhandlungen bei uns hin und wieder vor. Die fünf Köpfe, welche die „Ornis"-Ausstellung v. J. 1879 von Herrn Karl und Fräulein Chr. Hagenbeck aufzuweisen hatte, ließen mit voller Entschiedenheit die Unterscheidungszeichen der beiden naheverwandten Arten erkennen. Hinsichtlich der Begabung und Abrichtungsfähigkeit darf man diese beiden Amazonen nur als Sprecher zweiten Rangs ansehen; sie stehen daher, obwol sie selten sind, doch nicht hoch im Preise: 45 bis 60 M. für den frisch eingeführten Vogel.

Der Diadem-Amazonenpapagei

[Psittacus diadematus, *Shw.*].

Diadem-Amazone, Amazone mit lilafarbnem Scheitel, lilascheiteliger Kurzflügelpapagei. — Diademed Amazon Parrot. — Perroquet Amazone à diadème, Perroquet Amazone couronné. — Kroonen Amazone Papegaai.

Schmaler Stirnrand und Zügel dunkelscharlachroth; Oberkopf und Nacken grün, jede Feder mit breitem blaßlilablauen Endsaum; Hinterkopf gelblich; Zügel, Wangen und Kopfseiten smaragdgrün; Spiegelfleck im Flügel scharlachroth (Schwingen zweiter

Digitized by Google

Ordnung an der Außenfahne roth); Flügelrand und -Decken grün; äußerste Schwanzfedern an der Außenfahne hochroth; ganze Oberseite grasgrün, ohne dunkele Federsäume; Unterseite heller grasgrün, gleichfalls ohne dunkele Federsäume; Schnabel gelb, Oberschnabel längs des Rands und der Spitze schwärzlich; Wachshaut weißgrau; Auge dunkelbraun bis schwarz mit großem nackten weißgrauen Kreis; Füße und Krallen schwärzlichgrau. Etwa Krähengröße (Länge 36,5 cm; Flügel 18—20,2 cm; Schwanz 10—10,7 cm). Besondere Kennzeichen: dunkelscharlachrother Stirnstreif und Zügel; lilablauer Oberkopf; Wangen und Kopfseiten smaragdgrün, nur mit einem gelben Fleck unterm Auge. Heimat: Gebiet des Amazonenstroms, Guiana, Kolumbia und Panama. Diese Art wurde von Spix (1825) beschrieben und auch abgebildet. In der Sammlung des Kaisers von Oesterreich in Schönbrunn befand sich schon i. J. 1845 eine Diadem-Amazone, in den zoologischen Garten von London gelangte sie i. J. 1871; auf den Berliner Ausstellungen ist sie seit dem Jahre 1876 immer in einzelnen Köpfen aufgetaucht. In allen Eigenthümlichkeiten wird sie zweifellos mit den vorigen übereinstimmen. Ihr Preis beträgt 36, 45 bis 60 M.

Dufresne's Amazonenpapagei

[Psittacus Dufresnei, *(Lvll.) Khl.*].

Granada-Amazone, Goldmasken-Amazone(!), Dufresne's Kurzflügelpapagei. — Dufresne's Amazon Parrot. — Perroquet Amazone de Dufresne. — Dufresne's Amazone Papegaai.

Gelber Zügel, blaue Wangen und rother Vorderkopf sind die besonderen Kennzeichen dieser Art. Sie ist grasgrün, an Hinterkopf und Nacken jede Feder mit schmalem schwärzlichen Endsaum; Vorderkopf scharlachroth; Zügel hochgelb; Wangen und Oberkehle himmelblau; an Rücken und Mantel jede grüne Feder schwärzlich gesäumt; Spiegelfleck im Flügel zinnoberroth (die ersten drei Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne roth); Flügelrand und -Decken grün; die fünf äußersten Schwanzfedern mit großem blutrothen Fleck; ganze Unterseite heller grün, ohne dunkele Federränder; Schnabel hell- bis

Digitized by Google

korallroth; Wachshaut röthlichweiß; Auge orangeroth, nackte Haut weiß; Füße gelblichgrau, Krallen horngrau. (Zuweilen ist der ganze Vorderkopf scharlachroth; nebst Zügel auch Schnabelgrund und Oberkehle gelb; nebst Wangen auch die Kehle blau). Etwa Krähengröße (Länge 36,5 cm; Flügel 18—20 cm; Schwanz 10—10,7 cm). Heimat: vom mittlern und nördlichen Brasilien bis Guiana und Neugranada.

Ueber das Freileben haben Schomburgk, Prinz Max von Wied, Natterer u. A. berichtet, ihre jedoch verhältnißmäßig kurzen Angaben bieten der Lebensweise der übrigen Amazonen gegenüber nichts Neues. Die Indianer nehmen die Jungen gern aus dem Nest, um sie aufzuziehen. In der Sammlung des Kaisers von Oesterreich in Schönbrunn befand sich eine Dufresne's Amazone bereits i. J. 1830; zu uns ist dieselbe in neuerer Zeit hin und wieder in den Handel gebracht, doch gehört sie immerhin zu den seltensten Arten. Inbetreff ihrer Begabung sind die Meinungen schon bei den Reisenden verschieden, denn während der Prinz behauptet, daß sie sehr gelehrig sei und leicht sprechen lerne, verneint dies Schomburgk. Herr Petermann sagt, er habe diesen besonders prächtigen Papagei in Brasilien vielfach und noch in der Provinz Santa Katharina als Brutvogel beobachtet. Sein Ruf sei wohlklingend und erschalle wie noat. An demselben könne man ihn sogleich von allen Verwandten unterscheiden. Die Brut enthalte bis zu drei Jungen. Nach der Nistzeit schweifen sie familienweise umher, sammeln sich aber niemals zu großen Scharen an. Seiner hervorragenden Sprachbegabung wegen sei er hochgeschätzt und werde schon dort mit 100 Milreis bezahlt. Preis bei uns 100 bis 150 M. für den noch fast rohen Vogel.

Der blauwangige Amazonenpapagei [Psittacus coeligenus, *Lwrnc.*] — Blauwangen-Amazone — Blue-cheeked Amazon Parrot —

Digitized by Google

Perroquet Amazone à joues bleues — Blauwwang Amazone Papegaai — erst i. J. 1880 von George R. Lawrence beschrieben, ist an Stirn und Kopfseiten matt gelblichorange; Wangen hell himmelblau; am Oberkopf grünlichhellgelb; Hinterkopf und Nacken schwärzlichdunkelgrün; Rücken und obere Schwanzdecken dunkelgrün; Spiegelfleck im Flügel orangeroth (Schwingen zweiter Ordnung mit orangerothem Fleck und tiefblauer Spitze); Flügelrand blaßgelb; die äußeren Schwanzfedern am Ende blaßgelb; ganze übrige Oberseite dunkelgrün; Kehle bläulichhellgrün; Brust und Unterleib gelblichgrün, jede Feder schmal schwärzlich gerandet; Oberschnabel hellhorngrau, jederseits mit röthlichem Fleck; Unterschnabel dunkelhorngrau; Auge ?; Füße schwärzlichgrau. Etwa Krähengröße (Länge 34 cm; Flügel 22,8 cm; Schwanz 13 cm). Von Gestalt gedrungen mit kräftigem Schnabel und gleichen Füßen. Heimat: Guiana. Beschreibung von Dr. Finsch nach einem Vogel, welcher von A. H. Alexander im Winter 1875/1876 in Neu-Jersey erlegt worden; ein zweiter befindet sich im zoologischen Garten in London. Diese Art zähle ich nur der Vollständigkeit halber mit; denn für die Liebhaberei hat sie bis jetzt noch keine Bedeutung.

* * *

Weit hinter den Angehörigen der beiden voraufgegangenen Geschlechter, Eigentliche und Amazonenpapageien, bleiben die jetzt folgenden **Langflügelpapageien** (Pionias, *Wgl.*) inhinsicht der Sprachfähigkeit, sowie der geistigen Begabung überhaupt zurück, während sie ihnen im Körperbau und allen Eigenthümlichkeiten, sowie auch in der Lebensweise, nahestehen. Sie lernen eigentlich nur plappern, nicht wirklich sprechen. In den Reihen der bisher bekannten nahezu 50 Arten haben wir erst 3 Sprecher vor uns; damit ist indessen keineswegs bewiesen, daß über kurz oder lang von den vielen übrigen nicht noch einige, vielleicht sogar die meisten, als sprachbegabt sich zeigen werden. Ich muß daher alle Forschungen und Erfahrungen, die wir inbetreff der Langflügel im allgemeinen vor uns haben, hier umsomehr eingehend mittheilen.

Als ihre besonderen Merkmale sind anzusehen: Schnabel kräftig, länger als hoch, etwas zusammengedrückt mit weit überhängender

Digitized by Google

Spitze, meistens deutlichem Ausschnitt, stark gekrümmter scharfkantiger First und deutlicher Längsrinne, Unterschnabel gleichhoch, mit breiter abgerundeter Dillenkante und schwach ausgebuchteten Schneiden; Zunge dick, fleischig, breit und abgestumpft; Nasenlöcher frei, rund; Wachshaut mit einzelnen Borsten besetzt oder sammtartig befiedert; Augenkreis nackt; Zügel befiedert; Flügel lang, spitz, mehr als doppelt so lang wie der Schwanz; letztrer breit, gerade, am Ende klammerförmig, seltener abgerundet; Füße stark, kurz, mit kräftigen sehr gekrümmten Krallen; Gefieder weich bis derb, aus breiten Federn, bei manchen Arten an Kopf und Hals schuppenförmig, Puderdaunen fehlen; Färbung vorwaltend grün, kein Spiegelfleck im Flügel; Gestalt kurz, dick, gedrungen; Star- bis nahezu Krähengröße.

Die Verbreitung der Langflügel ist eine weitere als die aller anderen Papageien, denn sie kommen in Asien, Afrika und Amerika vor. Bis jetzt sind die Nachrichten, welche wir über ihr Freileben haben, leider nur zu gering; wir wissen nur, daß sie vorzugsweise Baumvögel sind, außer der Brutzeit gesellig leben, in vielköpfigen Schwärmen an den Nutzgewächsen zuweilen großen Schaden anrichten, von allerlei Früchten und Sämereien sich ernähren und gleich allen übrigen in Baumhöhlen nisten.

Der Handel bringt eigentlich nur eine Art, den kleinen Mohrenkopf, regelmäßig und in größrer Anzahl, alle übrigen nur zufällig und einzeln. Die Langflügel, welche vorzugsweise doch nur als Schmuckvögel gelten können, haben liebevolle Pfleger und Beobachter an den Herren Regierungsrath v. Schlechtendal in Merseburg und Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram gefunden. Selbstverständlich habe auch ich eine beträchtliche Anzahl von ihnen im Lauf der Jahre gehalten. Sogleich nach der Einführung sind sie in der Regel recht hinfällig, sobald sie aber die Nachwehen schlechter Behandlung unterwegs überwunden haben, ergeben sie sich fast sämmtlich als kräftig und ausdauernd; doch scheinen sie nicht so alt wie andere Papageien zu werden, denn es sind in dieser Hinsicht keine Angaben gemacht. Die meisten zeigen sich als stille, wenig bewegliche Vögel, welche leicht zahm und zutraulich werden, zeitweise jedoch geradezu unausstehlich schreien; einige kleine Arten sind überaus sanfte und liebenswürdige Vögel, die auch niemals widerwärtige Töne erschallen lassen. Im ganzen dürfen sie als nicht besonders

Digitized by Google

beliebt gelten, weil sie fast alle unscheinbar gefärbt sind; manche Arten jedoch werden sowol ihrer Seltenheit als auch Schönheit und Anmuth wegen sehr hoch bezahlt. In ihrer Züchtung hat man bis jetzt noch keine Ergebnisse erreicht und dies ist recht zu bedauern, weil auch die Reisenden noch nirgends Gelegenheit gefunden, ihre naturgeschichtliche Entwicklung zu erkunden. Ihre Verpflegung ist einfach und kostenlos, denn sie fressen eigentlich nur Sämereien und etwas Früchte; man füttert sie mit Kanariensamen, Hafer, Sonnenblumenkernen und Hanf, doch muß man mit dem letztern, namentlich bei heißem Wetter, recht vorsichtig sein. Gutes süßes Obst, noch in Milch stehende Maiskolben und ein wenig Grünkraut, sowie frische Zweige zum Benagen sind nothwendig.

Der orangebäuchige Langflügelpapagei

[Psittacus senegalus, *L.*].

Mohrenkopf-Papagei, blos Mohrenkopf. — Senegal Parrot. — Perroquet du Sénégal, Perroquet à tête noire. — Senegal Langvleugel Papegaai.

Der hübsche Mohrenkopf, wie er fast ausschließlich genannt wird, gehört zu den gemeinsten Vögeln des Handels und gelangt alljährlich regelmäßig in beträchtlicher Anzahl zu uns. Auch zählt er zu den seit altersher bekannten Papageien, denn schon i. J. 1455 ist er von Aloysius Cada Mosto erwähnt und dann von Brisson (1760) beschrieben.

Das alte Männchen ist an Kopf, Wangen und Oberkehle bräunlichgrau bis schwärzlich; an Hinterrücken, Bürzel und oberen Schwanzdecken glänzend grasgrün; Schwingen olivengrünlichbraun; Flügeldecken grün mit bräunlicher Mitte; Achselfedern und kleine unterseitige Flügeldecken gelb; Schwanz und ganze übrige Oberseite hellgrasgrün; Kehle und Oberbrust grasgrün; übrige Unterseite gelb; Brust und Bauch orange- bis mennigroth; untere Schwanzdecken gelb; Schnabel dunkelhorngrau bis schwarzbraun; Wachshaut schwärzlich; Auge schwefelgelb bis dunkelbraun; nackter Augenkreis schwärzlichgrau bis schwarz; Füße schwarzbraun; Krallen schwarz. Weibchen: Kopf heller bräunlichgrau; Unterseite einfarbig gelb (ohne

Digitized by Google

orangeroth); untere Schwanzdecken gelblichgrün; sonst übereinstimmend. Kaum Dohlengröße (Länge 26—28 cm; Flügel 14,5—15,7 cm; Schwanz 5,7—6,7 cm). Als seine Heimat kennt man Westafrika und Senegambien, doch wahrscheinlich ist er auch bis tief im innern Afrika verbreitet. Ueber seine Lebensweise haben wir bisher erst geringe Nachrichten. Familienweise bis zu sechs Köpfen halten sie sich in den riesigen Affenbrotbäumen auf und verrathen sich bei jeder Annäherung durch gellendes Geschrei. Beim Auffliegen und Niedersetzen unbeholfen, schwirren sie pfeilschnell dahin. Die Brut ist noch nicht erforscht. Nach der Nistzeit schweifen sie umher und verursachen an Bananen, Reis, Mais u. a. zuweilen erheblichen Schaden.

Der Mohrenkopf hat vorzugsweise nur als Schmuckvogel für zoologische Gärten oder besondere Liebhaber Bedeutung; während die älteren Schriftsteller einstimmig behaupten, daß er keine Sprachbegabung habe, ist dies neuerdings in mehreren Fällen widerlegt, indem von sprechenden Mohrenköpfen berichtet worden. Derartige Schilderungen liegen außer von den beiden vorhin genannten Herren auch noch von Herrn A. E. Blaauw vor. Der alte Vogel dieser Art zeigt sich überaus wild und störrisch; mit gellendem Geschrei wirft er sich bei jeder Annäherung kopfüber von der Sitzstange herab, drückt sich dummscheu in eine Ecke und läßt ein sonderbares Knarren erschallen; der junge Vogel wird leicht zahm und sehr liebenswürdig. Ein solcher vermochte jede Thür zu öffnen, spielte gern und war außerordentlich drollig, auch sehr zutraulich und gutmüthig, ließ sich den Kopf krauen, sowie aus dem Käfige nehmen und liebkosen; er lernte jedoch nur einzelne Worte nachahmen, zugleich aber auch die Töne anderer Vögel. Herr Blaauw sagt, daß sein Mohrenkopf sehr hübsch französisch sprach, und zwar sehr deutlich und mit sanfter Stimme. „Sonderbar klingt es, wenn er die verschiedenen Worte und

Digitized by Google

Sätze in sein natürliches Gekreisch mischt und also gleichsam artikulirt schreit."

Unmittelbar nach der Einführung hat sich, wenigstens in der neuern Zeit, auch dieser sonst so kräftige und ausdauernde Papagei sehr hinfällig gezeigt; er erkankt dann insbesondre bei jedem Futterwechsel und, wie es scheint, ebenso durch zu reichliche Gabe von Hanfsamen. Man gebe ihm also anfangs nur Kanariensamen und Hafer und erst späterhin und allmälig Hanf- und Sonnenblumensamen. Immer muß er als Zugabe gute süße Frucht, jedoch nur wenig, bekommen. Den frisch eingeführten Mohrenkopf kauft man für 15 bis 24 M., den gezähmten für 20 bis 30 M.; den Preis für einen Sprecher vermag ich nicht anzugeben, da ein solcher bis jetzt noch immer als Seltenheit gelten muß, die im Vogelhandel wol kaum zu erlangen ist.

Der blauköpfige Langflügelpapagei

[Psittacus menstruus, *L.*].

Blaukopf, fälschlich blauköpfiger Portoriko-Papagei, Schwarzohrpapagei, schwarzgeöhrter Langflügelpapagei, Maitaka. — Maitaka Parrot, Red-vented Parrot, Blue-headed Parrot. — Perroquet à tête bleue. — Blauwkop Langvleugel Papegaai.

Diese Art, welche schon von Edwards i. J. 1764 gut abgebildet und von Linné beschrieben war, ist trotzdem immer wieder verwechselt worden, obwol man sie unter den Verwandten von vornherein daran erkennen kann, daß Kopf, Hals und Brust blau sind. Sie ist in folgender Weise gefärbt: breite Stirnbinde kornblumenblau; Oberkopf, Nacken und Hinterhals grün und blau geschuppt; Ohrfleck schwarz (aber auch hier jede Feder zart blau gesäumt); Oberrücken olivengrün; Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken reiner grün; alle Schwingen und Deckfedern grün; die mittleren Schwanzfedern grün, an der Spitze blau, die äußeren blau, am Grunde der Innenfahne roth; ganze

Digitized by Google

übrige Oberseite dunkelgrasgrün; an den Flügeldecken gelbbräunlicholivengrün; Wangen, Kopfseiten und Oberkehle blau; Oberbrust grünlichblau, röthlich scheinend; Unterbrust und Bauch olivengrün; untere Schwanzdecken dunkelpurpurroth, mit grüner Binde und blauem Endfleck; Schnabel schwarzbraun, am Grunde des Oberschnabels ein rother Fleck (im Alter auch am Unterschnabel); Wachshaut dunkelgrau; Auge grau- bis schwarzbraun; Augenring schiefergrau; Füße weißlichgrau mit schwarzen Schuppen und Krallen. Weibchen nicht mit Sicherheit bekannt. Jugendkleid fast einfarbig grün; Stirn und Oberkopf sonderbarerweise röthlich; Kehle und Oberbrust bläulich; Schnabel graugelb bis röthlichorange. Etwas unter Dohlengröße (Länge 27,3 cm; Flügel 16,2 — 18,3 cm; Schwanz 5,9 — 7,8 cm). Nach Finsch in allen Kleidern daran zu erkennen, daß der Bürzel und die oberen Schwanzdecken grün sind, die unteren Schwanzdecken grüne Enden und die beiden mittelsten Schwanzfedern blaue Enden haben.

Die Heimat dieses Langflügels ist Südamerika, von Südbrasilien bis Panama und in neuerer Zeit wurde er auch in Mittelamerika gefunden; nach Sclater sogar in Mexiko und auf der Insel Trinidad. In der Lebensweise dürfte er von den Amazonen nicht abweichen; die kurzen Angaben der Reisenden (Prinz von Wied, Natterer, Léotaud u. A.) sprechen nur vom regelmäßigen Hin- und Herfliegen, sagen, daß er in der Nistzeit parweise und nach derselben in großen lärmenden Schwärmen zu sehen sei, nahrungsuchend auch bis an die Seeküste komme; als Wildbret sei er wohlschmeckend und werde als solches in den Städten zu Markt gebracht. An den Maispflanzungen verursache er vielen Schaden. Herr Petermann berichtet, daß er ihn vielfach erlegt und Fleisch und Brühe sehr wohlschmeckend gefunden habe. Allerlei tropische Früchte und Beren, besonders die Schotenfrüchte der Inkabäume, einer Art Akazien, bilden seine Nahrung. Er werde außerordentlich zahm und anhänglich, zeige auch bedeutende Klugheit, trotzdem aber geringe Sprachbegabung.

Digitized by Google

Schlechtendal bezeichnet ihn als gutmüthigen, etwas plumpen Vogel, welcher leicht zahm werde, aber eine wenig angenehme Stimme habe. Frau von Prosceck in Wien hatte einen Maitaka-Papagei, der sprach, und einen ebensolchen besaß Herr Großhändler Fockelmann in Hamburg, welcher letztre zugleich hübsch pfeifen lernte. Herr Fiedler besaß mehrere, die fast den ganzen Tag häßliches Geschrei erschallen ließen; es waren jedoch wol bereits alte Vögel. Der junge Blaukopf, wie er im Handel meistens heißt, dürfte nach meiner Erfahrung immer ein ebenso liebenswürdiger Stubengenosse werden wie der Mohrenkopf und gleichfalls wie jener ein wenig, doch niemals bedeutend, plappern lernen. Der Preis für den immerhin seltnen Papagei ist verhältnißmäßig gering, denn man kauft das Pärchen mit 60 M. und einen einzelnen zahmen Sprecher mit 60 bis 75 M.

Der Kragen-Langflügelpapagei

[Psittacus accipitrinus, *L.*].

Kragen-Papagei, Hollen-Langflügelpapagei, Fächerpapagei (!). — Hawk-headed Parrot, Hawk-headed Caique, Hooded Parrot. — Perroquet à cravatte, Perroquet maillé. — Havikkop Langvleugel Papegaai.

Unter allen Papageien überhaupt steht der Kragen-Langflügel von vornherein als einer der schönsten und interessantesten zugleich da. Seine sonderbare Holle aus braun- und blaubunten Federn, die er in der Erregung so sträuben kann, daß sie einen Kreis um den Kopf bilden, gibt ihm ein absonderliches Aussehen. Er wurde schon von Clusius (1605) erwähnt und von Edwards abgebildet; Brisson (1754) konnte ihn nach einem lebenden Exemplar im Besitz der Marquise de Pompadour beschreiben; Linné hat ihn benannt. Natürlich ist über einen so auffallenden Vogel viel gefabelt worden.

Digitized by Google

Er ist in folgender Weise gefärbt und gezeichnet: Vorderkopf und Oberkopf weiß; Zügel, Ohrgegend, Kopfseiten und Oberkehle fahlbraun, jede Feder mit weißlichem Schaftfleck; an Hinterkopf und Nacken bis 4,4 cm lange, breite Federn, welche am Grunde fahlbraun und am Ende breit blau gerandet sind und den beweglichen Halskragen bilden; Hinterhals und ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, die ersten Schwingen und deren Deckfedern jedoch schwarz, nur mit grün gesäumter Außenfahne; ganze Unterseite braun, jede Feder breit blau gerandet; Schenkel und untere Schwanzdecken grasgrün, jede Feder schwärzlich gerandet; Schnabel schwarzbraun, Oberschnabel mit hellerer First; Auge braun bis grellgelb; nackter Augenkreis braun; Füße schwarzbraun, Krallen schwarz. Dieser Papagei ist, obgleich er in manchen Farbenschattirungen veränderlich erscheint, doch immer leicht zu erkennen und niemals mit einem andern zu verwechseln. Er gehört zu den stattlichsten aller Papageien und ist fast von Rabengröße (Länge 36,5 cm; Flügel 17,4—19,4 cm; Schwanz 12—14,4 cm). Seine Heimat ist der nördlichste Theil von Südamerika, und die Verbreitung dürfte sich über Nordbrasilien, Guiana und Surinam erstrecken. Die Reisenden Natterer, Schomburgk, Wallace u. A. haben über sein Freileben berichtet, jedoch leider nur zu kurz. In der Regel sieht man ihn nur parweise und höchst selten in größeren Scharen. Der Ruf im Fluge erklingt hiah! Als Aufenthalt liebt er lichte und niedere Waldungen. Der Brutverlauf dürfte von dem anderer Pagageien nicht abweichen; das Gelege sollen bis zu 4 Eier bilden. Weitere Nachrichten liegen bis jetzt nicht vor.

Burmeister meint, daß der Kragenpapagei weichlich sei und nur deshalb so selten nach Europa in den Handel gelange. Diese Behauptung ist indessen durch Beispiele widerlegt, in denen ein solcher sich überaus kräftig gezeigt und sich viele Jahre hindurch im Käfig vortrefflich erhalten hat. Herr Drechslermeister Wigandt in Danzig schildert einen, den er seit 11 Jahren besaß. Als prächtiger und absonderlicher

Digitized by Google

Schmuckvogel dient er vornehmlich zum Schaustück in den zoologischen Gärten und anderen Naturanstalten. Ein Kragenpapagei des Herrn Wiener in London, welchen ich eine Zeitlang beherbergte, erschien überaus zahm, gesittet und liebenswürdig, zeigte ein kluges, intelligentes Wesen und sprach einige englische Worte sehr deutlich und mit vollem Verständniß. Den Halskragen sträubte er mehr aus Freude und Vergnügen als im Zorn. Als ungemein ruhig, friedlich und sanft, nicht falsch und hinterlistig oder boshaft, wird er von Allen gerühmt, die ihn gehalten haben; so von den Herren Obergymnasialdirektor Scheuba, Wiener, Blaauw, Linden. Im ganzen Wesen bedächtig, spricht er langsam, pfeift laut und nicht unangenehm, doch nicht oft, schreit durchdringend und gellend, hört jedoch sogleich auf, wenn man mit ihm spricht. Herr Scheuba besaß einen, der den ganzen Tag plauderte, selten schrie und nach dessen Begabung und Abrichtungsfähigkeit der erfahrene Papageienpfleger und Kenner diese Art zu den am höchsten stehenden zählen möchte. Als Futter reicht man vorzugsweise Sämereien mit Zugabe von etwas Biskuit oder Eierbrot, süßem Obst und frischen Zweigen zum Benagen. Im Handel und auf den Ausstellungen kommt er immer nur vereinzelt vor; der Preis ist hoch: 120, 180 bis 200 M.

* * *

Die Edelpapageien [Eclectus, *Wgl.*] sind große, stattliche Vögel, welche sich den Amazonen sowol, als auch den Langflügelpapageien unmittelbar anreihen, während sie sich doch durch ganz besondere Merkmale von beiden unterscheiden lassen. Diese Kennzeichen sind folgende: Schnabel auffallend groß und kräftig, ziemlich dick und breit, am Grunde stark nach unten gebogen, seitlich und längs der First abgerundet, Spitze des Oberschnabels mäßig hervorragend, vor derselben ein schwacher Zahnausschnitt, Unterschnabel niedriger mit breiter Dillenkante, die Schneiden vor dem Ende tief

Digitized by Google

ausgebuchtet; Zunge dick, fleischig, mit abgestumpfter Spitze; Nasenlöcher klein und rund, nächst der Wachshaut meist in den Federn versteckt; Augenkreis befiedert; Flügel länger als der Schwanz; letztrer breit, fast gerade oder abgerundet; Füße stark und kurz; Krallen kräftig, gekrümmt; Gefieder derb und hart; Farbe grün oder dunkelroth; Gestalt gedrungen und kräftig; Rabengröße und darunter. Als ihre Heimat sind erst neuerdings Neuguinea, die Molukken und Philippinen festgestellt und ihre Verbreitung dürfte sich westlich bis Celebes, östlich bis zu den Salomonsinseln und Neuirland und nördlich den Philippinen erstrecken. Im allgemeinen ist anzunehmen, daß ihre Lebensweise mit der anderer großer Papageien übereinstimme; nur dürften sie im Freien ebenso wie im Käfig ruhiger, weniger beweglich, schwerfälliger und zugleich stiller als alle übrigen sich zeigen. Ihre Nahrung besteht, soweit bis jetzt bekannt, in Sämereien, Nüssen und anderen Stein-, sowie auch weichen süßen Früchten. Wo sie häufig sind, verursachen sie gleich den Verwandten zuweilen großen Schaden. Ihr Flug ist schwerfällig, aber weithin reißend schnell; auch im Klettern und Gehen auf der Erde erscheinen sie unbeholfen. Sie sollen im Walde mehr einzeln als scharenweise leben.

Dr. Finsch hat die Edelpapageien in zwei Gruppen geschieden, und zwar erstens grüne oder rothe Arten ohne Flügelzeichnung mit fast geradem Schwanz und von Federchen bedeckter Nasenhaut, und zweitens gelbgrüne Arten mit Flügelzeichnung, längerm abgerundeten Schwanz und nackter Nasenhaut. Wenn man diese Eintheilung nun auch beibehält, so muß doch die Trennung der ersten Gruppe in grüne und rothe Arten fortfallen, denn der Reisende Dr. A. B. Meyer, gegenwärtig Direktor des Naturhistorischen Museum in Dresden, machte vor kurzem die hochinteressante Entdeckung, daß zwei solcher verschieden gefärbten Vögel immer zusammen eine Art bilden, in welcher der Grüne das Männchen und der Rothe das Weibchen ist. Die Annahme, zu welcher Dr. Meyer dadurch gelangte, daß die vielen von ihm erlegten grünen Edelpapageien, sich bei der Untersuchung stets als Männchen und die rothen als Weibchen ergaben, wurde anfangs viel bestritten und sogar arg befehdet; doch ist sie nun einerseits durch die Züchtung des Herrn Dr. Frenzel in Freiberg und andrerseits dadurch, daß Dr. Finsch von Ort und Stelle aus berichtet hat, als Thatsache bestätigt.

Digitized by Google

Die Edelpapageien, insbesondre das Männchen Neuguinea-Edelpapagei, gehören zu den in der Gefangenschaft längst bekannten Vögeln; trotzdem werden sie fast sämmtlich nur einzeln eingeführt und die meisten sind überaus selten. Unmittelbar nach der Herüberkunft zeigen sie sich alle sehr hinfällig, und es bedarf großer Sorgfalt, um sie am Leben zu erhalten und einzugewöhnen; sobald sie aber die Gefahren der fremden Verhältnisse in den ersten Monaten überstanden haben, sind sie überaus kräftig und dauern unter günstigen Umständen viele Jahrzehnte aus. Ihre schon erwähnte geringe Beweglichkeit im Käfige würde die Schuld daran tragen, wenn sie nicht besonders beliebt wären; aber ihre auffallend schönen glänzenden Farben verleihen ihnen Werth als Schmuckvögel. An geistiger Begabung stehen sie hinter dem Graupapagei und den Amazonen entschieden zurück, doch dürften sie die Langflügel wol übertreffen; man hat Beispiele von sehr zahmen und liebenswürdigen Edelpapageien, wie auch von einzelnen hochbegabten Sprechern unter ihnen, während sie alle zusammen im Durchschnitt nur als Sprecher dritten bis höchstens zweiten Ranges gelten können.

Hinsichtlich der Verpflegung verursachen sie bedingungsweise Schwierigkeiten, denn bei der Einführung sind sie gewöhnlich nur an gesottnen Reis, Bananen u. a. weiche Früchte gewöhnt; man thut gut daran, sie baldigst, doch natürlich nur allmählich in der S. 20 beschriebnen Weise, an Kanariensamen, Hafer, etwas Hanf- und Sonnenblumensamen, auch rohen ungehülsten Reis und gute Frucht (am besten aber nur Kirsche, Birne oder Apfel), nebst Zugabe von etwas in Wasser aufgeweichtem Eierbrot oder auch trocknem Biskuit zu gewöhnen; Vogelbeeren werden ebenfalls gern genommen und sind sehr zuträglich. Zweige zum Benagen dürfen nicht fehlen und besonders lieben sie junge Fichtenschößlinge. Kann man Maiskolben frisch aus dem Garten, wenn möglich mit noch in Milch stehenden Körnern erlangen, so hat es mit der Eingewöhnung keine Noth. — Ihre Krankheiten sind die aller übrigen Papageien, nur leiden sie in der ersten Zeit bei jedem Luftzug oder Temperaturwechsel sogleich an Husten, Schnatzen, Ausfluß aus der Nase und also an Entzündung der Athmungswerkzeuge, welche jedoch bei zweckmäßiger Behandlung ohne Gefahr verläuft. Die Preise sind so verschieden, daß ich sie bei jeder einzelnen Art angeben muß.

Digitized by Google

Der Neuguinea-Edelpapagei

[Psittacus Linnéi, *Rss.*].

(P. polychlorus, *Scpl.* als Männchen, P. Linnéi, *Wgl.* als Weibchen).

Das Männchen wurde bisher Grünedelpapagei, großer grüner Edelpapagei und von den Händlern fälschlich Wachsschnabellori oder blos Wachsschnabel genannt. — Red-sided Eclectus or Red-sided green Lory. — Grand Perroquet vert ou Lori Perruche à flancs rouges. — Groote groene Edelpapegaai.

Das Weibchen heißt gewöhnlich Linné's Edelpapagei. — Linnean Eclectus or Linnean Lory. — Perroquet de Linné. — Linné's Edelpapegaai.

New-Guinea Parrot. — Perroquet de la Nouvelle Guinée. — New-Guinea Edelpapegaai.

Ein Par dieser großen, so außerordentlich von einander verschiedenen Papageien, welche beisammen sitzen und Zärtlichkeiten austauschen, gewährt einen absonderlichen Anblick, und Unkundige halten es regelmäßig von vornherein für unmöglich, daß zwei solche Vögel als Pärchen zusammengehören; auch die großen Händler wollen, nebenbei bemerkt, noch immer nicht recht daran glauben.

Das Männchen ist grasgrün, ober- und unterseits gleichmäßig; die ersten Schwingen und deren Deckfedern sind dunkelblau; Eckflügel, Bug und kleine Deckfedern längs des Unterarms hellblau; Achselfedern, unterseitige Flügeldecken und Fleck an den Brustseiten scharlachroth; die äußeren Schwanzfedern jederseits dunkelblau; alle Schwingen und Schwanzfedern unterseits mattschwarz, letztere am Ende fahlgelblich; Oberschnabel korallroth, Spitze wachsgelb, Unterschnabel schwarz; Auge schwarzbraun, mit sehr schmalem, graubraunen bis orangefarbnen Ring; Füße bleigrau mit schwarzen Schildchen und Krallen. Rabengröße (Länge 36 — 39 cm; Flügel 25,6 — 27 cm; Schwanz 12,6 — 14 cm). — Das Weibchen ist an Kopf, Hals und Brust hellscharlachroth; um das Auge ein schmaler blauer Ring; ein breites Querband über den Oberrücken dunkelultramarinblau; Schwingen erster Ordnung dunkelindigoblau, Innenfahne mattschwarz; die großen Deckfedern gleichfalls dunkelroth; Flügelrand, längs des Unterarms und kleine unterseitige Flügeldecken dunkelblau; Schwanz oberseits mit breitem hellrothen Ende, unterseits schwärzlich, am Ende fahlroth; ganze übrige Oberseite dunkelscharlachroth; Brustseiten und Bauch glänzend dunkelblau; untere Schwanzdecken

Digitized by Google

hellroth, fein gelb gerandet; Schnabel schwarz; Auge schwarzbraun, mit perlweißem Ring um die Iris; Füße grau mit schwarzen Schildern und Krallen. Größe kaum bemerkbar geringer (Länge 36—38 cm; Flügel 24—25,2 cm; Schwanz 11—11,6 cm). — Von der nächstfolgenden Art unterscheidet sich dieses Männchen durch helleres Grün und geringe blaue Zeichnung im Schwanz, das Weibchen durch den Ring von schön blauen Federchen ums Auge.

Als Heimat sind die Inseln der Neuguinea-Gruppe bekannt. Ueber das Freileben vermag ich nichts anzugeben. Die Eingeborenen sollen sie gleich anderen Papageien zahlreich aus den Nestern heben. Das Männchen wurde von Scopoli (1738) beschrieben und schon von Edwards gut abgebildet; das Weibchen ist von Müller (1776) erwähnt, aber erst von Wagler (1832) beschrieben. Die alten Schriftsteller waren in mancherlei Irrthümern inbetreff dieser Papageien befangen; so ließ man z. B. das grüne Männchen in China heimisch sein.

Seit Edwards' Zeit (1754) schon sind sie einzeln lebend herübergebracht. Das Männchen gehört längst zu den gemeinen Erscheinungen des Vogelhandels, während das Weibchen als Linné's Edelpapagei bis vor kurzem immer noch als Seltenheit gelten mußte. Nach der Eingewöhnung sind sie beide sehr ausdauernd und halten sich auch vortrefflich bei uns im Freien. Einzelne sind im Käfig überaus bösartig, zeigen trotzdem aber manchmal die wunderliche Eigenthümlichkeit, daß sie sich herausnehmen lassen und fast plötzlich völlig zahm werden. Es gehört freilich Muth dazu, solchen großen Papagei mit dem gewaltigen Schnabel ohne weitres an den Füßen zu packen; geschieht es aber, so scheint dies solchen Eindruck auf ihn zu machen, daß er jeden Widerstand aufgibt. Dr. Bodinus erzählt von einem grünen Edelpapagei, welcher vortrefflich gesprochen hat, und gleicherweise erachtet Herr Obergymnasialdirektor Scheuba einen solchen Vogel für ungemein gelehrig. Auch vom Weibchen kann ich sagen, daß es zahm und zutraulich

Digitized by Google

wird und einzelne Worte gut sprechen lernt. Als Sprecher gehalten, sind beide nicht arge Schreier, als Brutvögel dagegen machen sie, insbesondre frühmorgens, beträchtlichen Lärm; auch zeigen sich dann die Weibchen in hohem Grade bösartig. Preise: das grüne Männchen 50, 60, 66 bis 75 M.; das rothe Weibchen 60, 75, 90 bis 120 M. und sprechend 150 bis 200 M.

Der Halmahera-Edelpapagei

[Psittacus grandis, *Rss.*].

(P. polychlorus, *Scpl.* als Männchen, P. grandis, *Gml.* als Weibchen).
Das Männchen hat dieselben deutschen, englischen, französischen und holländischen Namen wie das der vorigen Art.
Das Weibchen heißt großer rother Edelpapagei, Rothedelpapagei und bei den Händlern Grandilori. — Grand Eclectus. — Grand Perroquet rouge, Grand Eclectus rouge. — Groote roode Edelpapegaai.
Halmahera Parrot. — Perroquet de Halmahèra. — Halmahera Edelpapegaai.

Es ist eine seltsame Erscheinung, daß das Männchen dieser Art sich als durchaus übereinstimmend mit dem der vorigen zeigt, sodaß beide durch kein sichres Merkmal von einander unterschieden werden können. Ich brauche das Männchen Halmahera-Edelpapagei daher nicht weiter zu beschreiben. Das Weibchen ist: an Kopf und Nacken scharlachroth; Querband über den Oberrücken ultramarinblau mit purpurviolettem Schein; Schwingen erster Ordnung, deren Deckfedern, der Flügelrand und kleine unterseitige Flügeldecken indigoblau; Schwanz scharlachroth, am Grunde schwärzlich, am Ende unter- und oberseits breit zitrongelb; ganze übrige Oberseite düsterscharlachroth; Brust und Bauch blauviolett; untere Schwanzdecken zitrongelb; Schnabel schwarz; Auge dunkelbraun; Iris hell- bis braungelb; Füße grau, mit schwarzen Schildern und Krallen. Größe genau die des vorigen (Länge 36—39 cm; Flügel 22,8—26,6 cm; Schwanz 11,3—12,6 cm). Unterscheidungszeichen: die verschiedne Schattirung des Roth, das breite gelbe Schwanzende und besonders die gelben unteren Schwanzdecken. Heimat: die Inseln der Halmahera-Gruppe. In allem übrigen dürfte diese Art der vorigen durchaus gleichen. Das Weibchen ist gleichfalls schon von Müller (1776) erwähnt, von Gmelin (1788) benannt und von Kuhl beschrieben. Das

Digitized by Google

rothe Weibchen von Halmahera ist etwas häufiger im Handel als das von Neuguinea, doch kommt es auch stets nur einzeln vor. Der Preis beträgt 50, 60 bis 75 M. und für den sprechenden bis zu 150 M.

Der Ceram-Edelpapagei

[Psittacus intermedius, *Rss.*].

(P. intermedius, *Bp.* als Männchen, P. cardinalis, *Bdd.* als Weibchen).
Das Männchen wurde bisher mittlerer grüner Edelpapagei und Mitteledelpapagei genannt, von den Händlern aber garnicht unterschieden.
Das Weibchen hieß mittlerer rother Edelpapagei und Kardinaledelpapagei. — Crimson-Lory, Blue-breasted Lory. — Lori d'Amboine.
Ceram Parrot. — Perroquet de Céram. — Ceram Edelpapegaai.

Auch das Männchen dieser Art ist denen der beiden vorigen überaus ähnlich, fast nahezu gleich, sodaß nach Dr. Meyer's Ansicht alle drei als eine Art zusammengefaßt werden könnten.

Das Männchen Ceram-Edelpapagei ist dunkelgrasgrün; die ersten Schwingen sind indigoblau, zweite Schwingen ebenso, doch an der Außenfahne grün; Flügelrand schmal himmelblau; unterseitige Flügeldecken und Achselfedern scharlachroth, die äußersten Schwanzfedern an der Außenfahne bläulich, am Ende schmal gelblich gerandet; Oberschnabel roth, Spitze gelblich, Unterschnabel schwarz; Auge schwarzbraun, Augapfel orangeroth; Füße aschgrau, mit schwärzlichen Schildchen und schwarzen Krallen. Unterscheidungsmerkmale: dunkleres Grün; sehr schmaler blauer Flügelrand, nur die drei äußersten Schwanzfedern an der Außenfahne bläulich. Größe kaum bemerkbar geringer als die der beiden vorigen (Länge 32—34 cm; Flügel 20,8—23,5 cm; Schwanz 11,6 —12,6 cm). Das Weibchen ist dunkelscharlachroth, an der Oberseite mehr kirschbraunroth; Band über den Oberrücken dunkelblau, violett scheinend; Flügelrand, kleine unterseitige Flügeldecken, Schwingen erster Ordnung und deren Deckfedern blau; Schwanz oberseits roth, unterseits orangegelb, Endsaum ober- und unterseits kräftig gelb; ganze Unterseite dunkelblau; untere Schwanzdecken orangeroth. Die letzteren sollen das Hauptunterscheidungszeichen sein. (Länge 32 cm; Flügel 20,8 — 22 cm; Schwanz 10 — 11,8 cm). Heimat: die Inseln der Ceram-Gruppe. Das Männchen wurde

Digitized by Google

erst von Bonaparte (1854) beschrieben; das Weibchen dagegen ist schon von Brisson beschrieben und von Boddaert benannt. In den Handel kommt das Männchen, wenn auch sehr selten; ich besaß ein solches, welches Herr Dr. Platen mitgebracht, mehrere Jahre hindurch. Das Weibchen erscheint auf dem Vogelmarkt kaum jemals. Erstres hat den Preis von 100, 120 bis 150 M.

Westerman's Edelpapagei [Psittacus Westermani, *Rss.*]. — (P. Westermani, Bp. als Männchen, P. Corneliae, Bp. als Weibchen). — Das Männchen wurde Westerman's Edelpapagei und das Weibchen Kornelia's Edelpapagei genannt. — Westerman's Eclectus or Westerman's Parrot — Perroquet de Westerman — Westerman's Edelpapegaai. — Beide Geschlechter sind bis jetzt aus der Freiheit nicht bekannt, sondern sie wurden von Bonaparte in den Jahren 1849 und 1850 nach lebenden Vögeln im zoologischen Garten von Amsterdam beschrieben und gelangten dann auch in den von London. Das Männchen ist grasgrün; Schwingen indigoblau, die zweiten an der Außenfahne grün, an der Spitze blau; Flügelrand himmelblau, unterseitige Flügeldecken roth; Achsel- und Seitenfedern aber grün; Schwanz grün mit schwärzlichblauem Schein; die äußersten Federn an der Außenfahne blau, alle am Ende breit gelb gesäumt und unterseits schwarz; Oberschnabel roth, Unterschnabel schwarz; Auge gelb; Füße und Krallen schwarz. Unterscheidungszeichen: bedeutend geringre Größe und nur die kleinen unterseitigen Flügeldecken roth. — Das Weibchen ist scharlachroth; Rücken, Flügel und Schwanz rothbraun; Schwingen an der Außenfahne und Flügelrand blau; kleine unterseitige Flügeldecken roth, mit Blau gemischt; Schwanz ganz, auch am Ende, einfarbig roth; untere Schwanzdecken roth; Iris blaßgelb mit schmalem rothen Rand; Füße dunkelbraun. Unterscheidungszeichen: fast einfarbig roth, nur Flügelrand und Außenfahne der Schwingen blau. Die Heimat wurde bisher noch nicht ermittelt, für die Liebhaberei hat die Art noch keine Bedeutung, und daher muß ich es bei dieser kurzen Beschreibung bewenden lassen.

Digitized by Google

Der schwarzschulterige Edelpapagei

[Psittacus megalorrhynchus, *Bdd.*].

Großschnabelpapagei, Schwarzschulter-Edelpapagei. — Great-billed Eclectus or Black-shouldered Parrot. — Perroquet à épaulettes noires. — Zwartschouder Edelpapegaai.

Die jetzt folgenden Arten sind von den vorhergegangenen auf den ersten Blick daran zu unterscheiden, daß ihre Flügeldeckfedern abweichend gefärbte Säume haben und der Flügel also nicht einfarbig ist, sondern eine eigenthümliche Zeichnung zeigt; die Schnäbel sind bedeutend größer und meistens einfarbig roth. Die hierher gehörenden Weibchen sind nicht wie die der vorigen Arten roth gefärbt, sondern dürften sich, soweit bis jetzt bekannt, von den Männchen nicht oder nur wenig unterscheiden.

Der schwarzschulterige Edelpapagei ist grasgrün; Mantelfedern verwaschen bläulich gesäumt; Unterrücken und Bürzel himmelblau; die Schwingen meerblau, Innenfahne schwärzlich gesäumt; Deckfedern der ersten und zweiten Schwingen meerblau, die letzten vier bis fünf grün, am Ende schwarz mit breitem orangegelben Saum an Innen- und Außenfahne, die übrigen großen Deckfedern schwarz, an Innen- und Außenfahne breit orangegelb gerandet; Flügelbug schwarz, kleine unterseitige Flügeldecken tief olivengelb; Schwanzfedern dunkelgrün, am Ende olivengelb, unterseits ganz olivengelb; ganze untre Körperseite olivengelblichgrün; Brust- und Bauchseiten mehr gelb; Schnabel zinnoberroth, Spitze weißlich; Auge dunkelbraun, nackter Augenkreis schwärzlichgrau; Füße gelbbraun mit schwarzen Schildchen und Krallen. Rabengröße (Länge 36—39 cm; Flügel 21,5—24,9 cm; Schwanz 12,8—15,7 cm). Heimat: Die östlichen Molukken, die ganze Verbreitung dürfte noch nicht sicher festgestellt sein. Er wurde schon von Brisson (1760), Buffon u. A. erwähnt und von Boddaert (1783) beschrieben. Die älteren Schriftsteller geben nichts über ihn an. Inbetreff seiner Lebensweise haben wir bis heute leider nur spärliche Nachrichten. Die Reisenden Dr. A. B. Meyer und dann v. Ro-

Digitized by Google

seuberg berichten, daß er sich einsam im Walde, fern von menschlichen Ansiedelungen, aufhalte und bei Annäherung laute Schreie erschallen lasse. Ernährung, Brut u. s. w. sind bis jetzt noch nicht erforscht. Im Handel erscheint er immer nur vereinzelt, die größte Anzahl und zwar 6 Köpfe auf einmal, brachte Herr Dr. Platen von Celebes mit. Uebrigens soll er gut sprechen lernen, doch liegt noch kein Bericht vor. Preis: 80, 100 und selbst 120 M. für den einzelnen.

Der grünschulterige Edelpapagei [Psittacus affinis, *Wllc.*] — Grünschulter-Edelpapagei — Green-shouldered Parrot — Perroquet à épaulettes vertes — Groenschouder Edelpapegaai — ist dem vorigen sehr ähnlich, aber in Folgendem verschieden: Schwingen grün, an der Schaftmitte wenig bläulich; nur die mittelsten Flügeldecken in der Mitte schwärzlich, an den übrigen Flügeldecken und Schultern keine schwarze Färbung. Heimat mehr der Westen (Amboina, Ceram, Buru). Näheres ist bis jetzt nicht bekannt. Es ist möglich, daß der Vogel garkeine selbständige Art bildet. Für die Liebhaberei hat er kein Interesse.

Der blauscheitelige Edelpapagei [Psittacus luçonensis, *L.*] — Blauscheitel-Edelpapagei — Blue-crowned Eclectus, Varied-winged Parrot — Perroquet couronné bleu ou Perroquet aux ailes chamarées — Blauwkop Edelpapegaai — ist an Vorderkopf und Kopfseiten grasgrün; Ober- und Hinterkopf meerblau; Schwingen grasgrün; Innenfahne schwarz; Deckfedern der zweiten Schwingen am Grunde grün, an der Endhälfte himmelblau, Außenfahne gelb gesäumt; die übrigen Deckfedern blau, grünlichorangebraun gesäumt mit dreieckigem Mittelfleck; Flügelbug und Unterarm schwarz; Achseln fast olivengelb; Schulterdecken grün mit blauem Endfleck; Eckflügel grün; kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün; Schwanzfedern dunkelgrasgrün, Innenfahne graugelb, unterseits dunkelolivengelb; ganze übrige Oberseite gelblicholivengrün, am lebhaftesten Hinterhals und Mantel, der übrige Rücken und Bürzel weniger gelblich; Schnabel dunkelkorallroth, Unterschnabel blasser, Spitze horngrauweiß; Auge schwarzbraun mit breitem rothgelben Streif um die Iris; Füße bräunlich-

Digitized by Google

horngrau; Krallen schwarz. Größe etwas geringer als die des schwarzschulterigen Edelpapagei (Länge 30 — 33 cm; Flügel 18 — 19,5 cm; Schwanz 12,5 — 13,5 cm). Unterscheidungszeichen: blauer Hinterkopf; schwarzer Flügelrand; Deckfedern der zweiten Schwingen mit blauen Enden; Hinterrücken und Bürzel bei manchen blau, bei anderen grün. Heimat: Philippinen, besonders Luzon. Er wurde bereits von Brisson beschrieben, doch ist bis zum heutigen Tage nichts näheres über ihn bekannt geworden. Obwol überaus selten, gelangt er doch hin und wieder einzeln lebend in den Handel; im zoologischen Garten von London befanden sich zwei Köpfe i. J. 1871 und 1875. Fräulein Hagenbeck hat ihn mehrmals und J. Abrahams in London i. J. 1882 in einem Kopf eingeführt. Inbetreff seiner Begabung, Verpflegung u. s. w. muß ich auf die bekannten Arten, den vorangegangnen schwarzschulterigen und den folgenden Müller's Edelpapagei verweisen; über diesen selbst ist bis jetzt noch garnichts angegeben. Der Preis steht der Seltenheit wegen überaus hoch: 100 M. und darüber.

Müller's Edelpapagei

[Psittacus Mülleri, *Tmm.*].

Neuerdings wunderlicherweise auch noch Weißschnabelpapagei benannt. — Müller's Parrot. — Perroquet de Müller. — Müller's Edelpapegaai. — Molenaar.

Unter den kleineren Edelpapageien ist dieser der bekannteste, da er, wenn auch keineswegs häufig und zahlreich, so doch zeitweise eingeführt wird und dann gewöhnlich lange Zeit in den Vogelhandlungen verbleibt, weil er sich nämlich keiner besonders großen Beliebtheit zu erfreuen hat. Er ist grasgrün; Kopf rein und lebhaft grün; Hinterhals und Mantel mehr gelblicholivengrün; Mittel-, Unterrücken und Bürzel meerblau; obere Schwanzdecken gelblichgrasgrün; Innenfahne der Schwingen schwärzlich, Außenfahne grün, fein gelb gesäumt; Deckfedern ebenso; kleine Deckfedern am Flügelbug und oberste Schulter-

Digitized by Google

decken breit blau gerandet; Schwanzfedern oberseits grasgrün, gelblich gesäumt, unterseits olivengrünlichgelb; ganze Unterseite olivengrünlichgelb; Schnabel korall- bis zinnoberroth; Auge blaßgelb bis braun; Füße graugelb; Krallen schwärzlich. Das Weibchen soll übereinstimmend sein und nur durch das dunkle Auge sich unterscheiden. Jugendkleid: am weißen Schnabel zu erkennen. Besondere Kennzeichen: lebhaft olivengrüngelbe Färbung an Hinterhals, Mantel und der ganzen Unterseite; der blaue Unterrücken und Bürzel und die kleinen blauen Flügeldecken am Unterarm; die schwarze Zeichnung an Flügelbug und oberen Flügeldecken fehlt. Heimat: Celebes, Shangir-Inseln, Sula-Inseln. Diese Art war schon lange Zeit ohne Heimatsangabe im Leydener Museum vorhanden, und erst i. J. 1828 erlangte Dr. S. Müller einen solchen Vogel auf Buton, wo er indessen, wie sich späterhin herausgestellt hat, freilebend garnicht vorkommt. Dann wurde er von Temminck i. J. 1844 beschrieben und benannt. Bis zur neuesten Zeit hinauf hat man zwei Spielarten unterschieden: den rothschnäbeligen und den weißschnäbeligen Müller's Edelpapagei; nach den Forschungen von Dr. Meyer, deren Ergebnissen auch Dr. Platen zustimmt, ist der weißschnäblige Vogel nur der jüngere. Ueber das Freileben haben die beiden letztgenannten, sowie Wallace und v. Rosenberg berichtet, jedoch leider nur zu kurze Angaben gemacht. Still und geräuschlos, möglichst immer im Waldesdunkel, in den Kronen der Bäume versteckt und selbst freisitzend in seiner Regungslosigkeit schwer zu entdecken, auch meistens nur einzeln oder parweise, hat er den Beobachtern bisher erst wenig Gelegenheit zur Erforschung gewährt. Sein Brutgeschäft ist daher ganz unbekannt; als Nester sollen Höhlungen in schroffen, unersteiglichen Klippen benutzt werden. Die in den Handel gelangenden Müller's Edelpapageien sind daher meistens alte Vögel. Dr. Platen und Frau hatten 20 Köpfe mitgebracht, leider aber fand der freilich unscheinbare Papagei keine besonders freundliche Aufnahme

Digitized by Google

bei unseren Züchtern, und es ist mir nicht bekannt geworden, ob meine damals gegebne Anregung zu Züchtungsversuchen irgendwo befolgt ist; Züchtungserfolge sind keinenfalls erreicht worden. Als Käfigvogel wird er hier und da, wenn auch selten, einzeln gehalten; träge sitzt er den ganzen Tag da und vermag also den Papageien-Liebhaber nicht besonders zu fesseln. Ueber den Grad seiner Befähigung als Sprecher liegen gleichfalls noch keine Mittheilungen vor, doch ist es ja möglich, daß er eine solche in bedeutendem Maße zu entwickeln vermag. Dagegen ist wenigstens ein Beispiel von großer Ausdauer vorhanden, denn ein Müller's Edelpapagei in Halberstadt erreichte das Alter von 85 Jahren. Sein Preis ist gering, denn er beträgt für den rohen Vogel nur 30, 45 bis 50 M., für den gezähmten 75 bis 100 M.

Der Zwergedelpapagei

[Psittacus incertus, *Shw.*].

Rothachseliger Zwergpapagei, blauköpfiger Zwergpapagei, Rothachsel. — Blue-headed Parrot, Blue-rumped Parrot. — Perroquet à tête bleue, Petit Perroquet de Malacca. — Dwerg Edelpapegaai.

In seiner äußern Erscheinung, im Körperbau und besonders Schnabel sowol als auch in seinem Wesen gleicht dieser kleine liebenswürdige Papagei den vorhergegangenen Edelpapageien und ich reihe ihn daher denselben an, obwol ihn Dr. Finsch zu den Zwergpapageien [Psittacula, *Khl.*] gestellt hatte. Frau Dr. Platen, welche ihn in großer Anzahl lebend vor sich gesehen, erklärt sich aus voller Ueberzeugung zustimmend und sagt, daß er namentlich Müller's Edelpapagei nahekomme.

Der Zwergedelpapagei ist in folgender Weise gefärbt: Altes Männchen: Stirn und Oberkopf hyazinthblau (fein grün quergestreift erscheinend); Zügel und Gegend neben dem Schnabel

Digitized by Google

graublau; Wangen reiner blau; Hinterhals und Nacken grünlichgraublau; Mantel und kleinste Schulterdecken schwärzlichgrau, jede Feder hellgrau gesäumt; Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken ultramarinblau; Schwingen an der Außenfahne grün, fein hellgelb gesäumt, Innenfahne schwärzlichgrau, breit hellgrau gesäumt und fein hellgelb gerandet; Deckfedern der ersten Schwingen blaugrün, die übrigen Deckfedern grün, an Innen- und Außenfahne hellgelbgrün gesäumt; Achsel und kleine Deckfedern am Unterarm dunkelblutroth; unterseitige Flügeldecken etwas heller scharlachroth; kleine Flügeldecken am Unterarm schwärzlichblau und gelbgrün gezeichnet; Flügelrand hellgelb und blaugrün geschuppt; Schwanzfedern grüngelb, am Ende blau und dunkler gesäumt, die beiden mittelsten einfarbig grün, alle unterseits hellgrünlichgelb; Kehle gelblichblaugrün; übrige Unterseite grünlichblaugrau; Schenkelgegend mit blauem Fleck; untere Schwanzdecken grünlichgelb, blau gespitzt; Oberschnabel korallroth, Unterschnabel schwärzlichhornbraun; Auge rothbraun; Wachshaut und schmaler nackter Augenkreis schwärzlichgrau; Füße braungrau. Weibchen: grasgrün; Kopf, Hals und Wangen kastanienrothbraun; Zügel heller; Fleck unterm Schnabel fast gelb, nur Bürzel und Deckfedern der ersten Schwingen blau; alle Deckfedern mit schmalen, gelben Säumen; kleine oberseitige Deckfedern am Unterarm purpurbraun; kleine unterseitige Flügeldecken scharlachroth; alles übrige, auch der Schnabel, wie beim Männchen. Etwa Drosselgröße (Länge 20,5—24 cm; Flügel 10,9—12,2 cm; Schwanz 4,4—4,6 cm). Heimat: Malakka, Sumatra, Borneo. Ueber das Freileben haben nur Herr und Frau Dr. Platen kurz berichtet. Im Stromgebiet des Sarawak sahen sie ihn in Flügen von 3 bis 8 Köpfen. Die Brutzeit soll in die Monate Februar bis Mai fallen, das Nest immer eine Höhlung in einem der höchsten, meistens abgestorbenen Bäume sein und das Gelege in zwei bis drei Eiern bestehen.

Er wird schon von Sonnerat (1782) erwähnt. Eine Beschreibung und Abbildung von einem Zwergedelpapagei, welchen Lady Read in London 9 Jahre im Käfige gehalten, gab Shaw bereits i. J. 1790. Bei den übrigen älteren Schriftstellern ist nichts über ihn zu finden. In den zoologischen

Digitized by Google

Garten von London gelangte je einer in den Jahren 1866 und 1867. Ich erhielt einen Vogel dieser Art von Herrn G. Alpi in Triest, der von seiner Liebenswürdigkeit förmlich schwärmte und ihn i. J. 1877 nach Berlin zur „Ornis"-Ausstellung sandte; dann schickte mir Herr Wiener in London einen gleichfalls zur Berliner Ausstellung, welcher später an Herrn Dr. Bodinus für den zoologischen Garten von Berlin geschenkt wurde.

Der liebliche kleine Papagei führt einen wunderlichen Tanz unter Flügelklappen und mit gespreiztem Schwanz auf, dabei läßt er zugleich ein singendes Geplauder mit einzelnen langgezogenen, gellenden Tönen hören. Er fraß nur Sämereien und ein wenig gekochten Reis. Frau Dr. Platen schildert sein Wesen in der Gefangenschaft in folgender Weise: „In seiner ganzen Haltung, im Benehmen u. a. gleicht er Müller's Edelpapagei. Es ist recht unterhaltend, die Ordnung und gleichsam vornehme Ruhe in einem mit Zwergedelpapageien besetzten Käfig zu beobachten. Jeder hat seinen bestimmten Platz, und bei der geringsten Bewegung zwingen ihn sofortige Schnabelhiebe der Nachbarn dazu, an seine Stelle zurückzukehren. So putzen sie sich das Gefieder mit Vermeidung jeder unliebsamen gegenseitigen Störung, und bisweilen lassen sie einen leisen, metallisch klingenden Ruf erschallen. Fleißig werden weiche Holztheile benagt, doch muß sich jeder mit seinem Zweige in seine Ecke zurückziehen, um die übrigen nicht zu stören. Einer nach dem andern steigt zum Futter herab, frißt und begibt sich auf seinen Platz zurück, ohne den Genossen zu nahe zu kommen. — Meine Eingewöhnungsversuche sind leider ohne Erfolg geblieben, und hierin dürfte auch die Ursache der spärlichen Einfuhr nach Europa begründet liegen; auch die Eingeborenen behaupten, daß sich diese Vögel niemals längre Zeit im Käfig erhalten lassen. Ich habe alles versucht, was mir zu Gebote

Digitized by Google

stand: Hanf, Mais, gekochten und rohen Reis, eingeweichten und trocknen Biskuit, gekochte Kartoffeln, Yams, gelbe Rüben, Zweige und Knospen verschiedener Pflanzen. Die Zwergedelpapageien nahmen nur gekochten Reis in geringer Menge und einige etwas Frucht. Mit Ausnahme eines einzigen, der an Augenentzündung schon früher zugrunde ging, starben alle im Verlauf von 6 bis 8 Wochen an der Auszehrung."

Wenn dieser Papagei im Handel nicht so äußerst selten wäre, so würde er ein willkommener Gast in der Vogelstube und auch als Sprecher beliebt sein. Nach Angabe von Motley soll er einige Worte nachplappern lernen. Die beiden erwähnten, welche ich vor mir hatte, ließen nichts hören; trotzdem zweifle ich keineswegs an seiner Sprachbefähigung, nur glaube ich nicht, daß dieselbe einen hohen Grad erreichen wird. Kürzlich ist er vom Großhändler J. Abrahams in London in einigen Köpfen eingeführt worden. Preis 45 bis 60 M. für den frisch eingeführten.

* * *

Die Kakadus gehören von vornherein zu den bekanntesten und in gewissem Sinne auch zu den beliebtesten unter allen Papageien. Die Seite 3 erwähnte Jugenderinnerung knüpft sich mehr an den Kakadu als an irgend einen andern fremdländischen Vogel. Kakadus und Araras sind es, welche seit den ältesten Zeiten nach Europa gebracht worden und bis zur Gegenwart her, mindestens beziehungsweise, vornehmlich als Vertreter der vielbewunderten Erzeugnisse tropischer Natur gelten dürfen. Die Papageiengruppe oder Unterfamilie, welche die Kakadus umfaßt, theilte Dr. Finsch in fünf Geschlechter und zwar: Eigentliche Kakadus (Plectólophus, *Vgrs.*), Langschwanzkakadus [Calypthorrhynchus, *Vrgs. et Hrsf.*], Ararakakadus [Microglossus, *Gffr.*], Zwergkakadus [Nasiterna, *Wgl.*] und Keilschwanzkakadus [Callipsittacus, *Lss.*]. Für den Rahmen dieses Werks kommen indessen nur vier Geschlechter inbetracht, während ich das fünfte, die Zwergkakadus, fortlassen muß, weil bis jetzt weder eine Art

Digitized by Google

dieser winzigen Vögel als Sprecher bekannt, noch lebend bei uns eingeführt ist.

Die Kakadus überhaupt zeigen folgende Merkmale. Zunächst unterscheiden sie sich von allen oder doch fast sämmtlichen übrigen Papageien dadurch, daß sie ohne Ausnahme eine Federhaube haben, welche bei den einzelnen Arten allerdings sehr verschiedenartig gestaltet erscheint. Sodann haben sie unter allen Papageien den kräftigsten Schnabel, sehr entwickelte Schwingen und einen kurzen geraden Schwanz (nur die Langschwanzkakadus machen in letztrer Hinsicht eine Ausnahme). Ihr Gefieder ist mehr als bei allen anderen Papageien einförmig, vorwaltend weiß oder schwarz gefärbt.

Sie sind in Australien und den Ländergebieten des indischen Archipels heimisch. Man findet sie viel mehr in lichten Wäldern, als im dichten Urwald. Als eigentliche Baumvögel klettern sie geschickt und fliegen auch gewandt, gehen aber auf der Erde unbeholfen. Sie zeigen die bei den Amazonen S. 127 geschilderte Regelmäßigkeit in allen Verrichtungen. Fast alle Arten leben gesellig, nur die größten einzeln oder pärchenweise; zuweilen sammeln sie sich in außerordentlich vielköpfigen Schwärmen an, die dann ein so furchtbares Geschrei erschallen lassen sollen, wie man es von irgendwelchen anderen Vögeln niemals hört. Als besondre Eigenthümlichkeit haben die Reisenden auch bei ihnen jene bei den Amazonen u. a. erwähnte Anhänglichkeit beobachtet, in welcher ein herabgeschoßner von seinen Genossen unter schrillen Klagetönen solange umflattert wird, bis der Jäger noch mehrere erlegt hat; erst dann flüchten die übrigen endlich davon. Ihre Nahrung besteht in Nuß- und Kern-, weniger in fleischigen Früchten, außerdem in allerlei Sämereien, Knollen und natürlich auch Mais und anderm Getreide. Gleich den übrigen Papageien nisten sie in Baumhöhlen, einige jedoch in Klippen- und Felsenhöhlen, und ihre Brutzeit fällt, dem dortigen Frühling entsprechend, in unsere Herbst- und Wintermonate. Bei den größeren Arten soll das Gelege nur in zwei bis drei, bei den kleineren in vier bis sechs Eiern bestehen. Nach der Nistzeit überfallen die Scharen die Nutzgewächse der Ansiedler und verursachen erklärlicherweise argen Schaden. Des letztern wegen werden sie natürlich überaus eifrig verfolgt, zugleich aber auch als wohlschmeckendes Wildbret und um ihrer Federn willen. Die Ansiedler erlegen sie mit Schießgewehren und die Eingeborenen mit dem Bumerang, einer Wurf- oder Schleuder-

Digitized by Google

waffe. Dadurch sind sie aus den bewohnten Gegenden schon meistens vertrieben und in die Wildniß zurückgedrängt.

Bereits Buffon lobt sie, indem er sagt, ihre Schönheit werde durch Anmuth und sanftes Benehmen erhöht, sie seien nicht allein keck, lustig und drollig, sondern auch behend und lebhaft, an Gelehrigkeit (Abrichtungsfähigkeit) scheinen sie alle anderen Papageien zu übertreffen, allein an Sprachbegabung bleiben sie weit hinter den meisten zurück. Auch andere Schriftsteller bis zu denen unserer Tage herab sprechen sich über die Kakadus in ähnlich günstiger Weise aus. Unbegrenzt ist ihre Neugierde, schreibt Lord Burton, ja man darf behaupten, daß sie auf den Menschen und sein Treiben mit dem höchsten Interesse, vermischt mit Erstaunen, vielleicht sogar mit einem Anflug von Verachtung, blicken. Herr Stadtrath Friedel sagt, der Kakadu sei ein denkender philosophischer Vogel wie kein andrer, der seiner scharf ausgeprägten Individualität wegen eine besondre rücksichtsvolle Behandlung verlange, leider aber werde diese ihm selten zutheil. In Thiergärten und Menagerien sei bei der großen Anzahl derartiger Vögel von vornherein nicht an eine solche zu denken, in den vornehmen Familien, wo man mit ihm und hauptsächlich mit ihrem Käfig der Eitelkeit und Prunksucht fröhne, bekümmre sich erstrecht Niemand um ihn; in beiden Fällen lohne der Kakadu solche Vernachlässigung mit mürrischem Wesen. In der Bürgerfamilie, wo er verhätschelt, aber ebensowenig verstanden werde, wachse er vermöge seiner großen Lebensklugheit der Umgebung, namentlich den weiblichen Mitgliedern, in überraschend kurzer Zeit völlig über den Kopf. Mit seinem betäubenden Geschrei, das jeden Widerstand niederschmettert, führe er dann eine Schreckensherrschaft über das ganze Haus. Solle er wirklich einmal gezüchtet werden, so wisse er durch schlaues Bitten und komische Zärtlichkeit jeden Zorn bald zu entwaffnen. Dem verständigen Liebhaber dagegen, der sich in seinen Charakter hineinzudenken vermöge und ihn wie einen verständigen Freund behandle, zeige er eine Tiefe und einen Reichthum der Thierseele, gegen welche der Hund, den man doch gewöhnlich in dieser Beziehung obenan stelle, bestimmt in den Schatten trete.

Einer der liebevollsten Beobachter und tüchtigsten Kenner der Kakadus ist Herr Kaufmann Ernst Dulitz in Berlin, dessen Schilderung ich hier im Auszuge anfügen will: „Wer die Gelegenheit hat, einen wirklich zahmen Kakadu in seiner Schönheit, seinem wechselvoll

Digitized by Google

anmuthigen und übermüthig lebhaften Wesen längre Zeit zu beobachten, wird sicherlich mit mir beklagen, daß dieser herrlichste aller Papageien verhältnißmäßig selten zum Stubengenossen erwählt wird. Die Ursache liegt in den Verhältnissen begründet, welche Seite 50 inbezug auf alle Papageien erörtert sind. Ein Kakadu, der für seinen Pfleger keine Zuneigung fassen, für sein liebebedürftiges Herz kein Entgegenkommen finden kann, zeigt sich als ein unwirscher mißtrauischer Vogel, mit dem sich, wenn in dem Verhältniß keine Aenderung eintritt, allerdings Niemand zu befreunden vermag; aber gerade in dieser Charaktereigenthümlichkeit dürfte seine hohe geistige Begabung zu erkennen sein. Eine Amazone, ein Graupapagei fügen sich in ein gleichgiltiges Verhältniß zwischen dem Besitzer und ihnen und dulden zeitweise Vertraulichkeiten nach seiner Laune, wenn sie dieselben auch nicht erwidern. Anders der Kakadu; er liebt seinen Herrn mit heißem leidenschaftlichen Herzen oder er lebt mit ihm auf Kriegsfuß. Nur ganz alte Vögel, die mehrmals ihren Besitzer gewechselt haben, machen hierin eine Ausnahme. Nachdem ich im Lauf der Jahre 15 Arten Kakadus besessen und verpflegt, darf ich die entschiedne Behauptung aufstellen, daß kein andrer von allen in den Handel gelangenden Papageien so hervorragende Eigenschaften besitzt, um einen Liebhaber, der mit Verständniß Vögel pflegt und beobachtet, zu befriedigen, als gerade ein Kakadu, gleichviel von welcher Art, vorausgesetzt jedoch, daß es ein bereits zahmer oder wenigstens leicht zähmbarer Vogel ist. Leider kommen solche aber keineswegs häufig, ja, wie es scheint, in letztrer Zeit immer seltner in den Handel. Vor 15 bis 20 Jahren konnte man einen der großen Kakadus wol kaum billiger als für 25 Thaler erwerben. Heutzutage, da ein Schiff zuweilen hundert Köpfe und darüber einführt und dadurch der Preis auf weniger als die Hälfte, zeitweise auf ein Viertel des frühern herabgesunken ist, kann man keinenfalls erwarten, daß ein solcher Kakadu stets seinem Besitzer Freude bereiten werde. Um zu dem gewünschten Ziel zu gelangen, gibt es keinen andern Weg als den, daß man sich an einen zuverlässigen Händler wende und von diesem einen Kakadu verlange, von welchem er mit Bestimmtheit weiß, daß er begabt und zähmbar ist; ein Irrthum kann kaum vorkommen, denn die erfahrenen Händler kennen jeden Vogel genau. Selbstverständlich darf man dann aber auch nicht um 15—20 Mark mehr geizen, da es sich ja um den Erwerb eines Vogels handelt,

Digitized by Google

welcher auf viele Jahre hinaus für den Besitzer eine Quelle von Vergnügen und Freude, entgegengesetztenfalls von Ärger und Verdruß, sein kann. Befolgt man diese Rathschläge, so wird es sicherlich nicht lange dauern, bis viele Vogelfreunde anstelle einer Amazone oder eines andern Sprechers den ungleich schönern und unendlich mehr liebreizenden Kakadu zum Stubengenossen erwählen."

Im Gegensatz dazu äußert sich Dr. Lazarus nicht besonders günstig über die Kakadus, indem er schreibt: „Ein Liebhaber, welcher Gelegenheit hatte, längre Zeit hindurch die eigentlichen Sprecher, namentlich Graupapageien und Amazonen zu halten und kennen zu lernen, dürfte schwerlich für ebensolange Zeit seine Liebe den Kakadus erhalten. Jeder Vogel aus den Reihen der letzteren wird durch den Mangel einer bedeutendern Sprachbegabung für die Dauer langweilig, während die größeren Arten, wie Molukken- und Inkakakadu, die allerdings ein interessantes fesselndes Wesen zeigen, durch ihr ohrenzerreißendes Geschrei, welches doch wahrscheinlich nur höchst selten einer von ihnen völlig ablegt, sich als Stubengenossen geradezu unerträglich machen. Trotz einzelner Stimmen, welche begeistert für die Kakadus als Stubenvögel sprechen, muß ich dieselben daher entschieden in große Parkanlagen, geräumige Vorhöfe und allenfalls Vorzimmer verweisen, wo sie durch ihr Geschrei weder die Nachbarn, noch den Besitzer arg belästigen können. Nach meiner Ueberzeugung werden die beiweitem meisten Liebhaber, welche die Gelegenheit hatten, die Kakadus kennen zu lernen, sich meiner Ansicht anschließen."

A. E. Brehm spricht auch beim Kakadu von hochbegabtem Geist und sagt, er verbinde verschiedene Worte in sinngebender Weise, wende ganze Sätze bei passender Gelegenheit an, und ein sehr hoher Verstand sei nicht zu verkennen.

Aus allen übrigen Schilderungen, so besonders denen der Herren Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram, A. E. Blaauw in Amsterdam und sodann aus meinen eigenen Erfahrungen ergibt sich, daß der Kakadu allerdings bedeutend höher als viele andere Papageien begabt ist, jedoch hinsichtlich der Sprachfähigkeit durchaus nicht in dem Maße wie der Graupapagei und die hervorragendsten Sprecher unter den Amazonen. Es gibt Kakadus, welche einzelne Worte und selbst Sätze recht gut sprechen lernen, allein sie bringen es auch nicht annähernd zu der Fertigkeit und dem umfangreichen Wortschatz wie jene. Abgesehen von seiner Schönheit, die besonders erhöht wird, wenn

Digitized by Google

der Vogel in der Erregung seine meist bunten Haubenfedern und auch eine Anzahl der übrigen Körperfedern sträubt, erscheint ein gesunder, sich in jeder Weise wohl und behaglich fühlender Kakadu als der lustigste Vogel, den man sich denken kann. Seine Lebhaftigkeit und Anmuth, mehr aber noch sein komisch-ausgelaßnes Gebahren spotten jeder Beschreibung; kopfnickend und unter den drolligsten Verbeugungen, den bunten Federbusch in wechselvollem Spiel klappend, spielt, turnt und klettert er, und mit überaus spaßhaftem Eifer ahmen die übrigen nach, was der einzelne vorbringt und zwar nicht allein die geschilderten Bewegungen, sondern auch die gelernten Worte und vor allem das Geschrei. Herr A. E. Blaauw schreibt übrigens, er habe die Erfahrung gemacht, je mehrere Kakadus beisammen gehalten werden, desto weniger lassen sie ihr Geschrei hören: „Diese gesellig lebenden Vögel lieben es, sich gegenseitig zu sehen; sie machen sich Verbeugungen, sträuben die Hauben, kurz, sie langweilen sich weniger, und Langeweile ist ein Hauptanreiz für das Kakadugeschrei." Bei liebevoller Behandlung wird er im Gegensatz zu vielen anderen Papageien überraschend bald zahm und zutraulich, aber es gibt auch einzelne, welche nicht allein wild und unbändig, sondern sogar äußerst boshaft sind; so kann ein Kakadu, der gegen seinen Herrn ungemein liebenswürdig ist, gegen Fremde bissig sein, ja, man hat sogar die üble Wahrnehmung gemacht, daß ein sonst guter, liebenswürdiger Vogel anscheinend ohne Veranlassung plötzlich boshaft und wüthend geworden. Seine Bisse können in solchem Fall recht gefährlich werden. Ferner hat man Beispiele, in denen gerade die Kakadus für Beleidigungen ein staunenswerth weit reichendes Gedächtniß gezeigt und eine Züchtigung oder auch nur Neckerei jahrelang nachgetragen und bei günstiger Gelegenheit sich für dieselbe gerächt haben.

Während die bedingungsweise wenigen Kakadus, welche früher lebend nach Europa eingeführt wurden, immer von den Eingeborenen aus den Nestern gehobene und aufgefütterte junge Vögel waren, haben sich in neuerer Zeit diese Verhältnisse anders gestaltet. Die Kakadus werden jetzt in größter Anzahl gleich den meisten übrigen tropischen Vögeln in Netzen gefangen und von Aufkäufern nach Europa ausgeführt. Alle Arten gelangen nun alljährlich in beträchtlicher Zahl in den Handel und die Preise sind bereits bedeutend herabgegangen. Vorzugsweise finden wir diese Prachtvögel freilich eigentlich nur als Schaustücke in den Thiergärten und anderen zoologischen

Digitized by Google

Anstalten; einer weitern allgemeinen Liebhaberei sind sie erst wenig zugänglich geworden und zwar liegt dies, abgesehen von den (S. 199) von Herrn Dulitz angegebenen Ursachen, auch noch darin, daß solch' großer Vogel einen Raum beansprucht, den man nicht in jeder Häuslichkeit für ihn übrig hat, sodann daß er eben als arger Schreier gilt, ferner daß er doch nicht zu den hervorragendsten Sprechern gehört und schließlich daß man den großen, noch wilden oder nicht gut gezognen Kakadu seiner gefährlichen Bisse wegen fürchtet. Man findet ihn daher im Privatbesitz fast nur in den Prunkkäfigen der Salons, Vorzimmer u. drgl. Trotzdem haben ja aber auch sie, wie die voraufgegangenen Schilderungen ergeben, ihre besonderen Liebhaber, welche sie mit großer Vorliebe halten, beobachten und studiren und sie mit wahrer Begeisterung als werthvolle Stubenvögel preisen.

Die Ernährung der Kakadus ist sehr einfach; man gibt zunächst Sämereien, Hanf, Kanariensamen, Hafer und Mais nebst etwas altbacknem trocknen Weißbrot, Biskuit oder Eierbrot und gutem Obst, vornehmlich Aepfel; gekochten Reis, der früher viel gefüttert wurde, vermeidet man besser. Ein eingewöhnter Kakadu, gleichviel von welcher Art, gehört zu den ausdauerndsten Vögeln und kann ohne Gefahr über Winter im ungeheizten Raum gehalten werden. Bei guter Pflege erreicht er auch ein staunenswerth hohes Alter. Bei seiner Beherbergung ist darauf zu achten, daß er vermittelst seines Schnabels, „welcher als Hammer, Zange und Schraubenzieher zugleich benutzt werden kann und vermöge seiner Klugheit und List und mit Hilfe seines Muthwillens in dem Oeffnen von Käfigthüren, dem Lösen von Fußketten u. s. w. Erstaunliches zu vollbringen vermag; „Fußketten und deren Schlösser, Ständer, Gitter, Futter- und Trinkgefäße, starke Bretterwände und selbst Blechbeschlag, alles fällt der Zerstörung anheim; sogar eine doppelt wirkende Schraube lernt er bald aufdrehen," sagt Fiedler. Man hat bereits mehrfach Züchtungsversuche angestellt, bis jetzt jedoch, ohne Erfolge zu erzielen.

Das Wort Kakadu ist nach Karl Hagenbeck's Angabe kein natürlicher Laut, sondern wird dem Vogel angelernt. Dr. A. B. Meyer sagt, es bedeute Zange oder Krebsschere und beziehe sich auf den Schnabel.

*

Die eigentlichen Kakadus [Plectólophus, *Vgrs.*] zeichnen sich durch folgende Merkmale besonders aus: Schnabel kräftig, seitlich

Digitized by Google

schwach gewölbt, Oberschnabel mit tiefer Ausbuchtung, stark nach innen gekrümmter Spitze, breiter, etwas gerundeter First und zuweilen schwacher Längsrinne, Unterschnabel meist niedriger mit bogig aufsteigender Dillenkante, Schneidenränder gerade, am Endtheil plötzlich in die Höhe gebogen; Dille mit gerundetem Ausschnitt; Nasenlöcher klein, rund, frei in schmaler Wachshaut, manchmal mit kurzen Borstenfederchen besetzt; Zunge dick, fleischig mit breiter stumpfer, gerundeter Spitze; Auge hervorstehend, sehr rund, ausdrucksvoll; Augenkreis nackt; Zügel befiedert; Flügel lang und spitz; Schwanz mittelmäßig, breit, gerade oder wenig zugerundet, zuweilen schwach ausgerandet; Gefieder seidenartig weich, jede Feder am Ende abgerundet, selten mit Puderdaunen; Haube aus den verlängerten Stirn- und Oberkopffedern gebildet, verschieden gestaltet, in der Erregung aufzurichten oder fächerartig auszubreiten; Füße stark und kräftig mit starken sichelförmigen Krallen; Färbung vorwaltend weiß mit farbigen Abzeichen, Gestalt gedrungen; Dohlen- bis Krähengröße. Zwei Arten unterscheiden sich durch einen sehr verlängerten Oberschnabel und werden Langschnabel- oder Nasenkakadus [Licmetis, *Wgl.*] genannt. Die hierhergehörenden Vögel sind im indoaustralischen Gebiet heimisch. Sie werden sämmtlich lebend eingeführt, sind als Stubengenossen mehr oder minder beliebt und bilden einen bedeutenden Handelsgegenstand. Ob sie mehr Sprachbegabung als die Verwandten haben, dürfte bis jetzt noch unentschieden sein. Ihre natürliche Stimme ist schrill und gellend.

Der kleine hellgelb gehäubte Kakadu

[Psittacus sulfúreus, *Gml.*].

Kleiner gelbgehäubter, kleiner Gelbhauben-, kleiner gelbbäckiger, kleiner gelbwangiger und Gelbwangenkakadu, Salonkakadu, gelbwangiger Kakatu mit gelber Haube. — Lesser Sulphur-crested Cockatoo, Small Cockatoo, Java Cockatoo. — Petit Cacatois à huppe jaune, Petit Cacatois blanc à huppe jaune. — Kleene Geelkuif Kakketoe.

Unter den seit den ältesten Zeiten her bekannten Papageien gehört dieser kleine gelbhäubige und gelbwangige Kakadu bis zur Gegenwart immerhin zu den beliebteren. Er wurde bereits von Brisson im Jahre 1760 beschrieben, von Seba

Digitized by Google

(1764) abgebildet und von Gmelin (1788) benannt; übrigens ist er schon von Aldrovandi und Geßner erwähnt worden. Er erscheint reinweiß mit langer zweizeiliger, nach hinten gerichteter und mit der Spitze nach vorn gekrümmter hochschwefelgelber Haube (die drei bis vier vordersten Federn weiß, die übrigen kräftig gelb, sodaß die Stirn weiß erscheint und das schöne Gelb erst in der Erregung sichtbar wird, wenn der Kakadu die Haube sträubt); großer runder Fleck an der Ohrgegend schwefel- bis orangegelb; Flügel und Schwanzfedern unterseits hellgelb; Schnabel schwarz; Nasenhaut weiß; Auge tief dunkelbraun; nackte Haut ums Auge bläulichweiß; Füße schwärzlichgrau, Krallen schwarz. Das Weibchen ist übereinstimmend, hat aber nach Dr. Platen eine hellrothbraune Iris. Etwas unter Krähengröße (Länge 28—32 cm; Flügel 20,4 — 24,5 cm; Schwanz 9,4 — 10,5 cm); er zählt zu den kleinsten Kakadus. Seine Heimat erstreckt sich über Celebes, Buton, Lombock, Timor, Flores, Sumbawa und die Inseln in der Tominibucht. Die Reisenden Wallace, Meyer und neuerdings Platen haben ihn in der Freiheit beobachtet und geben über seine Lebensweise eigentlich nur das in der Einleitung im allgemeinen gesagte an. S. Müller und von Martens fanden ihn, wie ja auch die erstgenannten, bei den Eingeborenen in der Gefangenschaft und zwar überaus zahlreich, vielfach auf Stöcken oder Krücken und mit einem doppelten Ringe von Büffelhorn an einem Bein befestigt.

Schon Buffon schildert sein drolliges Benehmen, lebhaftes und ausdrucksvolles Kopfnicken und Auf- und Zuklappen der Haube, lobt ihn als sanft und gelehrig und ungemein zärtlich gegen seine Herrin; er sei auch äußerst reinlich und in seinem weißen Gefieder daher sehr schön. Herr A. Röse erzählt von einem, welcher, ‚guter, guter Karl' sprach, tanzte und beim Abschied unter zierlichen Knixen ‚Gott mit Euch' rief. Jeder Kakadu dieser Art ohne Ausnahme wird leicht und rasch zahm, ist überaus zutraulich und niemals falsch und bissig; auch gehört er zu den kräftigsten und ausdauerndsten Stubenvögeln.

Digitized by Google

Seine Sprachbegabung geht indessen nur soweit, daß man einige Worte von ihm erwarten darf. Der Preis beträgt zwischen 15, 20, 25, 30, 45, 48—60 M., gelangt jedoch nur selten zur Höhe der zuletzt angegebnen Summe.

Buffon's gelbgehäubter Kakadu [Psittacus Buffoni, *Fnsch.*] — Buffon's Kakatu — Buffon's Cockatoo — Cacatois de Buffon — Buffon's Kakketoe — ist ebenfalls weiß; Wangen reinweiß oder schwach gelblich; Haubenfedern schwefelgelb; Schwingen und Schwanzfedern an der Grundhälfte schwach schwefelgelb. Er gleicht also dem vorigen fast völlig und unterscheidet sich eigentlich nur dadurch, daß der gelbe Wangenfleck garnicht oder nur schwach vorhanden, der Schnabel kleiner und dünner und die Körpergröße etwas geringer sein soll. Heimat: Timor und Samoa. Für die Liebhaberei ist er bedeutungslos.

Der kleine dunkelgelb gehäubte Kakadu [Psittacus citrinocristatus, *Frs.*] — kleiner orangehäubiger Kakadu — orangegehäubter Kakatu, Goldwangenkakadu (!) — Citron-crested Cockatoo — Cacatois à huppe orangée — Oranjekuif Kakketoe — ist weiß mit kräftig zitrongelben Haubenfedern (die vordersten sind jedoch wie bei den vorigen weiß, sodaß bei zugeklappter Haube das Gelb nicht zu sehen ist); Wangenfleck zitrongelb, doch bemerkbar heller; Schwingen und Schwanzfedern hellgelb; ganze Unterseite kräftig gelb angehaucht, Bauch sogar lebhaft weißgelb; Schnabel schwarz; Wachshaut weiß; Auge dunkel, braun bis schwarz; Augenkreis weiß; Füße grauschwarz, Schildchen und Krallen schwarz. Etwas unter Krähengröße. (Länge 28—32 cm; Flügel 20,4 — 26,5 cm; Schwanz 9,4 — 10,5 cm). Heimat: Timorlaut und die Tenimberinseln. Er wurde von Fraser im Jahre 1844 beschrieben, und bis zum heutigen Tage liegen weder über sein Freileben, noch über sein Benehmen in der Gefangenschaft eingehende Mittheilungen vor; Lazarus hatte nur beiläufig die kurze Bemerkung gemacht, daß er nicht so sehr wie die großen Arten schreie. Linden gibt an, daß der seinige alle Bewegungen eines großen gelbhäubigen Kakadu nachahmte. Gleich dem kleinen hellgelb gehäubten Kakadu wird

Digitized by Google

er in der Regel von Celebes aus eingeführt, doch ist er viel seltner und daher auch etwas theurer: 45, 48, 50—75 M. für den Kopf.

Der große gelbgehäubte Kakadu

[Psittacus galeritus, *Lth.*].

Großer gelbhäubiger Kakadu; großer Gelbhauben-Kakadu; großer weißer Kakatu mit gelber Haube. — Great Yellow-crested Cockatoo, Greater Sulphur-crested Cockatoo, Great White Cockatoo. — Grand Cacatois à huppe jaune, Grand Cacatois blanc à huppe jaune, Cacatois à crête jaune. — Reus Geelkuif Kakketoe of Groote Geelkuif Kakketoe.

Dieser stattliche Kakadu gehört zu den auf Cook's Reisen gesammelten Vögeln, welche von Latham (1790) beschrieben und benannt worden. Die alten Schriftsteller geben nichts bemerkenswerthes über ihn an, doch ist er bereits sehr früh lebend eingeführt worden.

Auch er erscheint gleich den vorigen am ganzen Körper weiß; Stirnfedern, Vorderkopf und erste Haubenfedern reinweiß, die übrigen langen, stark nach hinten und oben gekrümmten, fein zerschlissenen Haubenfedern schwefelgelb; Wangenfleck gelblichweiß; Schwingen und Schwanzfedern unterseits hellgelb; Schnabel schwarz, Wachshaut weiß; Auge schwarz, dunkelbraun bis rothbraun; schmaler nackter Augenkreis weiß; Füße schwarzgrau mit schwarzen Schildchen und Krallen. (Das Gefieder hat zuweilen an Brust und Unterkörper einen gelblichen, noch seltner einen roströtlichen Ton). Starke Krähengröße (Länge 42 — 45 cm; Flügel 32,5 — 36 cm; Schwanz 16,6 — 17,2 cm). Heimat: Australien, doch nicht der Westen, dagegen Vandiemensland. Ueber das Freileben ist im allgemeinen das bekannt, was ich in der Einleitung über alle Kakadus gesagt. Auch das inbetreff der Verfolgungen, welche die Kakadus zu erleiden haben, berichtete, gilt für ihn. Er ist durch dieselben vorzugsweise scheu und mißtrauisch geworden, während er von Natur gerade ein harmloser und zu-

Digitized by Google

traulicher Vogel war. Sein Nest steht meistens in einem Gummibaum, und nur zwei Eier sollen das Gelege bilden.

Im Vogelhandel gehört er zu den gemeinen Erscheinungen, doch ist er nicht so häufig, wie der kleine gelbhäubige Kakadu. Bei angemeßner Verpflegung (siehe Einleitung Seite 202) zeigt er sich sehr kräftig und ausdauernd, erreicht im Käfig ein hohes Alter, lernt tanzen u. a. Künste, jedoch nur wenige Worte sprechen, aber wie ein Mensch lachen. Der Umgang mit ihm erfordert besondre Vorsicht, weil mancher große gelbhäubige Kakadu vornehmlich bösartig ist; selbst ein sonst gutartiger zeigt sich meistens gegen Fremde bissig. Herr Dulitz schildert ein Weibchen in seinem Besitz als anmuthig, liebenswürdig und klug. „Im Stehlen und Naschen übertrifft er jede Katze und gar zu gern treibt er allerlei Possen und Schabernack, zieht meiner Frau die Nadeln aus dem Strickzeug u. s. w. Anfangs sprach er nur seinen Namen, dann lernte er: ‚Wo ist denn meine Martha?‘ aber nichts weiter.“ Als Geschlechtsunterschiede vermag Herr D. mit Bestimmtheit nur anzugeben, daß das Männchen einen zweisilbigen Schrei erschallen läßt, das Weibchen einen einsilbigen, welcher letztre zugleich weniger barsch klingt. Preis: 15, 20, 30—75 und sogar 100 M. für den Kopf.

Der Triton-Kakadu [Psittacus Triton, *Tmm.*] — großschnäbeliger Kakatu mit gelber Haube oder blos Triton — Triton-Cockatoo — Cacatois Triton — Triton Kakketoe — wurde bisher mit dem vorigen fast immer als übereinstimmend angesehen. Er ist ihm auch in allem gleich, die Wangen sind jedoch fast garnicht gelb, der große nackte Augenkreis ist blau, der Schnabel weit kräftiger und mehr gekrümmt, und an diesen Merkzeichen, sowie an der etwas geringern Körpergröße wird er seitens der Händler und auch Liebhaber mit Leichtigkeit unterschieden. (Länge 30—34 cm; Flügel 24,9 — 30,8 cm; Schwanz 13,2 — 15,7 cm). Heimat: Neu-

Digitized by Google

guinea, die Papu-, Aru- und Keiinseln. Diese Art wurde von Temminck erst i. J. 1849 beschrieben und benannt, und über ihr Freileben liegen nur einige Angaben von Dr. A. B. Meyer vor. Trotzdem sie in der Heimat außerordentlich zahlreich ist, wird sie doch nur selten und einzeln eingeführt und hat dementsprechend einen hohen Preis, 60—90 M. für den rohen und 100—150 M. für den sprechenden Tritonkakadu.

Der große weißgehäubte Kakadu

[Psittacus leucólophus, *Lss.*].

Weißgehäubter oder weißhäubiger Kakadu, großer weißer Kakadu mit weißer Haube, Weißhauben-Kakadu, weißgehäubter Kakatu. — Greater White-crested Cockatoo. — Grand Cacatois à huppe blanche. — Witkuif Kakketoe.

Wiederum haben wir hier eine Art vor uns, welche seit ältester Zeit her bekannt, vielfach beschrieben und auch gut abgebildet worden und inbetreff derer doch bis zur Gegenwart vielfache Irrthümer herrschen, während über ihre Lebensweise noch keine Mittheilungen vorliegen. Schon in Aldrovandi's Werk finden wir das Bild des großen weißgehäubten Kakadu, freilich mit hühnerartig aufrechtstehendem Schwanz; dann spricht Pigafetta von ihm, Brisson und Latham beschreiben ihn bereits vortrefflich und Bechstein schildert ihn, wenn auch kurz, als Stubenvogel. Da man verständigerweise nichtssagende oder widersinnige wissenschaftliche Namen fallen lassen und in solchem Fall auf einen neuern zurückgreifen muß, so hat man erst die obige lateinische Bezeichnung von Lesson (1831) für ihn festgehalten.

Er ist reinweiß, mit langer, gerader, breiter, nach hinten liegender weißer Haube, ohne jede gelbe Färbung; Schwingen und Schwanzfedern unterseits hellgelb; Schnabel schwarz; Wachshaut weiß befiedert; Auge schwarz, dunkelbraun bis hochroth; breiter nackter Augenkreis bläulichweiß; Füße blaugrau mit schwarzen

Digitized by Google

Schildern und Krallen. Fast Rabengröße, doch manchmal viel kleiner. (Länge 30 — 36 cm; Flügel 25,2 — 28,5 cm; Schwanz 12,4 — 16,4 cm). Seine Verbreitung scheint eine sehr weite zu sein, sie erstreckt sich über die östlichen Molukken, doch ist sie noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt. Der weißhäubige Kakadu soll etwas besser als die anderen sprechen lernen. Lord Buxton (der Mischlinge von ihm und dem Leadbeater-Kakadu freifliegend im Park züchtete) meint, er sei der begabteste, mindestens klügste unter allen; insbesondre entwickelte ein solcher Vogel eine staunenswerthe Kunstfertigkeit im Oeffnen von jeglichem Verschluß an Käfigthür oder Fußkette. Herr A. E. Blaauw sagt jedoch, daß er der furchtbarste Schreier unter allen sei und einen wahren Höllenlärm verursachen könne. Wie schon gesagt traut man ihm mehr Sprachbegabung als den Verwandten zu und da er zugleich seltner als jene im Handel vorkommt, so steht er auch etwas höher im Preise: 36, 40, 45, 50, 60—75 M. für den Kopf.

Der große weiße Kakadu mit gelber hängender Haube

[Psittacus ophthalmicus, *Scl.*].

Brillenkakadu, Salomon-Kakadu, Kakadu mit blauem Augenkreis, blauäugiger Kakadu, Nacktaugen-Kakadu, Kakatu mit gelber hängender Haube. — Blue-eyed Cockatoo. — Cacatois ophthalmique, Cacatois à yeux bleus, Cacatois à lunettes. — Blauwoog Kakketoe.

Erst seit dem Jahr 1862 überhaupt bekannt, indem er lebend in den zoologischen Garten von London gelangte, wurde er von Dr. Sclater in den »Proceedings of the Zoological Society of London« beschrieben und abgebildet. Er ist weiß; Stirnfedern weiß und die dann folgenden langen, zerschlissenen und nach hinten hängenden Haubenfedern hellgelb; Schwingen unterseits an der Innenfahne und Schwanzfedern unterseits an der Grundhälfte gelb; Schnabel schwarz, Wachshaut grau; Auge dunkelbraun, großer nackter Augenkreis blau; Füße grau, Schildchen und Krallen schwarz. Nahezu Rabengröße (Länge 31 — 35,5 cm; Flügel 25,6 — 27,3 cm; Schwanz

Digitized by Google

13 — 15,7 cm). Heimat: Salomonsinseln, Neuirland und Neubritannien; in der letztern Gegend soll er nach Layard's Angabe überaus gemein sein, viel erlegt werden und eine schmackhafte Suppe liefern, auch zahlreich von den Eingeborenen gezähmt werden. Ueber seine Lebensweise ist jedoch noch nichts bekannt. Im Handel und auf den Ausstellungen ist er noch immer sehr selten; deshalb, sowie seines hübschen Aussehens wegen und weil man ihn für einen vorzugsweise begabten Sprecher hält, hat er einen hohen Preis, 100, 120, 150 bis 200 M. für den Kopf.

Der rothgehäubte Kakadu

[Psittacus moluccensis, *Gml.*].

Molukken-Kakadu, rothhäubiger Kakadu, Rothhauben-Kakadu, rothgehäubter Kakatu. — Rose-crested Cockatoo, Red-crested Cockatoo. — Cacatois à huppe rouge. — Roodkuif Kakketoe.

Der stattliche Kakadu, welchen Edwards (1751) beschrieben und zuerst abgebildet und Gmelin (1788) wissenschaftlich benannt hat, ist von den älteren Autoren gleicherweise wie viele andere Vögel häufig verwechselt oder mit anderen zusammengeworfen worden.

An Stirn, Kopf- und Halsseiten ist er reinweiß, die vorderen Haubenfedern weiß, die nächsten an der Außenfahne mennigroth, Innenfahne und Spitze weiß, die übrigen an der Außenfahne dunkel, an der Innenfahne hellmennigroth; ganze übrige Ober- und Unterseite weiß, rosenroth angehaucht und im hellen Licht gelblich scheinend; Schwingen an der Unterseite hellgelb; Schwanzfedern an der Unterseite hellorangegelb; Unter- und Hinterleib rosenroth; Schnabel schwarz, Wachshaut dunkelbläulichgrau; Auge schwarz bis dunkelbraun; Augenkreis bläulichweiß; Füße bläulichschwarzgrau, Schildchen und Krallen schwarz. Fast Rabengröße, erscheint des dichten, oft gesträubten Gefieders wegen größer als er in Wirklichkeit ist. (Länge 39,5 — 43,4 cm; Flügel 29,9 — 33,8 cm; Schwanz 17 — 17,4 cm). Er hat die Eigenthümlichkeit, daß er nicht die Tolle allein, sondern auch die langen Bartfedern zu sträuben vermag.

Digitized by Google

Heimat: Süd- und Westaustralien. Ueber seine Lebensweise liegen nur geringe Nachrichten vor. Das Gelege soll in vier Eiern bestehen. Die nach der Nistzeit sich ansammelnden Scharen richten namentlich an den Kokusbäumen argen Schaden an. Durch die Verfolgungen ist dieser Kakadu wie seine Verwandten sehr scheu und vorsichtig geworden. Er wird häufig aus dem Nest geraubt und aufgezogen.

Bei guter Behandlung erreicht er ein sehr hohes Alter, und ich selbst habe einen gekannt, welcher nahezu 100 Jahre alt geworden. Im allgemeinen gilt er als vorzugsweise liebenswürdig, klug und ebenso sprachbegabt. Herr Fiedler sagt, er sei sanfter und schreie auch nicht oder doch nicht so schrill wie die übrigen; seinem Herrn folge er auf Schritt und Tritt und verdiene sowol um seiner Anmuth als seiner Schönheit willen geschätzt zu werden. Dr. Lazarus dagegen machte die Erfahrung, daß ein solcher Kakadu schlimmer schrie als alle übrigen, denn man konnte sein Geschrei viele hundert Schritt weit hören; er gewährte dann, namentlich wenn er frei im Bügel eines Papageienständers hing, mit hochaufgerichteter feuerfarbner Haube und gesträubten pfirsichfarbenen Bart-, Hals- und Nackenfedern, ausgebreiteten Flügeln und Schwanz einen prachtvollen Anblick, aber das ohrenzerreißende Gekreisch war nicht zu ertragen. Ein andrer schrie weniger stark und anhaltend, aber mehrmals am Tage so einförmig, daß er dadurch ebenfalls lästig wurde. „Die stärksten Ketten durchbiß der erstre mit Leichtigkeit und sein Geschrei wurde schließlich so quälend und ertönte so häufig, daß die Nachbarschaft ernste Klagen erhob und ich ihn abschaffen mußte. Aber ich werde stets bedauern, daß es mir nicht möglich ist, einen so liebenswürdigen und zugleich schönen Vogel halten zu können. Von den drei rothhäubigen Kakadus, welche ich besessen, zeigte sich der letzte auch sehr gelehrig im Nachpfeifen, indem er mit sanfter Flötenstimme leichte Signale

Digitized by Google

und Melodieen lernte. So oft im Vorhof eine Drehorgel sich hören ließ, versuchte er die einzelnen Stücke nachzupfeifen und wenn ihm dies auch nicht so leicht gelang, so traf er doch Rhytmus und Tonart immer sogleich. Im Sprechen brachte er es dagegen nur auf zwei Worte." Herr G. Hoffmann erhielt einen jungen Kakadu dieser Art, welcher eine höhere Sprachbegabung entwickelte. Er lernte mehrere Sätze sehr gut und besonders ausdrucksvoll nachsprechen. Zugleich schrie er niemals widerwärtig, sondern ließ nur ein nicht unangenehmes Gemurmel hören. Das so sehr verschiedenartige Benehmen der einzelnen Köpfe dieser Art beruht erklärlicherweise lediglich darin, ob solch' Vogel jung aus dem Nest genommen und aufgefüttert oder bereits alt eingefangen und wol gar schlecht behandelt ist. Im letztern Fall wird er eben jene unliebenswürdigen Eigenschaften, im erstern mehr die angenehmen zeigen, im letztern ist er aber störrischer und unzugänglicher als fast jeder andre Papagei. Alle Vögel dieser Art kommen bereits sehr zahm in den Handel. Dr. Platen hatte 20 Köpfe mitgebracht; im übrigen wird der Molukken-Kakadu nicht häufig eingeführt und sein Preis wechselt außerordentlich, sodaß er manchmal, wenn auch selten, auf 30 bis 45 M., meistens aber auf 80, 90, 120 bis 150 M. für den Kopf und 200 M. für das Par steht.

Der Inkakakadu

[Psittacus Leadbeateri, *Vgrs.*].

Leadbeater's Kakadu, Leadbeater's Kakatu. — Leadbeater's Cockatoo. — Cacatois de Leadbeater, Cacatois à huppe tricolore. — Driekleur Kakketoe of Leadbeater's Kakketoe.

Erst i. J. 1831 wurde dieser Kakadu, welcher eigentlich als der schönste unter allen angesehen werden kann, von Vigors beschrieben. Er ist in folgender Weise gefärbt: schmaler Stirnrand dunkelrosenroth; Stirn- und Vorderkopffedern weiß, am Grunde

Digitized by Google

hellrosenroth; Haube aus sechszehn spitz zulaufenden, an der Spitze nach vorn gebogenen Federn gebildet, die am Grunde zinnoberroth, dann breit gelb, darauf wieder rosenroth und am Ende weiß sind, so daß die zugeklappte Haube weiß und nur die in der Erregung gesträubte Haube prachtvoll dreifarbig erscheint; Hinterkopf, Kopfseiten, Hals, Unterrücken und ganze Unterseite hellrosaroth; Oberrücken und Flügel weiß; Schwingen an der Innenfahne und unterseits dunkelrosenroth; Schwanz oberseits weiß, unterseits an der Grundhälfte rosenroth; Schnabel gelblichgrauweiß; Wachshaut und Nasenlöcher von rosafarbenen Federchen verdeckt; Auge schwarz, tiefbraun bis rothbraun, schmaler Augenkreis gelblichweiß; Füße bräunlichgrau, Schildchen und Krallen schwarz. Etwa Krähengröße (Länge 31—34 cm; Flügel 25,6—27,6 cm; Schwanz 13,2—15,4 cm). Das Weibchen soll nach Gould kürzere Haubenfedern mit schmalerer gelber Binde haben und an der Unterseite heller weiß, nur rosa überflogen sein.

Heimat: Süd- und Westaustralien. Gould sagt, er bilde einen auffallenden Schmuck des australischen Urwalds, erscheine zu gewissen Zeiten in großen Schwärmen an bestimmten Oertlichkeiten. Seine Stimme sei nicht so schrill und gellend wie die der anderen Kakadus, sondern sanft und klagend; er sei auch nicht so laut und stürmisch.

Gleicherweise wie bei dem vorigen und selbstverständlich aus denselben Ursachen sind die Urtheile über die einzelnen Vögel dieser Art weit auseinandergehend. Während der Inkakakadu im allgemeinen als sanftmüthig und liebenswürdig, auch friedlich mit anderen Vögeln geschildert wird, sagt Herr Apotheker Jänicke, daß sich ein solcher in seinem Besitz unbeschreiblich unbändig und bösartig zeigte und daß jeder Zähmungsversuch fehlgeschlagen sei. Herr Pullack berichtet, daß ein Pärchen bei ihm anfangs unerträglich geschrieen habe, dann aber überaus zahm geworden, das Geschrei fast ganz unterlassen habe und nur noch melodisch plaudre. Sodann schreibt Herr A. E. Blaauw, ein Inkakakadu sei sogleich nach der anstrengenden Reise von London bis Amsterdam ihm auf den

Digitized by Google

vorgehaltnen Finger gekommen, habe nach Verlangen die prachtvolle Haube aufgeklappt, Küßchen gegeben und allerliebst geplaudert und geflötet. Selbst gegen Fremde sei er so liebenswürdig gewesen, doch konnte er einzelne Personen nicht leiden, empfing dieselben stets mit Geschrei und Schnabelhieben, ohne daß eine besondre Ursache dafür aufzufinden war. Herr Dr. Lazarus meint, die Inkakakadus kämen fast sämmtlich wenig oder garnicht gezähmt in den Handel, sie seien viel weniger munter, anmuthig und begabt als andere; trotz aller Mühe vermochte er die seinigen weder zahm zu machen, noch ihnen ein Wort oder das Nachflöten eines leichten Signals beizubringen. Zugleich waren sie arge Schreier. Auch die gewaltsame Zähmung, welche beim Jako, den Amazonen u. a. (siehe Seite 52) immer mit Erfolg unternommen wird, machte einen Inkakakadu im Gegentheil nur bösartiger und unbändiger. Wenn dieser letztre Vogel allerdings auch zu den vorhin erwähnten Ausnahmen gehört, so ist es doch bezeichnend, daß er selbst durch Hunger und Durst sich nicht bändigen ließ. Im allgemeinen stimmt diese Art wol wesentlich mit den vorhergegangenen nächsten Verwandten überein. In der That kann sie nicht zu den hervorragend begabten Sprechern gezählt werden, denn ein Leadbeaterkakadu lernt wahrscheinlich überhaupt nur einzelne Worte, höchstens einige Sätze nachplappern.

Erst i. J. 1854 ist ein solcher in den zoologischen Garten von London gelangt; seit dem Jahre 1863 kommt er in den Vogelhandlungen bei uns, wenn auch nicht zahlreich, doch so oft vor, daß er als eine allbekannte Erscheinung des Vogelmarkts angesehen werden darf. Sein buntes Aussehen und seine auffallenden Gebehrden bestechen manchen Käufer, der ihn dann nicht zu behandeln versteht und baldigst wieder abschafft. Der Preis wechselt zwischen 45, 50, 60 bis 75 M. für den frisch eingeführten und 100 bis 150 M. für den zahmen, sprechenden.

Digitized by Google

Der Kakadu mit rosenrothem Stirn- und Zügelstreif

[Psittacus sanguineus, *Gld.*].

Rothzügeliger Kakadu, Rothzügel-Kakadu, rothzügeliger Kakatu. — Blood-stained Cockatoo, Red-faced White Cockatoo. — Cacatois à lunettes rouges, Cacatois à front rouge. — Roodteugel Kakketoe.

Auch diese gehört zu den Arten, über welche bisher erst gar geringe Mittheilungen vorliegen. Sie ist weiß; schmaler Stirnrand und Zügelstreif und Schnabeleinfassung dunkelrosaroth; Schwingen und Schwanzfedern an der Grundhälfte der Innenfahne gelb; Schnabel bläulichgrauweiß; Wachshaut und Nasenlöcher von rosarothen Federchen verdeckt; Auge tiefbraun bis grau; breiter nackter Augenkreis weiß; Füße hellbräunlichgrau mit schwarzen Schildchen und Krallen. Etwa Krähengröße (Länge 30—36 cm; Flügel 25,2 — 28,5 cm; Schwanz 12,2 — 16,4 cm). Heimat: Nordwestküste von Australien, Süd- und Zentralaustralien. Sein Aufenthalt sollen sumpfige Gegenden sein und seine Nahrung soll besonders in Orchideenknollen bestehen. Erst i. J. 1842 von Gould beschrieben, hat er von dem Forscher eine recht unpassende Bezeichnung erhalten, denn Stirn- und Zügelstreif sind nur dunkelrosafarben, und außerdem zeigt er keine blutrothe Färbung. Ueber das Freileben ist nichts bekannt. Bis jetzt gelangte er nur selten lebend zu uns, doch einzeln haben ihn die Großhandlungen und Vogelausstellungen wol aufzuweisen. Herr A. E. Blaauw in Amsterdam schildert ihn als einen überaus ängstlichen und stillen Vogel. „Erst nach geraumer Frist nahm er ein Stückchen in Milch getauchtes Brot, welches er sehr gern fraß, aus meiner Hand an, doch geschah es stets mit Widerstreben und größter Vorsicht. Wurde er in den Garten hinausgebracht, so erwachte er aus seinem Stumpfsinn, kletterte hurtig und behend im Käfig umher und ließ rauhe und durchdringende Schreie hören. Sprachbegabung schien er nicht zu haben, wenigstens nahm er nicht ein einziges Wort an, obwol wir uns viel mit ihm beschäftigten und ein sprechender Graupapagei in demselben Zimmer

Digitized by Google

war. Ein zweiter Kakadu dieser Art benahm sich ebenso furchtsam und unfreundlich, wahrscheinlich aber würden junge sich der Zähmung und Abrichtung zugänglicher zeigen." Der Preis steht der Seltenheit wegen sehr hoch, unter 100 M. ist er nicht zu erlangen.

Goffin's Kakadu [Psittacus Goffini, *Fnsch.*]. — Goffin's Kakatu — Goffin's Cockatoo — Cacatois de Goffin — Goffin's Kakketoe — ist an Stirn und Zügeln weiß; Haubenfedern weiß, am Grunde rosa, unterseits hellgelb; Schwingen an der Innenfahne gelblichweiß, unterseits Innenfahne schwefelgelb; Schwanzfedern unterseits an der Innenfahne gelb; ganzer übriger Körper weiß, an Kopf, Hals und Brust jede Feder mit rosafarbnem Flaum; Schnabel horngrauweiß; Wachshaut und Nasenlöcher mit weißen Federchen bedeckt; Auge schwarzbraun, dunkelbraun bis kirschroth; breiter Augenkreis bläulichweiß; Füße schwärzlichgrau mit schwarzen Schildchen und Krallen. Nahezu Krähengröße (Länge 32—33 cm; Flügel 24—26 cm; Schwanz 10,5 — 12 cm). Er gleicht dem vorigen, hat aber keinen rothen Zügelstreif, auch ist die Gegend um den Schnabel weiß und seine Größe geringer. Die Heimat dieser Art ist bis jetzt noch nicht bekannt und ihre Beschreibung hat Dr. Finsch i. J. 1863 nach lebenden Vögeln in den zoologischen Gärten von Amsterdam und Rotterdam gegeben. Sie zählt nicht zu den allerseltensten Arten, sondern erscheint, wenn auch einzeln, doch von Zeit zu Zeit im Handel. Dr. Platen hatte drei Köpfe eingeführt und kürzlich bot der Großhändler Abrahams in London ein Par aus, welches englisch sprechen sollte. Herr Fiedler sagt, er gleiche im Wesen dem Inkakakadu, sei sanft, friedlich und liebenswürdig, sodaß kleine Kinder mit ihm spielen konnten, aber sein stundenlanges Kreischen war unerträglich. Preis sehr hoch, 100 bis 150 M.

Der Philippinen-Kakadu [Psittacus Philippinarum, *Gml.*] — rothsteißiger Kakatu, Rothsteiß-Kakadu — Red-vented Cockatoo — Cacatois des Philippines, Cacatois à cul rouge — Roodstaart Kakketoe — ist an Stirn, Wangen und Kopfseiten weiß, mit rosafarbnem Schein;

Digitized by Google

Haubenfedern weiß, unterseits weißgelb; Schwingen an der Innenfahne hellgelb gesäumt und unterseits ganze Innenfahne gelb; Schwanzfedern unter- und oberseits an der Innenfahne gelb; ganze übrige Oberseite reinweiß; ganze Unterseite weiß, gelblich angehaucht; untere Schwanzdecken zinnoberroth; Schnabel bläulichgrauweiß; Wachshaut und Nasenlöcher mit weißen Federchen bedeckt; Auge schwarz bis dunkelbraun; großer nackter Augenkreis weiß; Füße dunkelbräunlichgrau, Schildchen und Krallen schwarz. Etwa Dohlengröße (Länge 28—32 cm; Flügel 20,4 — 24,5 cm; Schwanz 9,4 — 10,5 cm). Als besondres Kennzeichen ergeben sich die rothen unteren Schwanzdecken. Heimat: Philippineninseln, wo ihn Dr. Meyer sehr zahlreich in den Wäldern fand. Dieser Kakadu wurde bereits von Brisson (1760) beschrieben und von Gmelin 1788 wissenschaftlich benannt. Schon Bechstein rühmt seine Schönheit, sagt, er werde sehr zahm, lerne aber nicht sprechen und schreie häßlich. Aehnlich spricht sich Herr Blaauw aus. Er gehört zu den seltensten im Handel. Sein Preis steht gewöhnlich auf 75 bis 100 M.

Dukorps' Kakadu

[Psittacus Ducorpsi, *Hmbr.* et *Jacq.*].

Ducorps' Kakatu. — Ducorps' Cockatoo. — Cacatois de Ducorps. — Ducorps' Kakketoe.

Er hat eine kurze aufrecht stehende, nicht nach vorn gekrümmte Spitzhaube, deren Federn an der untern Seite und am Grunde hellgelb, bei einigen schwach röthlichgelb sind; der ganze übrige Körper ist weiß; nur die Schwingen sind an der Innenfahne hellgelb, die Schwanzfedern unterseits an der Innenfahne gelb; zuweilen hat das ganze, sonst reinweiße Gefieder einen gelblichen Schein; Schnabel grauweiß; Wachshaut und Nasenlöcher mit weißen Federchen besetzt; Auge schwarz, dunkelbraun bis dunkelroth; großer Augenkreis bläulichweiß; Füße grauweiß, Schildchen und Krallen schwärzlich. Etwas über Dohlengröße (Länge 30—34 cm; Flügel 22—26,5 cm; Schwanz 13,2 — 14,8 cm). Er ist Goffin's Kakadu ähnlich, unterscheidet sich aber durch die kürzere Spitzhaube, und seine Kopf- Hals- und Brustfedern sind am Grunde nicht roth; neben dem Philippinen-Kakadu

Digitized by Google

ist er an dem Mangel der rothen unteren Schwanzdecken zu erkennen. Heimat: die Salomons-Inseln. Von Hombron und Jacquinot i. J. 1830 beschrieben und abgebildet, ist er bis heute noch in den Museen als Balg, wie lebend in den Vogelhandlungen recht selten. Layard beobachtete ihn auf der Insel Guadalkanar auf den Mangrovebäumen, von deren Früchten er sich ernährt. Im Besitz der Liebhaber, so z. B. der Herren Fiedler und Linden und Frau Baronin Sidonie v. Schlechta in Wien befanden sich sonderbarerweise fast immer Weibchen, welche in der Gefangenschaft mehrmals Eier gelegt haben. Die genannte Dame schildert ein solches in folgender Weise: „In Decken gehüllt, brachte ich den Kakadu nach Hause und sein heftiges Anfahren an das Gitter ließ mich auf kein trauliches Beisammensein hoffen. Wie erstaunte ich aber, als er, nachdem ich den runden Hut abgelegt, ganz ruhig war und sich freundlich in die Hand nehmen ließ. Das Räthsel löste sich später, denn jedesmal, wenn ich den Hut aufsetzte oder Kopfwehs wegen eine Kompresse trug, war er wieder scheu und böse; der Händler, von dem ich ihn gekauft, hatte nämlich eine runde Kappe getragen und ihm war der Vogel feindlich gesinnt. Erst nach längrer Zeit begann er auch mit dem Hut u. a., wenn ich ihn anrief, mich zu erkennen und nickte dann ausdrucksvoll mit dem Kopf, sobald ich ihm nahte. Seine Lieblingsnahrung sind gebratene Erdäpfel, ebenso Nüsse und Hanf, auch ein Brei aus Polentamehl mit Wasser. Er sprach mit zarter Kinderstimme allerliebst mehrere Worte und Redensarten, alles schnell und lebhaft." Herr Linden berichtet von einem Dukorps' Kakadu in seinem Besitz gleichfalls, daß er zahm und liebenswürdig war, sich besonders durch eine Frauenstimme anregen ließ und in jedem Jahr ein Ei legte. Der Preis ist verhältnißmäßig nicht hoch, denn er beträgt nur 60, 90 bis 100 M.

Digitized by Google

Der rosenrothe Kakadu

[Psittacus roseicapillus, *Vll.*].

Rosakakadu, Rosenkakadu, rosafarbner Kakadu, rosafarbner Kakatu. — Roseate Cockatoo, Rosy Cockatoo, Rose-crested Cockatoo. — Cacatois rosalbin, Cacatois rose. — Rosé Kakketoe.

Wie zu den gemeinsten Vögeln des Handels gehört der Rosakakadu zugleich zu den beliebtesten. Er ist an Stirn, Oberkopf und Haube hellrosenroth, Haubenfedern unterseits dunkelrosenroth; Hinterkopf, Hals, Wangen und ganze Unterseite dunkelrosenroth; Oberrücken, Mantel und Flügel dunkelaschgrau; Unterrücken, Bürzel, obere und untere Schwanzdecken grauweiß; Schwingen am Ende und unterseits schwärzlichgrau; Schwanzfedern oberseits hellgrau mit dunklerer Endhälfte, unterseits schwärzlichgrau; Schnabel grauweiß mit hellerer Spitze; Wachshaut und Nasenlöcher von rosenrothen Federchen bedeckt; Auge schwarz, dunkelbraun, rosen- bis blutroth; breiter nackter Augenkreis weiß; Füße aschgrau bis bräunlichfleischfarben mit schwarzen Schildchen und Krallen. Fast Krähengröße (Länge 30—32 cm; Flügel 23,9 — 26,6 cm; Schwanz 11—13,2 cm). Das Weibchen ist bis jetzt mit Sicherheit noch nicht festgestellt; denn die angegebenen Kennzeichen dürften nicht stichhaltig sein. Seine Heimat soll der größte Theil Australiens mit Ausnahme des Westens sein und sich im Gebirge bis zu 200 m über Meereshöhe erstrecken. Er wurde von Vieillot i. J. 1818 zuerst beschrieben und benannt. Gould fand ihn am Namoi, wo er ursprünglich nicht heimisch, sondern erst in neuerer Zeit eingewandert sein soll, zahlreich. Dieser Reisende, dann auch Kapitän Sturt und Elsey sahen ihn in Schwärmen von fünfzig bis zu Hunderten von Köpfen. Sie sprechen mit Entzücken von dem schönen Anblick, welchen die malerischen Flugbewegungen solcher Vogelscharen gewähren.

Die Nahrung des Rosakakadu soll außer anderen Früchten und Pflanzenstoffen vornehmlich in den Samen von Salzkräutern bestehen. In den Höhlungen der Gummibäume nisten die Pärchen gesellig nebeneinander; das Gelege sollen nur 2 bis 3 Eier bilden. Die Jungen werden von den Eingeborenen

Digitized by Google

besonders zahlreich aus den Nestern geraubt, aufgefüttert und nach Sidney zum Verkauf gebracht. Bei den Ansiedlern fanden die Reisenden sie oft halb gezähmt mit Hühnern und Tauben zusammen auf den Höfen. Außerdem wird dieser Kakadu in großen Netzen während der Wanderzeit nicht selten in ganzen Schwärmen eingefangen und daher gehört er zu den gewöhnlichsten Erscheinungen des Vogelmarkts.

Namentlich in letztrer Zeit hat man ihn vielfach als Stubenvogel beobachtet und geschildert; ich darf hier nur eine solche Mittheilung anführen und zwar wähle ich die von Fräulein M. Reuleaux, einer liebevollen und begeisterten Vogelfreundin: „Unser Kakadu, seiner Färbung wegen ‚Rosa' genannt, saß anfangs still und stumm in seinem Käfig und wurde vorschnell für dumm gehalten. Eigentlich ohne Vertrauen zu seinen Fähigkeiten sprach ich ihm seinen Namen mit scharfer Aussprache vor, aber schon Tags darauf ertönte zu unsrer Verwunderung aus dem Nebenzimmer, wo der Käfig stand, das Wort ‚Rrrosa'. Nun galt der Vogel natürlich nicht mehr als einfältig, sondern Jeder sprach ihm jetzt etwas vor; so lernte er bald ‚herrrein' sagen, wenn an die Thür geklopft wurde. Um ihm die Bedeutung des Worts verständlich zu machen, klopfte ich oft mit dem Finger an den Futternapf, worüber er anfangs sehr erschrack und dann mit hochaufgerichteter Tolle einige Schritte zurückwich; bald aber klopfte er selbst mit dem Schnabel und antwortete ‚herrrein!' Wenn das Dienstmädchen morgens beim Zimmerreinigen den Kakadu zum Sprechen aufforderte und er hartnäckig schwieg, so sagte sie: du bist ein Quatschkopf. Da dauerte es nicht lange, bis er das ‚Quatschkopf' oder auch nur, ‚quatsche, quatsche, quatsche' zurückgab. Dann lernte er noch viele Worte mehr oder minder deutlich, auch meinen Namen Mathilde, der doch schwer auszusprechen ist. Der allerliebste Vogel entwickelte sich von Tag zu Tag

Digitized by Google

mehr und wir gewannen ihn so lieb, als wenn er ein Mensch wäre. Ließen wir ihn im Zimmer allein, so war er still und betrübt, sobald sich aber Jemand der Thür näherte, fing er an zu schreien, um sich bemerkbar zu machen; trat man dann herein, so gerieth er in große freudige Aufregung und drückte den Kopf gegen das Gitter, um sich krauen zu lassen; kam man aber nicht zu ihm, so wurde er ungeduldig, pfiff und flötete in den höchsten Tönen und sprach alle Worte, welche ihm einfielen. Bei den Liebkosungen lernte er ganz von selbst ‚du guter Kerl, guter Kerl!' mit besondrer drolliger Betonung sprechen. Der liebenswürdige Vogel starb leider nach kurzer Zeit an Krämpfen." Mehrfache anderweitige Beobachtungen haben ergeben, daß der Rosakakadu, wenn auch nicht zu den hervorragenden Sprechern, ja, nicht einmal zu den begabtesten Kakadus, so doch zu den Stubenvögeln gehört, die sich durch Klugheit, drolliges Wesen, leichte Zähmbarkeit und Befähigung für einen freundschaftlichen Umgang mit dem Menschen auszeichnen; aber auch der zahmste und liebenswürdigste läßt zuweilen das widerwärtige Kakadugeschrei erschallen. Ueberaus gern und muthwillig spielt er auf dem Rücken liegend mit einem Stückchen Holz oder drgl. in den Klauen, macht Purzelbäume u. a. Künste, und wenn er scherzend seinen Herrn in Ohr oder Nase kneift, so hütet er sich doch, jemals wehe zu thun. Er ist zweifellos ein ungemein lieblicher und liebenswerther Stubengenosse, und jemehr er in der Zähmung und Abrichtung fortschreitet, um so seltner wird er durch Schreien lästig. Ueber ein bis zwei Sätze und ein halbes Dutzend Worte dürfte seine Fähigkeit nicht hinausgehen. Der Preis steht recht niedrig, denn man kauft einen Rosakakadu wol schon, wenn auch selten, für 12, 15, 18 bis 20 M., gewöhnlich für 24, 30, 36 bis 45 M. und bezahlt den besten höchstens mit 60 bis 75 M.

Digitized by Google

Der langschnäbelige Kakadu

[Psittacus nasica, *Tmm.*].

Nasenkakadu, kleiner Nasenkakadu, langschnäbeliger Kakatu. — Slender-billed Cockatoo, Long-billed White Cockatoo, Nasecus Cockatoo. — Cacatois nasique, Nasiterne. — Neus Kakketoe.

Inmitten aller dieser Vögel bildet der Nasenkakadu, welcher erst i. J. 1819 von Temminck beschrieben und abgebildet ist, mit seinem lang hervorstehenden Oberschnabel eine absonderliche Erscheinung und der ihm daher gegebne Namen ist allerdings einigermaßen zutreffend. Er ist an Stirnrand, Zügeln, Streif ums Auge scharlachroth; kleine gerundete Haube weiß, die Federn am Grunde mit rosenrothem Flaum; Fleck hinterm Auge gelb; ganzer übriger Körper weiß; an Kopf und Hals die Federn gleichfalls mit rosenrothem Flaum; Schwingen an der Innenfahne weißgelb; unterseits Innenfahne hellgelb; Schwanzfedern unterseits an der Innenfahne breit hellgelb; Fleck an der Oberbrust scharlachroth, alle Federn am Grunde dunkelrosenroth; Schenkelgegend schwachrosenroth; Schnabel bläulichweiß mit weit überhängender scharfer Spitze; Wachshaut und Nasenlöcher mit rosenrothen Federchen bedeckt; Auge schwarz, dunkel- bis hellbraun; breiter Augenkreis bläulichweiß; Füße blaugrau mit schwarzen Schildchen und Krallen. Stark Krähengröße (Länge 45 cm; Flügel 26,4—27 cm; Schwanz 11,6—12 cm). Heimat: Südaustralien. Vermittelst des eigenthümlichen Schnabels soll er Orchideen- u. a. Knollen und Wurzeln aus der Erde graben und sich von diesen vornehmlich ernähren; im übrigen wird er wol in der ganzen Lebensweise von den vorhergegangenen naheverwandten Arten nicht abweichen. In seinen Bewegungen, Flug und Gang zeigt er sich jedoch hurtiger und gewandter, und er dürfte viel mehr Erd- als Baumvogel sein. Ueber sein Freileben ist wenig bekannt; auch sein Nest befindet sich in einer Gummibaum-Höhlung, und das Gelege sollen nur zwei Eier bilden. Große Schwärme übernachten auf hohen Waldbäumen Er verursacht vielen Schaden an Nutzgewächsen, wird daher

Digitized by Google

arg verfolgt und ist gleich den anderen schon fast überall in die Wildniß zurückgetrieben. Zahlreiche Junge werden aus den Nestern geraubt und aufgezogen, noch mehr aber werden die Alten schwarmweise in Netzen gefangen.

Im Käfig erscheint er gewöhnlich mürrisch und unliebenswürdig, zugleich gehört er zu den allerschlimmsten Schreiern. Die meisten lernen nur einige Worte sprechen, einzelne sollen aber außerordentlich sprachbegabt sein. Ein Nasenkakadu im Besitz des Herrn Max Strahl wurde äußerst zahm, gab Pfötchen und Kuß, und wenn ihm gestattet wurde, aus dem Bauer zu kommen, kannten seine Freude und Schmeicheleien keine Grenzen. Er führte mit fächerförmig gespreiztem Schwanz auf der Erde eigenthümliche Sprünge aus und begleitete dieselben mit absonderlichen Tönen. Herr Müller-Küchler hatte ein Pärchen so gezähmt, daß sie ihn auf weiten Spaziergängen im Freien begleiteten, von Baum zu Baum fliegend, auf einen Ruf aber herbeieilten und Liebkosungen und Küsse tauschten. In malerischem Flug erhoben sie sich oft hoch in die Luft und von einem Raubvogel verfolgt, stieg das Männchen kreisend so hoch, daß es nicht mehr zu sehen war und dem Verfolger entkam. Alt eingefangen zeigen sie sich störrisch und schwer zähmbar, leicht erregbar, doch nicht eigentlich bösartig; Junge werden überaus zutraulich. Im Handel gehört er zu den gemeinsten Erscheinungen. Preis 15, 18, 20, 24, 30 bis 36 M. für den frisch eingeführten, 40, 50 bis 60 M. für den etwas und bis 100 M. für den gut sprechenden Nasenkakadu.

Der große langschnäbelige Kakadu [Psittacus pastinator, *Gld.*] — Großer Nasenkakadu, Nasenkakadu von Westaustralien, Wühler- und Wühlkakadu (!), großer langschnäbeliger Kakatu — Western Slender-billed Cockatoo, Digging Cockatoo — Grand Cacatois nasique, Grand Nasiterne — Groote Neus Kakketoe — gleicht dem vorigen so sehr, daß er erst kürzlich mit Sicherheit als Art festge-

Digitized by Google

stellt worden. Er ist aber ansehnlich größer; schmgler Stirnrand blaßrosenroth; das ganze Gefieder reinweiß, nur die Kopf- und Halsfedern, nicht aber die Kehl- und Oberbrustfedern, am Grunde röthlich, die Hinterhalsfedern gelblich; Schnabel hellhorngrau, fast weiß; Auge hell- bis tiefbraun; nackter Augenkreis groß, grau- bis grünlichblau; Füße düsterolivengrün. Fast Rabengröße (Länge 45—48 cm; Flügel 28—33 cm; Schwanz 13,5—16,5 cm). Heimat: Westaustralien. Er wurde von Gould erst i. J. 1848 beschrieben. Seit d. J. 1854 ist er lebend eingeführt und in neuester Zeit mehrmals in den Handel gelangt, doch ist er in den Museen gleicherweise wie lebend in den zoologischen Gärten äußerst selten und bei Liebhabern kaum zu finden. Herr Blaauw machte die Erfahrung, daß im Gegensatz zu Alfred Brehm's Behauptung dieser Nasenkakadu und die vorige Art in je einem ungezähmten störrischen Vogel in einen Käfig zusammengebracht, keineswegs feindselig über einander herfielen, sondern sich vielmehr sogleich dicht zusammensetzten und einander zu liebkosen begannen; so blieben sie auch beide friedlich. Der Seltenheit wegen wird der große Nasenkakadu hoch bezahlt, 60, 75 bis 100 M. für den Kopf.

Der nacktäugige Kakadu

[Psittacus gymnópis, *Scl.*].

Nacktaugen-Kakadu. — Bare-eyed Cockatoo. — Cacatois á yeux nus. — Naaktoog Kakkatoe.

Er ist nach Beschreibung des Herrn Blaauw in folgender Weise gefärbt: Stirn schwachrosafarben; die spitze und gerade Haube ist weiß, am Grunde röthlichgelb; Zügel fast blutroth; Wangen schmutziggelb; das ganze übrige Gefieder weiß; an Kopf und Brust die Federn mit rosafarbnem Flaum; Schwingen und Schwanzfedern unterseits schwefelgelb; Schnabel hornweiß (nicht verlängert wie bei den Nasenkakadus); Auge dunkelbraun; nackter Augenkreis schwärzlichblau (oberhalb des Auges sind die Federn beweglich wie Brauen, sodaß sie zuweilen bis ans Auge reichen und nur unter dem Auge die nackte Haut

Digitized by Google

sichtbar ist. Dies gibt dem Kakadu ein überaus gemüthliches Aussehen). Größe des gem. langschnäbeligen Kakadu, in der Gestalt gleicht er aber mehr dem großen Nasenkakadu. Heimat: Südaustralien. Erst i. J. 1871 wurde er von Dr. Sclater bekannt gemacht und nach einem im Londoner zoologischen Garten befindlichen Balg beschrieben.

„Als ich den nacktäugigen Kakadu erhielt," schreibt Herr Blaauw, „war er sehr scheu und wollte von keiner Annäherung wissen, bald aber zeigte er sich neugierig, wenn ich mich mit den vielen anderen Kakadus beschäftigte. Dann fing er an, meine Finger mit dem Schnabel zu berühren, wenn ich sie ihm reichte. In überaus kurzer Zeit wurde er zahm, kam auf meine Schulter geflogen, wenn ich ihn rief und ließ sich liebkosen. Auch gewöhnte er sich, im Freien umherzufliegen, wobei er, selbst sich hoch emporschwingend, mir immer folgte, wenn er mich aus den Augen verloren, laut klagend umhersuchte und seiner Freude lebhaften Ausdruck gab und sich in Liebkosungen erging, sobald er mich wiedergefunden. Sein Flug ist leicht und schnell, in malerischen Bewegungen und mit aufgerichteter Spitzhaube; im heftigen Sturm tummelt er sich gern umher, Regen ist ihm dagegen widerwärtig. Auf dem Boden bewegt er sich geschickt laufend oder in kleinen Sprüngen, zuweilen führt er, die Haubenfedern sträubend, einen komischen Tanz aus. Sein Geschrei besteht in langgezogenen eulenähnlichen Rufen, die er jedoch nur abends und während des Flugs hören läßt. Ich halte diese Art für eine der liebenswürdigsten und begabtesten unter allen Kakadus." Diese Schilderung eines noch so sehr seltnen Vogels erscheint so interessant, daß ich sie ausführlich mitgetheilt habe, umsomehr da der bis vor kurzem nur in zwei Köpfen im zoologischen Garten von London vorhandene nacktäugige Kakadu neuerdings hin und wieder eingeführt wird; so hatte Chs. Jamrach in London i. J. 1877 einen

Digitized by Google

und i. J. 1881 drei, J. Abrahams i. J. 1881 einen in den Handel gebracht. Preis hoch, kaum unter 100 M.

*

Die Langschwanzkakadus [Calyptorrhynchus, *Vgrs. et Hrsf.*] zeichnen sich vor allen übrigen Verwandten durch besonders auffallende Merkmale aus, namentlich durch den längern Schwanz und die schwarze Färbung mit gelblich oder röthlich gezeichneter Haube und rother oder gelber Schwanzbinde. Ihre Kennzeichen sind folgende: Schnabel auffallend kräftig, höher als lang, halbzirkelförmig herabgekrümmt mit stark nach innen gerichteter Spitze, Oberschnabel am Grunde sehr breit und stark gewölbt, First scharf gekielt, Unterschnabel sehr breit, namentlich die Dille; Zunge einfach und glatt; Auge groß, gewölbt, mit breitem nackten, selten befiederten Augenkreis; Nasenlöcher groß, rund, frei; Wachshaut zuweilen aufgeworfen, nackt; Zügel meistens nackt; Flügel lang und spitz; Schwanz lang und breit, gerade abgeschnitten oder zugerundet (nicht kielförmig oder stufig zugespitzt); Füße kräftig mit langen sichelförmigen Krallen; Gefieder weich mit Puderdaunen, jede Feder breit und gerundet; Haube nach hinten gekrümmt, aus breiten, seltner ansehnlich langen Federn gebildet und wie bei den vorigen beweglich; Gestalt hoch, aufrecht und etwas schlanker als die der vorigen. Krähen- bis Rabengröße und darüber. Einige Arten zeigen den Oberschnabel mehr zusammengedrückt, nur am Grunde etwas gewölbt, die First nicht gekielt, Unterschnabel schmal, vor der Spitze mit tiefer Ausbuchtung; Nasenlöcher und Wachshaut mit feinen Borstenfederchen besetzt. Stimme klagend ‚kru, hu' und dann ‚jäh'. Heimat: vornehmlich Süd- und Westaustralien, Inseln der Baßstraße, Vandiemensland. Sie verursachen keinen Schaden an Nutzgewächsen, denn ihre Nahrung besteht hauptsächlich in den harten Nüssen, welche sie mit ihren gewaltigen Schnäbeln zu zertrümmern vermögen; außerdem auch in Insektenlarven, und um letztere zu erlangen, nagen sie große Löcher in die Bäume. Herr Karl Hagenbeck, der den rothköpfigen, Banks', Solander's und den gelbohrigen Langschwanzkakadu mehrmals eingeführt, bzl. eine Zeit lang beherbergt hat, fütterte sie wie S. 202 für die Kakadus im allgemeinen angegeben, doch reichte er ihnen auch einige Nüsse, welche sie begierig nahmen und ebenso fraßen gern sie Obst. Brehm theilt noch mit, daß ein Banks' Langschwanzkakadu außer den er-

Digitized by Google

wähnten Zugaben auch Engerlinge, Regenwürmer und Schnecken erhielt, von welchen letzteren er die Gehäuse zertrümmerte, um sich die Schnecke herauszuschälen. Ueber die Sprachbegabung der hierher gehörenden Arten sagt Herr Hagenbeck, daß er unter den seinigen keinen Sprecher gehabt, aber sicher glaube, diese Kakadus würden ebenso gut sprechen lernen wie die eigentlichen, wenn man sich nur mit ihnen beschäftige. Im übrigen werden sie selten lebend eingeführt und haben sehr hohe Preise. Für die Liebhaberei sind sie alle eigentlich nur von geringer Bedeutung, denn einerseits ihrer Seltenheit und hohen Preise und andrerseits der Größe der meisten wegen eignen sie sich vornehmlich nur zu Schaustücken in zoologischen Anstalten.

Der rothköpfige Langschwanzkakadu

[Psittacus galeatus, *Lth.*].

Helmkakadu, rothköpfiger Helmkakadu, kleiner schwarzer rothhäubiger Kakadu, Gangakakadu, rothgehäubter Langschwanzkakatu. — Ganga Cockatoo, Ganggang Cockatoo. — Cacatois Ganga, Banksien à tête rouge. — Ganga Kakketoe.

Unter diesen Langschwänzen ganz entschieden, eigentlich aber unter allen Kakadus überhaupt, als einer der schönsten erscheinend, läßt er umsomehr bedauern, daß er nur überaus selten lebend eingeführt wird. Er gehört zu den Vögeln, welche auf Cook's Reisen gesammelt und von Latham (1802) beschrieben und abgebildet worden. An Stirn, Vorderkopf bis zur Kopfmitte und Wangen ist er scharlachroth, die nach hinten gelegten, aber an der Spitze aufwärts gekrümmten Haubenfedern sind dunkler, blutroth; das ganze übrige Gefieder ist tief schieferschwarz, jede Feder gelblichweiß gesäumt, an Hinterkopf und Nacken aber schmal, an Rücken, Mantel, allen Deck- und Bürzelfedern immer breiter werdend, grünlich gesäumt; Schwingen schwärzlichgrau, an der Innenfahne heller, fast aschgrau, unterseits grauschwarz mit fünf bis sechs gelblichweißen wie marmorirt erscheinenden Querbinden; Deckfedern der ersten Schwingen und Schulterdecken an der Außenfahne fahl olivengrün; Schwanzfedern grünlichschwarzgrau, fahl gelblichweiß quergebändert, unterseits dunkler schwarzgrau, ebenso

Digitized by Google

quergebändert; Unterseite reiner schieferschwarz, jede Feder nur matt, hell grünlich bis röthlich gesäumt; untere Schwanzdecken fahl grünlichgrau, heller gesäumt; Schnabel hellgraugelb; Spitze am Ober- und Unterschnabel fast weiß; Wachshaut und Nasenlöcher mit rothen Federchen bedeckt; Auge braun; nackter Augenkreis sehr schmal, bräunlich; Füße dunkelfleischfarben, Krallen schwarz. Beim ganz alten Männchen ist das Gefieder ober- und unterseits reiner rußschwarz, die Unterseite fast reinschwarz; Unterschnabel schwärzlich, Füße grauschwarz. Weibchen: Stirn, Vorderkopf und Haube schwärzlichgraubraun; der übrige Kopf ebenso, doch jede Feder schmal fahl gesäumt; ganze übrige Oberseite schwärzlichgrau, mit braunem Ton, jede Feder mit zahlreichen weißgelben Querbinden; ganze Unterseite graulichschwarz, mennigroth und gelb quergebändert; im übrigen mit dem Männchen übereinstimmend, nur in allen Theilen heller. Etwa Krähengröße (Länge 30—32 cm; Flügel 23,4—24,7 cm; Schwanz 11,3—12,2 cm). Bisher hat man ihn an der Südküste von Australien, auf einigen Inseln der Baßstraße und im nördlichen Vandiemensland gefunden. Gould sagt, er halte sich in den Gipfeln der höchsten Bäume auf und ernähre sich von den Samen der Eukalypten. Professor Reuleaux sah ihn vielfach, hielt mehrere flügellahm geschossene und wieder ausgeheilte und rühmt sie als überaus angenehme Stubenvögel. Direktor Westerman in Amsterdam besaß einen, der ungemein zahm und zutraulich war und gut sprach. Diesen Urtheilen stimmen auch die meisten übrigen Beobachter zu. Die Sprachbegabung dürfte nur gering sein. Dr. Max Schmidt hat beobachtet, daß dieser Kakadu, obwol einer der eifrigsten und erfolgreichsten Nager, der die Sitzstangen des Käfigs immer in überraschend kurzer Zeit zersplittert, auch wenn sie aus dem härtesten Holz bestehen, doch einen hölzernen Käfig selber nicht zertrümmerte. Er ist so kräftig und ausdauernd, daß er ohne Gefahr im ungeheizten Raum überwintert werden darf. Sein Preis steht hoch und beträgt 150, 160, wol gar bis 200 M.

Digitized by Google

Banks' Langschwanzkakadu

[Psittacus Banksi, *Lth.*].

Banks' Kakadu, schwarzer Kakadu, Rabenkakadu, Barikakadu (!), Banks' Langschwanzkakatu. — Banksian Cockatoo. — Banksien australe, Cacatois de Banks, Cacatois Banksien. — Banks' Kakketoe.

Er erscheint einfarbig tiefschwarz, schwach metallgrün glänzend; große, nach hinten gekrümmte Haube gleichfalls reinschwarz; Schwanz mit breiter scharlachrother Querbinde, die beiden mittelsten Federn reinschwarz; Schnabel bleigrau bis tief grauschwarz, Unterschnabel an den Schneidenrändern hellgrau; Wachshaut dunkelbraun; Auge hell- bis schwarzbraun; schmaler Augenrand bräunlich; Füße schwarzbraun, Krallen schwarz. Das Weibchen ist gleichfalls schwarz; Hauben-, Wangen- und Flügeldeckfedern gelblich gefleckt; ganze Unterseite gelb, roth und schwarz quergebändert; Schwanzbinde in gelblichrothen Querbändern bestehend. Ueber Rabengröße (Länge 68—72 cm; Flügel 40—45 cm; Schwanz 29,5 — 33 cm). Er vermag nicht allein die Hauben-, sondern zugleich die Wangen- und Bartfedern zu sträuben und dies gibt ihm ein absonderliches Aussehen. Heimat: Australien und wahrscheinlich ist er sehr weit verbreitet. Auch er gehört zu den auf Cook's Reisen und zwar von Banks und Solander gesammelten Vögeln und ist von Latham (1781) beschrieben. Gould fand ihn häufig in der Nähe von Sydney, wo er jetzt aber bereits ausgerottet sein soll. Im übrigen ist inbetreff seines Freilebens nur das über die Langschwanzkakadus im allgemeinen Gesagte bekannt. Als Stubenvogel bespricht ihn schon Bechstein, indem er ihn den schönsten, seltensten und kostbarsten Kakadu nennt, der inhinsicht des Betragens und der Ernährung den gemeinen Kakadus gleiche. A. E. Brehm klagt über die Unreinlichkeit dieser Art. Ihrer Seltenheit und daher hohen Preises wegen findet man dieselbe kaum bei den Liebhabern und auch nur hin und wieder in den zoologischen Gärten. Ihr Preis beträgt 300—450 M. für den Kopf.

Digitized by Google

Der großschnäbelige Langschwanzkakadu [Psittacus stellatus, *Wgl.*] — großschnäbeliger Langschwanzkakadu — ist tiefschwarz, stahlgrün glänzend, unter gewissem Licht violettblau scheinend; der Schnabel soll verhältnißmäßig stärker und kräftiger sein; im übrigen stimmt er mit dem vorigen durchaus überein, nur ist er bedeutend kleiner. Heimat: wahrscheinlich der größte Theil Australiens. Die geringen Nachrichten, welche inbetreff seiner Lebensweise, Ernährung u. a. vorliegen, ergeben nichts, worin er von der größern Art abweicht. Bis jetzt ist er noch nicht lebend eingeführt.

Solander's Langschwanzkakadu [Psittacus Solandri, *Tmm.*] — braunköpfiger Rabenkakadu, Solander's Langschwanzkakatu — Solander's Cockatoo or Leach's Cockatoo — Cacatois à tête brune ou Cacatois de Solander — Solander's Kakketoe — ist tiefbraunschwarz, stahlgrün scheinend; Kopf und Hals dunkelbraun; Haube schwach heller braun; Schwanzfedern braunschwarz mit breiter, oberseits scharlachrother, unterseits gelbrother Querbinde, die beiden mittelsten Federn einfarbig braunschwarz; ganze Unterseite heller, fahl braunschwarz; Schnabel überaus kräftig, bräunlichhorngrau; Schneidenränder des Oberschnabels fleischfarben; Wachshaut braun; Auge dunkelbraun, schmaler nackter Rand bräunlich; Füße und Krallen schwarz. Weibchen heller braun, die rothe Schwanzbinde grünlichschwarz marmorirt, Brust und Bauch mit großen gelben Punkten. Etwa Krähengröße Heimat: südliches Australien und Neusüdwales. Er ist von Temminck (1819) beschrieben und benannt. Ueber die Lebensweise hat Gould berichtet und sie ist von der aller Verwandten nicht abweichend. Bis jetzt gehört diese Art zu den am allerseltensten in den Handel gelangenden Vögeln; ich weiß nur anzugeben, daß Herr Karl Hagenbeck i. J 1878 einen einzelnen besaß. Ein Preis ist nicht anzugeben, doch wird er von denen der vorhergegangenen nicht abweichen.

Baudin's Langschwanzkakadu [Psittacus Baudini, *Vgrs.*]. — Weißohr-Kakadu, Baudin's Langschwanzkakatu — Baudin's Cockatoo or White-tailed Black Cockatoo — Calyptorrhynque de Baudin —

Digitized by Google

Baudin's Kakketoe — ist schwarzbraun, grünlich glänzend, an der ganzen Oberseite jede Feder schmal heller gesäumt; an der Ohrgegend ein weißer Fleck; Schwanz schwarzbraun, ober- und unterseits mit breiter weißer, braungestrichelter Querbinde, die beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig; Schnabel weißlich; Auge braun; Füße grau. Etwa Krähengröße. Heimat: West- und Südaustralien. Näheres ist nicht bekannt, auch gilt es noch für zweifelhaft, ob er wirklich als eine selbständige Art angesehen werden darf, da er dem nächstfolgenden so vollständig gleicht, daß er sich eigentlich nur durch geringre Größe unterscheidet. Für die Liebhaberei hat er garkeine Bedeutung und ich führe ihn daher nur beiläufig an.

Der gelbohrige Langschwanzkakadu

[Psittacus funéreus, *Shw.*].

Schwarzer Rabenkakadu, Gelbohrkakadu, gelböhriger Langschwanzkakatu. — Funereal Cockatoo, Yellow-eared Black Cockatoo. — Cacatois-corbeau. — Raaf Kakketoe.

Obwol längst bekannt, denn er wurde von Shaw schon i. J. 1789 beschrieben und abgebildet, zählt dieser Kakadu bis jetzt zu den Seltenheiten sowol in den Museen als auch im Thierhandel. In neuerer Zeit ist er allerdings mehrfach lebend eingeführt worden und wir müssen ihm daher größre Aufmerksamkeit zuwenden als allen letztvorhergegangenen. Er ist ein stattlicher Vogel, der für die Handlungen und den Ausstellungen gleich Banks' Langschwanzkakadu ein auffallendes Schaustück bildet, umsomehr, da man ihn selbst in den hervorragendsten zoologischen Gärten erst kaum findet und er dementsprechend hoch im Preise steht. Im ganzen Gefieder braunschwarz, grün schillernd, an der Oberseite jede Feder schwach heller gesäumt, ist er an dem großen lebhaft gelben, fein braun gestrichelten Ohrfleck sogleich zu erkennen; Schwanz schwarzbraun, ober- und unterseits mit breiter gelber, dunkelbraun ge-

Digitized by Google

strichelter Querbinde, die beiden mittelsten Federn einfarbig braunschwarz; ganze Unterseite braunschwarz, jede Feder mit breitem mattgelben Endsaum; untere Schwanzdecken an der Außenfahne gelb und schwärzlich gepunktet; Schnabel weiß- bis wachsgelb mit dunkler Spitze; Wachshaut bräunlich; Auge schwarz bis braun; Augenkreis dunkelbraun; Füße bräunlichgrau, Krallen schwarz. Rabengröße (Länge 58 — 64 cm; Flügel 32,2 — 44,3 cm; Schwanz 26,8 — 34,8 cm). Das Weibchen soll nach Gould übereinstimmend sein und im Jugendkleid soll er einen weißen Schnabel haben. Heimat: Vandiemensland, Neusüdwales und Südaustralien. Aufenthalt: bewaldete Bergabhänge und in der Ebene hohe Bäume. Schart sich zuweilen in vielköpfigen Flügen zusammen und zeigt sich harmlos und dreist, ist aber an vielen Stellen durch unablässige Verfolgungen sehr scheu geworden. Die Nistzeit fällt in den Oktober bis Anfang November und das Gelege besteht in nur zwei Eiern. Nahrung: hauptsächlich Samen von Hülsenfrüchten. Ueber seine Sprachbegabung ist noch fast garnichts bekannt. Fräulein Chr. Hagenbeck hatte auf der „Ornis"-Ausstellung in Berlin i. J. 1880 zwei Köpfe zum Preise von 1000 Mark.

*

Das Geschlecht **Arara-Kakadu** [Microglossus, *Gffr.*] ist von Finsch mit diesem Namen belegt worden, weil die einzige, bisher bekannte Art gleichsam ein Mittelglied zwischen den beiden Papageiengeschlechtern, die ihr Name bezeichnet, bildet. Die besonderen Kennzeichen sind folgende: Schnabel größer als bei allen übrigen Papageien, viel länger als hoch, sperrend, stark seitlich zusammengedrückt, First fast gekielt, im Halbkreis herabgebogen mit sehr langer verschmälerter, nach innen gekrümmter Spitze, Schneiden mit gerundeter Bucht und rechtwinkligem Zahnausschnitt, Dillenkante sehr breit; Nasenlöcher rund und klein und wie die Wachshaut und Zügel mit kurzen Sammtfederchen bedeckt; Zunge dunkelroth, fleischig, walzenförmig, oberseits löffelartig, mit horniger eichelförmiger schwarzer Spitze; Kopfseiten, Gegend neben dem Oberschnabel, unterhalb des Auges bis zum Ohr und bis zum Grunde des Unterschnabels, nackt; Flügel ziemlich lang, mit kurzer Spitze; Schwanz

Digitized by Google

lang, breit abgerundet; Füße kräftig, kurz und dick, Krallen nicht stark und wenig gekrümmt; Gefieder weich, jede Feder gerundet, mit Puderdaunen; Haube hoch, in langen schmalen fein zerschlissenen, nach oben und hinten gekrümmten Federn bestehend; am Grunde des Unterschnabels lange zerschlissene Federn. Farbe schwarz. Ueber Rabengröße.

Der schwarze Arara-Kakadu

[Psittacus aterrimus, *Gml.*].

Schwarzer Rüsselpapagei, blos Ararakakadu, schwarzer Ararakakatu. — Great Black Cockatoo, Alecto Cockatoo, Great Palm Cockatoo. — Cacatois Alecto, Microglosse ou Arara noir a trompe. — Ara Kakketoe.

Wer diesen Kakadu lebend vor sich sieht, wird zugeben müssen, daß er als ein seltsamer, absonderlicher Vogel erscheint. Dr. Finsch hebt hervor, daß er große Aehnlichkeit mit den Araras habe, trotzdem aber entschieden ein Kakadu sei. Er ist am ganzen Körper tiefschwarz, schwachgrün glänzend, das ganze Gefieder mit feinem puderartigen Daunenstaub erfüllt, wodurch es mehr grauschwarz erscheint; Haube wie oben beschrieben; Schnabel schwarz, First und Seiten schwach heller blauschwarz; nackte Haut unterm Auge und neben dem Schnabel düsterorangefarben bis blutroth, mit helleren fleischfarbenen Adern; Füße und Krallen schwarz. Die Geschlechter sollen übereinstimmend sein, das Weibchen jedoch einen kürzern Schnabel haben. Ueber Rabengröße (Länge 68—80 cm; Flügel 38—42 cm; Schwanz 25—30 cm). Heimat: nördliches Australien und die nächstliegenden Inseln des Malayischen Archipels. Die erste Beschreibung gab van der Meulen (1707), dann Edwards (1764) die erste Abbildung und die wissenschaftliche Benennung Gmelin (1788). Ueber das Freileben berichtet Wallace. Seine Stimme ist ein langgezognes, schrilles, doch mehr klagend ertönendes Pfeifen. Sein Aufenthalt sind die niedrigen Waldgegenden, in denen er parweise oder in kleinen Familien zu finden; sein Flug ist langsam und geräuschlos. Nahrung: neben Sämereien die Kerne der Kanariennußbäume, deren sehr harte Schalen er mit dem gewaltigen Schnabel zu

Digitized by Google

öffnen vermag. Dr. E. von Martens beobachtete ihn in Bahai in der Gefangenschaft: „Ein drolliger Kerl, der steif dasitzt, mit rothem Gesicht, mächtigem Schnabel und stets aufgerichtetem Federbusch. Bei Annäherung eines Fremden oder auch aus Vergnügen läßt er rätschende Schreie hören." Nach den Berichten anderer Reisenden hält er sich in den dichten Wipfeln der höchsten Bäume auf, gleichviel ob dieselben im Dickicht oder frei stehen. Er ist munter und beweglich und eilt mit kräftigem Flügelschlag dahin. Die Pärchen zeigen sich sehr scheu. Die Jungen werden vielfach aus den Nestern gehoben und aufgefüttert, doch gelangen sie nur selten nach Europa. Im Jahre 1860 besaß Herr Direktor Westerman im zoologischen Garten von Amsterdam einen Ararakakadu, welcher unterwegs mit Kanariennüssen gefüttert worden und sich schwierig an Hanf u. a. gewöhnte, sich dann aber ganz wohl dabei befand. Dr. Max Schmidt erzählt von der gewaltigen Kraft seines Schnabels; er zerbiß Porzellangefäße und brach selbst in eine gußeiserne Pfanne eine Scharte. Er fresse Sämereien, vom Mais nur den mehligen Theil, auch gern rohes Fleisch und schlucke alles nur ganz fein zermalmt hinab. Seine Stimme erinnere an das Knarren einer Thür; die Reisenden bezeichnen sie als sonderbar schnarrend. Herr Karl Hagenbeck füttert ihn ganz ebenso wie die Langschwanzkakadus (s. S. 126). Von den großen Händlern wurde er in den letzteren Jahren von Zeit zu Zeit in den Handel gebracht. Herr A. E. Blaauw vermuthet, daß die reiner schwarzen Vögel mit lebhaft rothen Wangen, kürzerm Federbusch und kürzerm Schnabel alte Männchen seien, die helleren langschnäbeligen Vögel, welche auch nach zwei Jahren in der Gefangenschaft noch ganz gleich geblieben seien, die Weibchen. Herr Dr. Platen brachte in seiner Sammlung drei prächtige Exemplare dieser Art mit, welche sehr zahm waren und einige Worte sprachen. Für die

Digitized by Google

Liebhaberei hat auch dieser Vogel geringen Werth, da er nur als Schaustück für zoologische Anstalten oder als absonderliche Seltenheit bei einem sehr begüterten Liebhaber gelten kann. Preis 450 bis 600 M. für den einzelnen.

*

Als **Keilschwanzkakadu** [Callipsittacus, *Lss.*] bezeichnet man das letzte Geschlecht der Kakadus, welches ebenso wie das vorige nur eine Art enthält, die sich aber als überaus abweichend von allen anderen hierhergehörenden Vögeln zeigt. Dem deutschen Namen entsprechend hat dieser Papagei einen langen stufenförmigen Schwanz, an welchem die beiden mittelsten Federn weit und spitz hervorragen. Gould, Schlegel und Finsch stellten ihn trotzdem zu den Kakadus, und ich befolge diese Anreihung, obwol der Vogel neuerdings abgezweigt und wieder zu den Plattschweifsittichen gezählt worden. Seine besonderen Kennzeichen sind folgende: Schnabel übereinstimmend mit dem der eigentlichen Kakadus, nur schwächer, First mehr zusammengedrückt, etwas kantig, Spitze nicht sehr verlängert; Nasenlöcher rund, frei mit aufgetriebenen Rändern in deutlicher Wachshaut; Zunge kurz, dick, abgerundet, an der Spitze mit löffelartiger Vertiefung; Auge verhältnißmäßig klein, rund, Augenkreis nackt, Zügel befiedert; Flügel außergewöhnlich lang und spitz; Schwanz wie oben angegeben; Füße mittelmäßig, Krallen ziemlich schwach, doch spitz; Gefieder weich; Haubenfedern lang, schmal, weit, faserig, die längsten etwas nach oben gekrümmt; Bartfedern neben dem Unterschnabel verlängert und breit (alle übrigen Merkmale sind in der Beschreibung der Art selbst nachzulesen).

Der Keilschwanzkakadu

[Psittacus Novae-Hollandiae, *Gml.*].

Nymfensittich, Nymfenkakadu, blos Nymfe, Korella, Kakadille, Falkenkakadu, neuholländischer Keilschwanzkakatu. — Crested Ground Parrakeet, Crested Grass Parrakeet, Cockatoo Parrakeet, Cockatile, Coccateel, Coccatiel, Joey. — Callopsitte, Perruche callopsitte, Nymphique. — Wigstaart-Kakketoe of Kakatilje.

Als eine der gemeinsten Erscheinungen des Vogelmarkts würde der Nymfenkakadu für die Leser dieses Werks wol

Digitized by Google

schwerlich irgendwelchen Werth haben, wenn nicht neuerdings festgestellt wäre, daß einzelne Köpfe einige Worte nachplappern lernen. Er erscheint als hübscher oder doch komischer Papagei und hat für die Züchter dadurch Werth, daß er in der Vogelstube sich friedlich zeigt und unschwer nistet. Im übrigen aber ist er ein recht langweiliger Vogel, der noch dazu durch sein eintöniges anhaltendes Geschrei überaus lästig werden kann.

Der Keilschwanzkakadu wurde von Gmelin (1788) beschrieben und benannt. Das Männchen ist an Haube, Vorderkopf, Zügeln, Wangen, Bartfedern und Oberkehle lebhaft hellgelb; an der Ohrgegend ein runder gelbrother Fleck; Oberseite bräunlichaschgrau; Unterrücken und obere Schwanzdecken hellaschgrau; Flügel schwärzlichgrau, mit sehr breiter weißer Längsbinde, unterseits bräunlichgrau; mittelste Schwanzfedern hellgrau, die übrigen dunkelgrau, unterseits alle schwarz; ganze Unterseite heller als die obre, schwachbräunlichaschgrau; untere Schwanzdecken heller und reiner grau (der Farbenton des Gefieders wechselt von fast rein aschgrau bis olivengrünlichgraubraun); Schnabel horngrau, am Grunde braun; Wachshaut grau; Auge dunkelbraun, Augenkreis grau; Füße hellaschgrau, Krallen schwarz. Das Weibchen hat einen kleinen gelben Stirnfleck; Oberkopf und Haube graugelb; vordere Wangen aschgrau; Ohrfleck düsterorangegelb; Bartfedern graugelb; Unterrücken und Bürzel aschgrau, fein gelb marmorirt; ganze übrige Oberseite bräunlichaschgrau; die breite Längsbinde über den Flügel nicht rein-, sondern gelblichweiß; obere Schwanzdecken grau, gelb marmorirt; die ganze Unterseite heller, schwachgelblichgrau; Schwanz grauschwarz, gelb marmorirt, unterseits grau, gleichfalls gelb marmorirt; Hinterleib und untere Schwanzdecken breit gelb und grau quergewellt. Jugendkleid: dem alten Weibchen ähnlich, aber düstrer braungrau; Ohrfleck düsterbräunlichgelbroth; beim jungen Männchen schon die Kopfseiten schwachgelblich; Unterleib und untere Schwanzseite lebhaft gelb marmorirt, Unterseite des Flügels mit breiten weißen Querbinden. Kaum Dohlengröße (Länge 30—33 cm; Flügel 15,9—16,6 cm; Schwanz 14—15,9 cm).

Als seine Heimat ist fast ganz Australien bekannt. Seinen Aufenthalt bilden hauptsächlich die weiten Ebenen im Innern,

Digitized by Google

doch kommt er als Zug- oder wol nur Strichvogel zeitweise in großen Schwärmen unregelmäßig in den verschiedensten Oertlichkeiten vor. Er ist ein ausgezeichneter Flieger. Hurtig auf der Erde umherlaufend, suchen die Nymfen ihre Nahrung, welche vornehmlich in Gräsersämereien besteht; aufgescheucht fliegen sie nur auf die nächsten Gummibäume, in deren Höhlungen auch, jedoch stets nur in der Nähe des Wassers, das Nest sich befinden soll. Die Nistzeit fällt in die Monate Februar bis einschließlich März. Obwol sie den Nutzgewächsen der Ansiedler nicht besonders schädlich sind, so werden sie doch als wohlschmeckendes Wildbret eifrig verfolgt, auch zahlreich als Junge aus den Nestern geraubt und aufgezogen, in ganzen Schwärmen aber in Netzen an der Tränke gefangen.

Die Entwicklungsgeschichte dieses Vogels ist in der Gefangenschaft genau erkundet, und dadurch sind die obigen Angaben Gould's wesentlich ergänzt worden. Er wird bereits seit dem Jahre 1846 gezüchtet und ist in zahlreichen Vogelstuben oder Käfigen als Heckvogel zu finden. Sein Gelege besteht in 4 bis 6, ja bis zu 11 Eiern, und da er in der Gefangenschaft regelmäßig zwei bis drei und selbst mehrere Bruten hintereinander macht, so wird gleiches auch wol in der Freiheit der Fall sein. Zugleich gehört er zu den kräftigsten und ausdauerndsten Stubenvögeln und man hat ihn auch schon vielfach im ungeheizten Raum, ja selbst im Freien, überwintert. Näheres Eingehen auf die immerhin interessante Züchtung muß ich mir hier versagen; die ausführliche Schilderung ist ja in meinen Seite 5 erwähnten Büchern zu finden.

Im Käfig zeigt sich der Keilschwanzkakadu meistens recht einfältig und dummschen; dagegen gilt er in seiner Heimat als gut abrichtungsfähig und sprachbegabt. Will man einen derartigen Versuch mit ihm anstellen, so muß man junge, soeben erst völlig flügge gewordene (also schon selbst fressende) Nymphen

Digitized by Google

dazu nehmen und nach der Anleitung S. 58 ff. zum Sprechen abrichten. Ein solcher Vogel wird überraschend bald zahm und zutraulich und lernt, wie schon gesagt, einzelne Worte, allerdings nur mit dünner Kinderstimme, nachplappern, auch Melodieen nachflöten und manchmal allerlei Vogellieder nachsingen. — Der Nymphensittich wird alljährlich in bedeutender Anzahl lebend eingeführt und zugleich ziemlich zahlreich gezüchtet; trotzdem ist er nicht immer und auch nicht sehr häufig auf dem Vogelmarkt vorhanden. Der Preis wechselt zwischen 20, 24, 30 bis 36 M. für das Pärchen; Sprecher dieser Art sind meines Wissens bisher noch nicht ausgeboten worden.

* * *

Die Loris oder Pinselzungenpapageien [Trichoglossinae] bilden eine Unterfamilie der Papageien, welche sowol im Wesen und in fast allen übrigen Eigenthümlichkeiten, als auch namentlich in der Ernährung, bedeutsam abweichend von allen Verwandten erscheint. Zunächst fallen sie als die farbenprächtigsten und besonders farbenglänzendsten, zugleich aber auch durch vorzugsweise anmuthige Gestalt, ins Auge; sodann zeigen sie ein absonderlich kluges und keckes Benehmen mit seltsamen, hastigen und stürmischen Bewegungen, freilich jedoch zugleich leichte Erregbarkeit und schrilles, mißtönendes Geschrei.

Als gemeinsame Kennzeichen der drei Geschlechter: Breitschwänze oder eigentliche Loris (Domicella, *Wgl.*), Stumpfschwanzloris oder Nestorpapageien (Nestor, *Wgl.*) und Spitzschwänze oder Keilschwanzloris (Trichoglossus, *Vgrs.*), in welche ich nach Dr. Finsch die Pinselzüngler scheide, sind folgende zu nennen: Schnabel seitlich zusammengedrückt, Dillenkante in schiefer Richtung aufsteigend, die innere Schnabelspitze ohne die bei fast allen übrigen Papageien vorhandenen Feilkerben; ein Hauptmerkmal aber ist die pinselähnliche oder richtiger bewimperte Zunge. Ihre Verbreitung erstreckt sich über Australien nebst den dazu gehörenden Inseln, den indischen Archipel (jedoch ohne die Sundainseln) und Polynesien.

Digitized by Google

Der eigenartigen Gestalt ihrer Zunge entsprechend ernähren sie sich von süßen, saftigen Früchten und anderen weichen Pflanzentheilen, dem Honigsaft der Blüten und zweifellos auch von thierischen Stoffen, Insekten, Weichthieren u. a.; Steinfrüchte, allerlei Nüsse, können sie ihres Schnabelbaus wegen, insbesondre weil ihnen die Feilkerben fehlen, wol kaum öffnen; viele Arten dürften dagegen auch mehlige und ölige Sämereien fressen, wenigstens nehmen sie dieselben in der Gefangenschaft an. Die Lebensweise ist bisher erst wenig erforscht. Offenbar sind sie, ihrer Ernährung gemäß, Baumvögel. Sie leben, soviel bis jetzt bekannt, gesellig, zu Zeiten in mehr oder minder vielköpfigen Schwärmen, auch zu mehreren Arten beisammen. Ein in Blüte stehender Gummibaum, auf welchem die bunten Vögel sich umhertummeln, soll einen prächtigen Anblick gewähren. Ihr Flug ist hurtig und gewandt, im Gezweige laufen und hüpfen sie viel mehr als sie klettern und auf der Erde bewegen sie sich komisch seitwärts hüpfend und kopfnickend und unter anderen drolligen Geberden. Manche Arten sollen in den Löchern der Gummibäume auch gesellig nisten. Die Brutentwicklung ist von den Reisenden erst wenig oder garnicht erkundet. Obwol die Loris kaum erheblichen Schaden an den Nutzgewächsen anrichten, allenfalls an werthvollem Obst, und trotzdem ihr Fleisch auch nicht schmackhaft sein soll, so werden sie in neuerer Zeit doch viel verfolgt; dadurch, namentlich aber durch das Fällen der Gummibäume, sind sie gleich den Kakadus u. a. aus den bewohnten Gegenden immer mehr verdrängt worden. Früher erlegten die Eingeborenen sie nur, um sich mit ihren auf Fäden gereihten Köpfen zu schmücken, und die Ansiedler schossen sie hin und wieder der bunten Federn halber, auch wurden sie in verhältnißmäßig geringer Zahl aus den Nestern geraubt, aufgefüttert und zum Markt gebracht; jetzt dagegen fängt man in großen Netzen ganze Schwärme, um sie nach Europa auszuführen. Vielfach werden sie auch in der Heimat, insbesondre in Indien, als Stubenvögel gehalten, und zwar meistens an einen Ring aus Kokusnußschale oder Büffelhorn gekettet; nicht selten sieht man sie bei der Ankunft noch mit einem solchen am Fuß.

Die Einführung nimmt gegenwärtig in immer steigendem Maße zu, und es ist wol erklärlich, daß diese schönen und interessanten Vögel viele und eifrige Liebhaber finden. Leider stehen ihrer Verallgemeinerung aber bedeutsame Hindernisse entgegen, einerseits in

Digitized by Google

ihren hohen Preisen und andrerseits in ihrer wirklichen oder vermeintlichen Hinfälligkeit, sodaß eigentlich nur wohlhabende und für sie begeisterte Vogelfreunde, die zugleich eine mühsame und kostspielige Fütterung nicht scheuen, sie anschaffen können. Bis vor kurzem glaubte man nämlich, daß sie alle oder doch die meisten Arten garnicht für die Dauer am Leben zu erhalten seien, die Erfahrung hat jedoch ganz andere Thatsachen ergeben; kaum zehn Jahre sind es her — und seitdem ist wenigstens eine Art, der Lori von den blauen Bergen, in zahlreichen Vogelstuben eingebürgert und bereits vielfach, ja sogar in mehreren Generationen, gezüchtet worden. Ebenso haben sich zahlreiche andere Arten bei angemeßner Verpflegung in der Gefangenschaft vortrefflich ausdauernd gezeigt, selbst diejenigen, welche sich garnicht an Sämereien gewöhnen lassen, sondern lediglich mit Frucht- und Weichfutter erhalten werden müssen.

Unter den Papageienpflegern und -Kennern, welche die Loris bisher beobachtet haben, steht Herr Gymnasialdirektor Scheuba in Olmütz hoch obenan, und ihm verdanken wir vorzugsweise werthvolle Mittheilungen über die Eigenthümlichkeiten dieser Vögel, sowie Rathschläge für ihre Verpflegung. Ich nehme zunächst also auf dieselben Bezug:

Die Hinfälligkeit der Loris oder vielmehr die Meinung, daß alle Pinselzüngler überaus weichlich seien, begründet sich darin, daß diese Vögel während der Ueberfahrt fast immer ohne Kenntniß behandelt und daß sie regelmäßig an eine Nahrung gewöhnt werden, welche ihnen vielleicht in heißen Gegenden zuträglich, in unserm Klima aber nur zu leicht verderblich wird, der gekochte Reis nämlich. Derselbe ist zu wenig nahrhaft, sodaß ihn der Vogel in großen Massen hinabschlingen muß, wodurch dann Verdauungsstörungen entstehen; zugleich säuert er bald, und kalt gegeben erkältet der reichliche Brei auch zu sehr den Magen; wenn dann noch dazu die übrigen unterwegs gegebenen Futtermittel, aufgequellter Sago, Bananen, Pisang- u. a. Tropenfrüchte mangeln und unsere nordischen gereicht werden müssen, so ist der bereits unpäßliche Vogel umsomehr Krankheiten ausgesetzt. Seitdem ich den Reis durch zweckmäßigere Futtermittel ersetzt, ergeben meine mehrjährigen Erfahrungen, daß die Loris sämmtlich ohne Ausnahme sich nicht weichlich zeigen, namentlich aber wenn sie gesund herüberkommen und wennmöglich schon

Digitized by Google

bei der Einführung an die Fütterung von altbacknem, eingeweichtem und dann gut ausgepreßtem Weizenbrot (Semmel oder Wecken) gewöhnt worden. Gutes Eierbrot ist gleichfalls zuträglich, darf jedoch nur mäßig gegeben werden; besser ist Kinder- oder Löffelbiskuit (jedoch ohne Pottasche gebacken). Alle letzterwähnten Futtermittel soll man nicht in Milch getaucht, bzl. eingeweicht reichen; an sich ist die Kuhmilch den Loris nicht schädlich, allein es kommen nicht selten Fälle vor, in denen das Vieh mit blähenden Stoffen, Kohl- oder Rübenabfällen u. drgl. gefüttert worden, und dann kann die Milch recht verderblich wirken. Alle Loris dürfen eigentlich erst dann für lebensfähig gehalten werden, wenn sie als Hauptfutter Sämereien und zwar Hanf- und Kanariensamen, fressen. Den Breitschwanzloris, welche schwer an Sämereien zu gewöhnen sind, mischte ich unter die feuchte Semmel gequetschten Hanf und brachte sie so zur Annahme des Samenfutters. Alle Pinselzüngler lassen sich umsoeher an die Fütterung mit Sämereien bringen, je jünger sie sind. Der erfahrene Thierhändler Fluck in Wien sagt, solange die Loris lediglich Weichfutter fressen wollen, zeigen sie eine Eigenschaft, welche sie für den Liebhaber geradezu unerträglich macht; an das Gitter sich hängend, spritzen sie ihre flüssigen Entlerungen weit hinaus und verunreinigen das Zimmer. Scheuba meint aber, daß dies nicht so schlimm sei, da es nur zeitweise geschehe, nämlich nach reichlicher Gabe von Weichfutter, eingeweichter Semmel und weicher Frucht, dagegen abnehme, jemehr die Vögel sich an Sämereien gewöhnen. Als zuträgliche Futterzugabe empfiehlt letztrer wie S. 46 angegeben gekochten Mais und zwar für jeden Kopf nur fünf bis sechs Körner täglich; besser noch ist, nach meiner Meinung, frischer, in Milch stehender Mais, den man freilich nur kurze Zeit erlangen kann; gleicherweise auch Hafer, Kanariensamen, Hirse und Gräsersämereien in frischen Aehren. Durchaus nothwendig für alle Loris sind gute, weiche Früchte; Scheuba gibt Stückchen von den besten Kranzfeigen, ich halte aber gute und vollgereifte Kirschen, Birnen, Aepfel oder Weintrauben, je nach der Jahreszeit, für zuträglicher und besonders auch reife, sorgsam ausgesuchte Ebereschen oder Vogelberen. Als Grünzeug empfiehlt Scheuba frische Fichtenzweige und die erwähnten frischen Getreideähren, doch darf man auch Weidenzweige und die saftigen Ranken von wildem Wein reichen, für den Winter empfehle ich hin und wieder etwas Doldenriesche. Allen

Digitized by Google

seinen Loris spendet Scheuba wöchentlich ein- bis zweimal eine Gabe von Zuckerwasser, und sobald einer erkrankt, reicht er es ihm sogar mehrmals täglich. Er hält die ostindischen Arten in einer Wärme von 15 bis 18 Grad R., und die australischen fühlen sich bei 10 bis 12 Gr. R. sehr wohl. Man soll aber stets dafür sorgen, daß die Luft nicht zu trocken sei und daher ein Gefäß mit Wasser auf den Käfig stellen oder einen großen genäßten Badeschwamm oberhalb desselben aufhängen; besser dürfte es sein, wenn man den Käfig mit recht feucht zu haltenden Blattpflanzen umgibt, doch sind dieselben so anzubringen, daß die Loris keinenfalls nach Belieben von dem Blätterwerk fressen können. Alle zwei bis drei Wochen überbraust er seine sämmtlichen Loris mit Rum-Wasser (1 : 4) oder Weißwein-Wasser (3 : 1); dieser wie jener muß jedoch von bester Beschaffenheit sein. Ebenso baden sie alle eifrig selbst, jedoch nicht so gern wie andere Papageien, sondern am liebsten, indem sie den Badenapf umstürzen und sich dann im nassen Sande herumwälzen. Nach dem Bade ist Zugluft und Erkältung besonders sorgsam zu vermeiden. Gefahrdrohende Einflüsse, so vornehmlich Tabaksrauch oder das unvorsichtige Anfassen der Futtermittel mit von Schnupftabak u. drgl. beschmutzten Fingern wirkt bei den Loris noch schlimmer als bei anderen Papageien. Zu ihrem Wohlgedeihen ist sodann nicht allein verständige, sondern auch liebevolle Behandlung entschieden nothwendig; jede Gemüthserregung, Schreck, Beängstigung, nicht minder aber Sehnsucht nach dem Pfleger oder Gram über Vernachlässigung kann ihnen Erkrankung oder gar den Tod bringen. Einzelne von ihnen dürfen allerdings als arge Schreier gelten, im Grunde aber obwaltet in dieser Hinsicht dasselbe Verhältniß wie bei anderen sprachbegabten Vögeln; sobald sie in der Abrichtung Fortschritte machen, unterlassen sie allmälig das Geschrei.

„Was das Sprachtalent der Loris anbelangt," sagt Herr Scheuba, „so hört man die widersprechendsten Urtheile; nach dem Einen soll der schwarzkäppige, nach dem Andern der mit gelbem Mantelfleck, nach dem Dritten der Frauenlori u. s. w. sich fast ganz ungelehrig zeigen; ich meine aber, bei der unstreitig hohen Begabung aller Arten, selbst der kleinen, wie Schmucklori, Schwalbenlori u. a., hänge die Entwicklung der gewiß vorhandnen Anlage zum Sprechenlernen namentlich von der Behandlung in der ersten Jugendzeit und von der Individualität des Vogels ab. Dies sehe ich z. B. auffallend bei meinen beiden

Digitized by Google

blaubrüstigen Loris, denn während der ältre niemals einen Laut hören ließ, der einem Wort auch nur ähnlich klang, plappert der andre, offenbar ein sehr junger Vogel, fortwährend allerlei. Wer Loris als Sprecher abrichten will, muß sie jedenfalls einzeln, entfernt von dem Locken und Schreien anderer, halten. Die Verschiedenheit der Geschlechter ist hinsichtlich der Sprachbegabung entschieden bedeutungslos. Nach meiner Ueberzeugung werden die Loris, wenigstens die größeren Arten, an Bildungs- und Erziehungsfähigkeit von keinen anderen Papageien übertroffen. Allerdings gibt es auch unter ihnen einzelne mürrische, unzugänglich bleibende Vögel, und zugleich kann nicht geleugnet werden, daß sie durch unverständige Behandlung nur zu leicht gründlich verzogen, launisch, eigensinnig und widerspenstig gemacht werden können." Die alten Schriftsteller, so schon Seba (1734), dann Edwards, Buffon bis zu Bechstein, rühmen einzelne Arten als vortreffliche Sprecher, und dies bestätigt auch der Reisende Dr. A. B. Meyer, welcher sie in der Heimat kennen gelernt hat, indem er hinzufügt, man darf sie zu den am meisten schwatzenden Papageien zählen, allein sie verlangen mühsamen und lange andauernden Unterricht, und namentlich muß man sich beständig mit ihnen beschäftigen.

Außer den eingangs gerühmten angenehmen Eigenschaften hebt Schenba noch ihre komischen Spiele und Balgereien, bei denen bald der eine, bald der andre auf dem Rücken liegt und mit Füßen und Schnabel den andern abzuwehren sucht, ferner die schlanke, zierliche Gestalt und die völlige Gefahrlosigkeit ihrer Bisse im Verhältniß zu denen vieler anderen, insbesondre größerer Papageien, hervor. Er meint, sie müssen sich immer mehrere Freunde und vor allem Freundinen erwerben.

*

Die Breitschwanz- oder eigentlichen Loris [Domicella, *Wgl.*] sind die zierlichsten und anmuthigsten unter allen; obwol beweglich und lebendig, erscheinen sie doch sanfter und nicht so stürmisch wie die spitzschwänzigen Verwandten. Ihre besonderen Merkmale sind folgende: Schnabel kräftig, meistens so hoch wie lang, seitlich zusammengedrückt, Oberschnabel mit abgerundeter First, stark gebogner Spitze und sanft ausgebuchtet, Unterschnabel gleichfalls zusammengedrückt, mit gerader, nur zuweilen wenig bogiger Dillenkante,

Digitized by Google

Schneiden ohne Ausbuchtung; Zunge dick, fleischig, vorn löffelartig vertieft, an der Spitze mit faserigen, beweglichen Papillen; Nasenlöcher rund, frei, in schmaler Wachshaut; Auge dunkel, braun bis orangeroth; Augenkreis fast immer nackt; Füße kräftig, Krallen stark gekrümmt; Flügel lang und spitz; Schwanz kurz, gerundet, aus breiten gleichmäßig gestuften Federn bestehend; Gefieder derb, aus ziemlich harten Federn im Nacken, an Hals und Oberseite aber aus langen zerschlissenen gebildet, zuweilen ein unregelmäßiger Schopf, Färbung glänzend; Geschlechter wahrscheinlich nicht verschieden; Gestalt schlank. Sperlings- bis Dohlengröße. Sie sind weit verbreitet und zwar über die Molukken und Polynesien. Ihr Freileben ist fast noch garnicht erforscht; so viel bis jetzt bekannt, führen sie die in der allgemeinen Uebersicht angegebne Lebensweise. Die kleinsten Arten sollen sich, wenigstens zu Zeiten, ausschließlich vom Honigsaft der Blüten ernähren.

Einige Arten gehören zu den seit altersher bekannten und lebend eingeführten Schmuckvögeln, welche schon in ihrer Heimat zahlreich in Käfigen oder an Fußketten gehalten werden und einen Handelsgegenstand bilden, der in neuerer Zeit immer ausgibiger geworden ist. Die meisten von ihnen lassen sich schwer, einige aber garnicht, an Sämereien gewöhnen, daher sind sie auch schwieriger in der Gefangenschaft zu erhalten als die nahverwandten Spitzschwänze. Erklärlicherweise ist die Gefahr während des Uebergangs zu den fremden Nahrungsmitteln und dem veränderten Klima zugleich am größten; sind sie erst eingewöhnt, so zeigen sie sich schon eher ausdauernd, doch können sie, wie schon erwähnt, weniger als die anderen, Kälte oder Zugluft ertragen. In ihren Reihen gibt es eine beträchtliche Anzahl von Sprechern und nach meiner Ueberzeugung müssen sie sich, sobald sie häufiger eingeführt und im Gefangenleben mehr erforscht werden, sämmtlich oder doch in allen größeren Arten als sprachbegabt erweisen, freilich immer nur in geringem oder höchstens mittelmäßigem Grade. Im Verhältniß ihrer ungemein leichten und rasch fortschreitenden Zähmung und Abrichtung unterlassen sie auch allmälig das allerdings schrille und manchmal recht lästige Geschrei. Die meisten Arten stehen noch überaus hoch im Preise.

Digitized by Google

Der schwarzkäppige Breitschwanzlori

[Psittacus atricapillus, *Wgl.*].

Violettkäppiger Lori, schwarzköpfiger Lori, Schwarzkappenlori, schwarzstirniger Frauenlori, Erzlori. — Black-bonnet Lory, Blue-headed Lory, Purple-capped Lory. — Perruche Lori à calotte noire, Lori à collier. — Purperzwartkop Loeri.

Absonderlich schön ist dieser Papagei, der unter den Pinselzünglern obenan steht, weil er zu den begabtesten und am längsten bekannten von ihnen zugleich gehört. Er wurde schon von Seba (1734) beschrieben, von Edwards und dann von Brisson abgebildet, aber erst von Wagler (1832) ist seine wissenschaftliche Benennung richtiggestellt worden.

Er erscheint an Stirn und Scheitel tiefschwarz; Hinterkopf mit kaum bemerkbar schopfartig verlängerten Federn violettschwarz; Zügel, Kopfseiten, Kehle, Hals und Nacken dunkelkarminroth; Mantel, Rücken, oberseitige Flügel- und Schwanzdecken heller blutroth; Flügel dunkelgrasgrün; Schultern gelbbräunlich; Schwingen grün, Innenfahne gelb, Spitze schwarz, Schwingen unterseits schwarzgrau mit breiter gelber Querbinde; Flügelbug und kleine unterseitige Flügeldecken dunkelblau; Schwanz karminroth, breiter Endrand purpurbraun, Schwanz unterseits etwas heller; ganze Unterseite hell karminroth; Brustschild hochgelb; Schenkel zyanblau; Schnabel orangeroth; Wachshaut schwärzlich; Auge braun, bräunlichgelb bis gelbroth, um die Pupille ein schmaler hellgelber Ring; nackter Augenkreis schwärzlich; Füße schwärzlichgrau, Krallen schwarz. (Das Brustschild ist zuweilen nur gelb und roth gescheckt und manchmal fehlt es ganz; die grünen Flügel sind zuweilen gelb gefleckt, der Unterrücken ist grünlichgelb und auch andere Abweichungen kommen vor). Dohlengröße (Länge 27—29,5 cm; Flügel 15—17 cm; Schwanz 9—11 cm.). Als seine Heimat ist bis jetzt nur Ceram und Amboina erkundet.

Sonderbarerweise ist über sein Freileben noch fast garnichts bekannt; umsomehr eingehende Mittheilungen liegen aber über sein Gefangenleben vor. Nach Angaben von Dr. E. v. Martens wird er von Ceram oder Amboina nach Java und dann nach Europa gebracht und übersteht die Reise nach dem erstern vor-

Digitized by Google

trefflich, weniger gut aber die nach dem letztern. Neuerdings lassen ihn die Großhändler meistens direkt überführen.

Bereits Buffon schildert ihn als Stubenvogel, lobt ihn als zutraulich und als hervorragend begabt; er lerne am leichtesten und deutlichsten unter allen Loris sprechen, sei jedoch zart und schwierig zu erhalten. Auch Bechstein sagt Aehnliches; nach dem letztern Schriftsteller ist er sogar „der gelehrigste, gesprächigste, zahmste, artigste und zärtlichste unter allen Papageien; er spricht beständig, doch schnarchend wie ein Bauchredner, ahmt auch hellflötend alles nach, was ihm vorgepfiffen wird und will dabei immer unterhalten und geliebkost, sowie auch gut gewartet und gepflegt sein, und alles was er thut, geschieht hurtig."

In diesen beiden Aussprüchen ist in der That das Wesen dieses Pinselzünglers treffend geschildert und was seitdem die Erfahrung vieler liebevollen Pfleger festgestellt, hat die Angaben der beiden älteren Schriftsteller bestätigt, nur insofern freilich, daß alle Loris keineswegs zu den hochbegabten und am höchsten stehenden Sprechern gehören. Wie die übrigen bringt es auch der schwarzkäppige Lori nur zum Nachplappern einzelner Worte oder allenfalls einiger kurzen Sätze, die er mit hoher und klarer Stimme rasch und hastig ausstößt. Obwol er zu den bekanntesten Erscheinungen im Vogelhandel gehört, so ist er doch keineswegs gemein, sondern wird nur hin und wieder einzeln eingeführt. Als absonderlicher Schmuckvogel ist er vornehmlich bei wohlhabenden und hochstehenden Persönlichkeiten zu finden und meistens auch sehr beliebt; mancher aber macht sich als unverbesserlicher Schreier geradezu unausstehlich, obgleich sein Geschrei nicht so schrill wie das anderer Verwandten, sondern mehr pfeifend erschallt. In mehreren Fällen hat er sich lange Jahre im Käfig erhalten, so der schwarzkäppige Lori der Frau Prinzeß Karl von Preußen, welcher nach deren Tode sich im

Digitized by Google

Besitz des Prinzen befindet und wol schon gegen 20 Jahre im Käfig lebt. Hinsichtlich der Fütterung muß ich mich auf das in der Einleitung Gesagte beziehen und will nur hervorheben, daß er zu den Pinselzünglern gehört, welche sich am schwierigsten an Sämereien gewöhnen lassen. Der Preis schwankt zwischen 75, 90 bis 100 M. für den frischeingeführten und 120 bis 150 M. für den sprechenden Vogel.

Der Louisiade-Breitschwanzlori [Psittacus hypoenóchrous, *Gr.*] — Rothnacken-Lori, grünschwänziger Breitschwanzlori — Louisiade Lory — Perruche Lori de Louisiade — Louisiade Loeri — ist an Ober- und Hinterkopf schwarz; Oberrücken mit violettem Querband; Schultern bräunlicholivengelb; Schwingen an der Außenfahne dunkelgrasgrün, Innenfahne hochgelb, Endhälfte schwarz; oberseitige Flügeldecken grün, unterseitige scharlachroth; Schwanzfedern am Grunde scharlachroth, Endhälfte düsterolivengrün, zwischen beiden matt violett, unterseits olivengelb, am Grunde roth; ganze übrige Oberseite karminroth; schwache Halskrause und ganze übrige Unterseite roth, violett schillernd; Schenkelgegend und Hinterleib violettblau; Schnabel orangegelb; Wachshaut gelblichweiß; Auge braun bis braunroth; Füße und Krallen schwarz. Größe des schwarzkäppigen Lori. Heimat: Neuguinea, Neubritannien, und die Salomonsinseln. Diese Art war bis vor kurzem so selten, daß Finsch seine besondre Freude darüber aussprach, einen Balg vor sich gesehen zu haben; neuerdings aber ist sie von Fräulein Chr. Hagenbeck in einem Pärchen lebend eingeführt worden. Herr Direktor Scheuba, in dessen Besitz dasselbe übergegangen, schildert es in folgendem: „Es sind lebendige, ziemlich stürmische, aber garnicht scheue Vögel, welche die Eigenthümlichkeit zeigen, daß sie in der Erregung die violett schillernden, schmalen und langgestreckten Halsfedern sträuben, ferner daß der eine an der Sitzstange mit abwärts hängendem Körper hurtig entlang läuft, während der andre ruhig oben sitzt. Ihr Geschrei ist verschieden von dem aller verwandten, nicht pfeifend,

Digitized by Google

sondern ähnlich dem der Gänse. Sie scheinen recht kluge Vögel zu sein. Der genannte Kenner der Loris meint, es sei schwer zu entscheiden, ob diese Art jetzt zum erstenmal lebend eingeführt worden, denn sie sei ja eigentlich nur eine Spielart (oder wol Lokalrasse) des schwarzkäppigen Breitschwanzlori und möge schon mehrfach in den Handel gelangt, aber nicht unterschieden sein. Mit Bezug hierauf habe ich den Louisiade-Lori hier eingereiht, da ich doch wol mit Bestimmtheit annehmen darf, daß er wie jener sprachbegabt sein werde. Der Preis steht für den seltnen Vogel natürlich sehr hoch: 200 M. für das Par.

Der Breitschwanzlori mit schwarzem Halsfleck [Psittacus chlorocercus, *Gld.*] — grünschwänziger Lori, Grünschwanzlori — Green-tailed Lory — Perruche Lori à queue verte — Groenstaart Loeri — ist an Ober- und Hinterkopf tiefschwarz; Schwingen dunkelgrasgrün, Grundhälfte der Innenfahne roth; Deckfedern grün, unterseitige dunkelblau; Flügelrand lilablau; Schwanzfedern am Grunde düsterroth, Endhälfte grün, unterseits am Ende olivengelb; ganze übrige Oberseite glänzend karminroth; an jeder Halsseite ein tiefschwarzer Fleck; über die Oberbrust ein gelbes Band; Schenkelgegend dunkelblau; ganze übrige Unterseite karminroth; Schnabel orangegelblichgrau; Auge roth mit schmalem weißen Rand um die Pupille; Füße und Krallen schwarz. Größe des schwarzkäppigen Lori. Heimat: die Salomonsinseln. Er wurde von Gould erst im Jahr 1856 beschrieben und ist trotz äußerster Seltenheit in den Museen doch schon lebend eingeführt worden. Seine Lebensweise ist garnicht bekannt; dagegen gibt E. L. Layard die sehr hübsche Schilderung eines lebenden Pärchens, welches er von dem Reisenden Marler geschenkt erhalten. „Sie waren aus dem Nest in einer Baumhöhle geraubt. Der eine, wahrscheinlich das Männchen, war sehr lebhaft und thätig und ließ mancherlei Töne erschallen, aus denen man wol die Worte ‚Pretty Joey‘, wie sie Marler benannt hatte, vernehmen konnte, dann flötete

Digitized by Google

er lang und schrill und ließ auch noch andere Laute hören; das Weibchen war stiller. Sie tranken gern und viel Zuckerwasser, fraßen eifrig aufgeweichtes Brot, gekochte Kartoffeln, Reis, Yams- und Brotwurzel, sowie indische Feigen. Friedlich schmausten sie aus einem Gefäß oder von derselben Frucht, welche der eine in der Klaue hielt. Bei ihren lebhaften Bewegungen und Spielen hingen sie sich in allen möglichen Stellungen an, gleichviel mit einem oder beiden Füßen. Das Männchen war leidlich zahm und ließ sich anfassen. — Außer einem Pärchen, welches in den zoologischen Garten von London (1867) gelangt war, dürften sie noch nicht lebend eingeführt sein; ein Preis ist daher nicht anzugeben.

Der blauschwänzige Breitschwanzlori

[Psittacus lori, *L.*].

Frauenlori, Rothnackenlori. — Lady Lory, Blue-tailed Lory. — Perruche Lori des Dames ou Lori à scapulaire bleue. — Blauwstaart Loeri.

Es ist eine eigenthümliche, für unsre Liebhaberei aber überaus erfreuliche Erscheinung, daß die Papageien — und Vögel überhaupt —, welche in alten Zeiten Bewunderung erregt und Beifall gefunden haben, auch bis zur Gegenwart her sich fast immer gleicher Beliebtheit erfreuen; vor allem ist dies beim Frauenlori zutreffend. Nachdem er von Edwards (1751) beschrieben und von Linné (1761) benannt worden, beschäftigten sich mit ihm die alten Schriftsteller von Seba, Buffon bis zu Bechstein her, Alle haben ihn als schön, äußerst liebenswürdig und hochbegabt gepriesen, und in dieser Meinung stimmen mit den Aussprüchen jener auch die der Papageienkenner und -Pfleger in unsrer Gegenwart ziemlich überein, wenn sie ihn auch freilich nicht höher als die Verwandten, sondern mit denselben und besonders mit dem schwarzkäppigen Lori auf eine

Digitized by Google

Stufe stellen. Der letztern Art ist er auch in allen anderen Eigenthümlichkeiten ähnlich.

Er erscheint an Ober- und Hinterkopf tiefschwarz; Zügel, Kopfseiten, Nackenband, Kehle und Hals karminroth; Hinterhals und Mantel tiefblau, mit violettem Schein; Mittelrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken scharlachroth; Oberrücken mit blauschwarzem Querband; Schwingen an der Außenfahne dunkelgrasgrün, Innenfahne hochgelb, Ende schwarz, unterseits schwärzlichgrau mit gelber Querbinde; oberseitige Deckfedern grün, kleine Deckfedern am Flügelbug bläulich, kleine unterseitige Flügeldecken und Achselfedern scharlachroth; Schwanzfedern an der Grundhälfte scharlachroth, Endhälfte tiefblau, unterseits Grundhälfte roth, Endhälfte düsterolivengelb; Hals, Brust und Bauch tiefblau, mit violettem Schein; Brust- und Bauchseiten scharlachroth; Schenkelgegend, Hinterleib und untere Schwanzdecken hellblau; Schnabel orange- bis karminroth; Wachshaut düstergelb; Auge braun bis gelbroth, nackte Haut bräunlichgelb; Füße und Krallen schwarz. Größe nahezu die des schwarzkäppigen Lori (Länge 26—28 cm; Flügel 13,2—16,6 cm; Schwanz 8—10 cm). Es gibt Farbenspielarten ohne blaue Zeichnung an Hals und Oberbrust, mit rothem Streif über den blauen Mantel, mit schwarzem Querstreif in der Mitte der Schwanzunterseite, an Nacken und Hinterhals blau, mit schwarzen unterseitigen Flügeldecken und mit noch mancherlei anderen Abweichungen; auch die Größenverhältnisse sind schwankend. Bis jetzt ist noch nicht festgestellt worden, ob dies Alters-, bzl. Geschlechts- oder Oertlichkeitsverschiedenheiten sind. Als seine Heimat sind Neuguinea, Waigiu, Mysol, Salawatti und Batanta bekannt. Dr. Meyer berichtet, daß er auf Neuguinea sehr zahlreich vorkomme, häufig in der Gefangenschaft gehalten werde und vortrefflich sprechen lerne.

Herr Direktor Dr. Scheuba besitzt einen Frauenlori, welcher außerordentlich anschmiegsam und zutraulich sich zeigt, Küßchen gibt, sich rücklings auf die Hand legt, mit sich tändeln läßt und selber spielt wie ein Kätzchen, während er in großem Behagen oft frohlockend flötet; zu anderer Zeit, selbst manchmal nachts, pfeift er ziemlich scharf und schrill. Im Verhältniß zu

Digitized by Google

den nächst verwandten Loris erscheint dieser, wenn auch ebenso lebendig, doch viel ruhiger, gleichsam gesetzter. Er spricht ziemlich viel, wovon das Wort ‚Jako' deutlich zu verstehen ist, während das übrige wie englisch klingt; alles mit tiefem Ton, als käme es aus der wetterrauhen Kehle eines Matrosen. Er plaudert am liebsten abends und steckt dabei den Kopf in sein Futtergefäß, auch zeigt er viel Anlage, Lieder nachzuflöten. Dr. Platen brachte in seiner Sammlung 10 Köpfe mit. Im Handel und auf den Ausstellungen ist diese schöne Art leider recht selten. Preis 60, 75 bis 100 M. und darüber.

Der Breitschwanzlori mit gelbem Mantelfleck

[Psittacus garrulus, *L.*].

Lori mit gelbem Rückenfleck, Gelbmantellori, Ceram-Lori. — Ceram Lory, Chattering Lory, Crimson Lory. — Perruche Lori de Ceram. — Ceram Loeri.

Bis vor kurzem war der Lori mit gelbem Mantelfleck im Handel recht selten und erst in der neuesten Zeit ist er etwas häufiger eingeführt worden. Obwol er aber zu den seit altersher bekannten Vögeln gehört (bereits von Clusius 1605 erwähnt, von Linné beschrieben und benannt, von Edwards, Brisson u. A. schon gut abgebildet), so herrschten inbetreff seiner Begabung bis jetzt doch recht verschiedenartige Meinungen. Buffon schildert, welche Schwierigkeit es den Holländern anfangs verursacht habe, die Pinselzüngler und insbesondre diese Art, lebend nach Europa zu bringen.

Der Breitschwanzlori mit gelbem Mantelfleck ist scharlachroth, prächtig metallisch glänzend, mit einem dreieckigen tief zitrongelben Fleck in grüner Einfassung auf dem Oberrücken; die Schwingen sind an der Außenfahne grün, Innenfahne zinnoberroth, Spitzendrittel schwarz; die zweiten Schwingen an der Innenfahne schwarz, nur am Grunde roth; die großen oberseitigen Deckfedern

Digitized by Google

olivengrün; Flügelbug zitrongelb; kleine unterseitige Flügeldecken gleichfalls gelb; Schwanzfedern roth, an der Endhälfte dunkelgrün, unterseits purpurbraun, Ende düstergelb; ganze Unterseite einfarbig roth, nur die Schenkelgegend grün; Schnabel und nackte Haut um denselben orangeroth; Nasenhaut bläulichgrau; Auge gelbbraun bis rothgelb; nackter Augenkreis bläulichroth; Füße grauschwarz, Krallen schwarz. Auch bei dieser Art kommen Abänderungen vor, indem der Mantelfleck mehr oder minder große Ausdehnung hat, zuweilen düsterroth ist, auch wol ganz fehlt, und der Schwanz grün, manchmal blauschwarz bis blau gefärbt, ist. Größe nahezu die des schwarzkäppigen Lori (Länge 26—28 cm; Flügel 13,2 — 16 cm; Schwanz 8—10 cm).

Seine Heimat sind die nordöstlichen Molukken. Hinsichtlich des Freilebens ist nichts Näheres bekannt, doch wird er in demselben von den nächst verwandten Arten wol nicht abweichen. Seine Seltenheit im Handel trotz des sehr weiten Gebiets, in welchem er vorkommt, und obwol er vielfach aus den Nestern genommen und aufgefüttert wird, beruht wahrscheinlich darin, daß er bei den Eingeborenen selbst sehr beliebt sein, viel gehalten und verhandelt werden soll. Umsomehr interessant erscheinen uns daher die Aussprüche unserer neueren Stubenvogelpfleger und -Kenner.

Einer der bedeutendsten derselben, Herr E. von Schlechtendal, hatte diese Art als argen Schreier und wenig begabt bezeichnet; dies widerlegt Herr A. E. Blaauw in folgendem: „Vor einigen Jahren besaß ich längre Zeit hindurch einen solchen Breitschwanz mit gelbem Mantelfleck, welcher bedeutende Befähigung zeigte. Zunächst ahmte er alle ihm auffallenden Laute nach, lernte auch Vieles sprechen und trug es mit sanfter Stimme und oft, könnte man sagen, fast mit Verständniß vor. Er liebte mich leidenschaftlich und wenn er auf meiner Schulter saß, gerieth er in die größte Wuth, sobald eine fremde Person mich berührte, stürzte auf diese los und biß und schrie, sodaß ich Mühe hatte, ihn zu beruhigen. Ganz

Digitized by Google

genau wußte er zu unterscheiden, ob der Betreffende mich persönlich, meinen Stuhl oder sonst etwas in meiner Nähe anfaßte, in den letzteren Fällen blieb er ruhig. Immer war er sehr erregbar und heftig und wer ihm zu nahe kam und sich etwas gegen ihn erlaubte, wurde mit Schnabelhieben bestraft. Seine Stimme war nicht so metallisch scharf wie die der anderen Loris, allein dadurch, daß er dieselben Töne unzählige Male wiederholte, wurde er gleichfalls unausstehlich. Sobald ich ihn aber aus dem Käfig nahm, beruhigte er sich sogleich. Die größte Leckerei für ihn war Zuckerwasser, welches er mit seiner langen, beweglichen Zunge rasch aufleckte."

Aehnlich schildert ihn Herr Kreisgerichtsrath Heer, indem er sagt: „Mein Gelbmantel macht mir viele Freude. Er ist überaus lebhaft und läßt sich fortwährend hören und wenn er still ist, so hängt er sich gern mit den Füßen an die Sitzstange, sodaß der Körper nach unten baumelt. Obwol ich ihn am offnen Fenster frei auf dem Finger halte und trotzdem er gut fliegen kann, fällt es ihm doch nicht ein, zu entfliehen. Noch nie hatte ich einen Vogel, der so wunderbar zahm war. Er frißt nur eingeweichte Semmel mit etwas Zucker, und Zuckerwasser trinkt er leidenschaftlich gern. Ein besondres Vergnügen macht es ihm, wenn er sich bei mir zwischen Rock und Weste verkriechen kann."

Herr Scheuba meint, daß die geringre Gelehrigkeit, welche der Gelbmantel den Verwandten gegenüber zeige, wol darin liege, daß alles seine Aufmerksamkeit errege, ihm stehe der Schnabel niemals still und immerfort schreie er, wenn auch nicht sehr gellend. „Der meinige ist stark, kräftig und ziemlich ungestüm. Vom Sprechen ist nicht viel die Rede, denn er sagt nur das oft gehörte Wort ‚Wart, wart'; dies mag jedoch darin liegen, daß er mit einem schwarzkäppigen Lori Freundschaft geschlossen, sodaß beide sich um nichts andres be-

Digitized by Google

kümmern, sondern sich fortwährend in ihren Naturlauten unterhalten. Lasse ich sie beisammen, so entwickeln sie eine unendliche Zärtlichkeit gegen einander, doch muß ich dem Spiel immer bald ein Ende machen, denn der rauhe, stürmische Gelbmantel setzt dem schwächern Schwarzkopf so zu, daß dieser vor dem Uebermaß von Liebkosungen flüchten muß. Der erstre macht sich im Gegensatz zu allen übrigen wenig aus menschlicher Gesellschaft und beiläufig sei bemerkt, daß er bereits mehrmals Eier im Käfig gelegt hat." Herr E. Linden theilt mit, daß ein solcher Lori in seinem Besitz angenehm pfeift. Der Preis beträgt 60, 80 bis 120 M.; einmal wurde er zu 48 M. ausgeboten.

Der blauschultrige Breitschwanzlori

[Psittacus ruber, *Gml.*].

Scharlachrother Lori, blos rother Lori. — Red Lory, Moluccan Lory. — Perruche Lori rouge, Lori rouge. — Roode Loeri.

Der scharlachrothe Lori, wie er meistens heißt, wurde von Brisson (1760) zuerst beschrieben und von Gmelin benannt. S. Müller (1776) erzählt, daß es ihm Vergnügen gemacht habe, die schönen rothen Vögel in den Bäumen umherklettern zu sehen, während sie Früchte verzehrten und unaufhörlich schrieen.

Dieser Lori ist glänzend scharlachroth; die ersten vier Schwingen an der Außenfahne schwarz, die übrigen allmälig zunehmend roth, die letzten drei bis vier dunkelblau, an der Grundhälfte roth, alle unterseits rosenroth; zwei undeutliche schwarze Querbinden über den Flügel; hinterste Deckfedern an jeder Rückenseite einen großen blauen Fleck bildend; Schwanzfedern matt purpurbraun, unterseits düstrer; untere Schwanzdecken und breiter Fleck hinter dem Schenkel glänzend blau; Schnabel gelbroth, Wachshaut schwärzlichgrau; Auge braun bis gelbroth, nackte Haut schwärzlich; Füße schwärzlichgrau, Krallen

Digitized by Google

schwarz. Heimat: die Molukken, doch fehlt er auf den Arn-inseln. Ueber das Freileben ist wenig bekannt. Wallace sah ihn auf Amboina sehr häufig und sagt, daß er zahlreich auf die blühenden Bäume einfalle, um Blütensaft aufzusaugen.

Auch diese Art schildert Herr Scheuba in interessanter Weise. „Ein scharlachrother Lori zeigt sich an Sprachbegabung geradezu als einzig, zugleich ist er überaus zahm, zutraulich, liebenswürdig, gibt Küßchen, und ganz besondre Freude macht es ihm, wenn er mir morgens ins Bett gebracht wird, wo er sich mit Entzücken herumwälzt und allerlei Possen treibt. Auch außerdem ist er ungemein beweglich, und es duldet ihn nicht lange auf einem Fleck; so klettert er mir am ganzen Körper herum, springt dann auf den Tisch, zerreißt ein Stückchen Papier oder läuft am Beinkleid herab auf den Boden rasch hüpfend ein Endchen fort, um ebenso schnell zurückzukehren und wieder emporzusteigen. Im Käfig legt er sich oft rücklings auf den Boden nnd spielt mit Füßen und Schnabel mit Holzspänen, die er fein zerfasert. Er spricht mit hoher Frauenstimme, rasch und schnell, oft eine Viertelstunde lang und darüber, manchmal mit plötzlich wechselnder Stimme, als redeten zwei Personen. Dann erklingt es aber, als hörte man es aus der Ferne und man versteht nur einzelne Worte. Außerdem spricht er jedoch auch außerordentlich deutlich und klar viele Worte und ganze Sätze. Was er plaudert, lernt er nur von anderen sprechenden Papageien oder dadurch, daß mit ihm und den anderen Vögeln während des Fütterns und der Reinigung der Käfige gesprochen wird. Fast täglich plappert er etwas Neues nach, das er in dieser Weise aufgeschnappt hat, so plaudert er wol den ganzen Tag, am liebsten jedoch abends, wenn sein Käfig zugedeckt wird. Täuschend natürlich versteht er zu lachen. Sehe ich nachts in der Vogelstube nach und einige Vögel erwachen und schreien, so stimmt

Digitized by Google

dieser nur selten mit ein, sondern ruft mit zornigem Ausdruck ‚still Spitzbub!' oder auch mit dem Ton der Verwundrung ‚na, was ist!' In allem Diesen zeigt sich die ungewöhnliche Begabung und Gelehrigkeit des Vogels, und so könnte ich allerlei Scherze von ihm erzählen, wie er beim Zurückbringen in den Käfig mir in den Finger beißt und wenn ich dann das Schiebethürchen fallen lasse, mit triumphirenden ‚ha!' davonläuft, wie ausdrucksvoll er Freude und Leid, Sehnsucht und Vergnügen zu äußern vermag u. s. w. Er frißt feinstes Weizenbrot mit Biskuit gemengt, etwas gekochten Mais und getrocknete, aufgeweichte Ebereschenbeeren, außerdem auch Hanfsamen, Hafer und Weizen halbreif in Aehren, Feigen u. a. Frucht; ferner bekommt er frische Fichtenreiser. Wenn er sich recht satt gefressen hat, so holt er gleichsam wiederkäuend das Futter aus dem Kropf hervor, um es gemächlich wieder hinabzukauen." — Bis jetzt gehört der scharlachrothe Lori zu den seltensten im Handel und Dr. Platen hatte 7 Köpfe mitgebracht. Der Preis steht auf 75 bis 100 M. und darüber für den Kopf.

Der blaugestrichelte Breitschwanzlori [Psittacus reticulatus, *Mll. et Schlg.*] — gestreifter Lori, Strichellori — Blue-streaked Lory — Perruche Lori striée bleue — Blauwgestreepte Loeri — ist karminroth mit violettblauem Ohrfleck; Oberrücken blau längsgestrichelt, die vordersten Schwingen rußschwarz, die übrigen schwarz und roth; Deckfedern schwarz, roth gerandet; unterseitige Flügeldecken roth; Schwanzfedern an der Außenfahne schwarz, die beiden mittelsten einfarbig schwarz, alle unterseits roth, am Ende gelb; Brust violettblau angeflogen; Schenkelfleck violettblau; Schnabel orangeroth; Wachshaut schwärzlich; Auge braun bis braunroth, nackte Haut schwärzlich; Füße schwarzbraun, Krallen schwarz. Nahezu die Größe des schwarzkäppigen Lori (Länge 26—27 cm; Flügel 15,2 — 16,2 cm; Schwanz 11,3 — 12 cm). Heimat: Timorlaut. Er wurde von Latham (1822) und dann von Müller und Schlegel (1839) beschrieben und benannt.

Digitized by Google

Ueber das Freileben ist bis jetzt garnichts bekannt, doch dürfte er darin mit den Verwandten übereinstimmen. Obwol er in der Heimat recht zahlreich sein soll und nach Wallace vielfach zum Verkauf nach Makassar gebracht wird, sehen wir ihn bei uns doch nur selten auf dem Vogelmarkt. Dr. Platen hatte 16 Köpfe von Celebes mitgebracht und seitdem haben die Großhändler, so namentlich Fräulein Chr. Hagenbeck, hin und wieder einen eingeführt. Herr Scheuba berichtet, daß er vor einigen Jahren drei blaugestrichelte Loris bei einem Händler gesehen, von denen einer so zahm war, daß er seinem Herrn überall hin nachlief und sich krauen und streicheln ließ. „Er war ein allerliebster Vogel, allein er hatte gleich den beiden anderen eine metallisch scharfe Stimme, die noch dazu so oft laut wurde, daß er als Stubenvogel unerträglich erschien. Diese drei Loris kaufte Direktor Westerman für den zoologischen Garten von Amsterdam und soviel ich weiß, lebt der eine noch gegenwärtig dort." In seinem Wesen und in allen übrigen Eigenthümlichkeiten dürfte er mit dem schwarzkäppigen und Frauenlori übereinstimmen. Preis 60 bis 100 M.

Der blaubrüstige Breitschwanzlori

[Psittacus coccíneus, *Lth.*].

Blaustirniger Lori, Diademlori. — Blue-breasted Lory or Blue-diademed Lory. — Peruche Lori violette et rouge. — Blauw en roode Loeri.

Als die farbenprächtigste unter allen lebend eingeführten Arten von dem hervorragendsten Kenner der Breitschwanzloris, Herrn Scheuba, gerühmt und zugleich seit altersher bekannt, läßt sie es wiederum bedauern, daß sie zu den am seltensten zu uns gelangenden gehört.

Sie ist an Kopf, Kehle und Hals karminroth; über die Scheitelmitte von einem Auge zum andern eine blaue Binde; ober- und unterhalb des Auges bis zum Nacken jederseits ein dunkelblauer

Digitized by Google

Streif; Nacken und Mantel blau; Hinterrücken dunkelkarminroth; Bürzel und obere Schwanzdecken purpurbraunroth; Schwingen roth, schwarz gespitzt, unterseits mattroth; über die Flügel eine schwarze Querbinde; große oberseitige Flügeldecken roth, breit schwarz gesäumt; Schulterdecken purpurviolettschwarz; Flügelrand und unterseitige Flügeldecken roth; Schwanzfedern röthlichschwarzbraun, Innenfahne scharlachroth; ganze Unterseite karminroth; Unterbrust und Bauch dunkelblau quergestreift; Schenkel blau, roth quergestreift; untere Schwanzdecken roth, blau gescheckt; Schnabel düsterwachsgelb, Wachshaut bläulich; Auge bernsteinroth, nackte Haut schwärzlich; Füße bläulichaschgrau, Krallen schwarz; Größe nahezu die des schwarzkäppigen Breitschwanzlori (Länge 26—27 cm; Flügel 15,2—16,2 cm; Schwanz 11,3—12 cm). Heimat: die Shangirinseln. Dieser Lori ist schon von Latham (1790) beschrieben und benannt. Die älteren Schriftsteller haben aber nichts über ihn angegeben.

A. B. Meyer berichtet, daß er auf Celebes hin und wieder gefunden werde; er sei wol von eingeborenen Händlern nach Manado zum Verkauf gebracht, wie dies häufig geschehe, und dann entkommen. Auf allen hier einander nahe liegenden Inseln werde ein lebhafter Handel mit Natur- und einfachen Kunsterzeugnissen, Körben u. a. betrieben und bei demselben bilden die Loris einen Hauptgegenstand, weil sie hier überall sehr beliebte Hausvögel seien. „Ein blaubrüstiger Lori in meinem Besitz", schreibt er weiter, „war zahm und liebenswürdig gegen meine Frau, gegen mich aber bösartig. Er, wie alle diese Loris, lernt sprechen und zwar ebenso deutlich wie andere Papageien, aber nicht so leicht und gut wie die Kakadus oder Edelpapageien; er zieht es vor, zu kreischen und zu schreien, anstatt die Worte und Sätze, welche er kann, zu wiederholen. Die meisten Loris sterben während der Ueberfahrt und daher sieht man sie in Europa so selten".

Herr Scheuba fügt über einen in seinem Besitz befindlichen blaubrüstigen Lori folgendes hinzu. „Er ist der ruhigste und stillste unter allen und läßt nur abends sein Geschrei

Digitized by Google

hören, welches aber beiweitem nicht so scharf und schrill wie das der übrigen, sondern eher ein Gezwitscher oder Geplauder ist; nur in der Beängstigung stößt er kreischende Laute aus. Gar leicht ist er in Angst versetzt und dann läßt er sich schwer beruhigen. Im übrigen ist er ein sehr lieber Vogel, der sich recht zutraulich zeigt und zu den angenehmsten Loris überhaupt gehört, weder schmutzt, noch schreit und wol bald sprechen wird. Seine Begabung dürfte jedoch nicht hoch anzuschlagen sein, da er ziemlich unbeweglich und theilnahmlos auf seiner Sprosse sitzt. Ein zweiter, den ich später erhielt, war kaum halb so groß, am Hinterleib weniger ausgedehnt blau und an den Flügeln nicht stellenweise matt, sondern fast gelbroth. Feige und Kolbenhirse sind die Leckerbissen des erstern, welcher noch die Eigenthümlichkeit hat, daß er Nachts regelmäßig gegen 11 Uhr an das Futter geht und Hanf frißt, obwol es im Zimmer ganz finster ist." In der Sammlung des Herrn Dr. Platen befanden sich 7 Köpfe; im übrigen gelangt er äußerst selten in den Handel. Preis 75, 90 bis sogar 120 M.

Der violettnackige Breitschwanzlori [Psittacus riciniatus, *Bchst.*] — Kapuzenlori(!) — Violet-necked Lory — Lori à nuque violette — Blauwnek Loeri — ist am Vorderkopf scharlachroth; Hinterkopf, Nacken und Hals dunkelviolett; Oberrücken scharlachroth; Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken karminroth; Schwingen schwarzbraun, Enddrittel roth, die zweiten Schwingen am Ende breit schwarz, alle unterseits scharlachroth, Enddrittel grünlichschwarzgrau; zwei schwarze Querbinden über die Flügel; Schulterdecken grünlichbraunschwarz; Schulterrand, alle übrigen oberseitigen und unterseitigen Flügeldecken roth; Schwanzfedern grünlichpurpurbraun, am Grunde scharlachroth, unterseits fahler; ganze Unterseite dunkelviolettblau, bei manchen über die Brust eine breite scharlachrothe Binde; Schenkelgegend violettroth; Schnabel orangeroth, Wachshaut düstergelb; Auge dunkelbraun bis rothbraun; nackte Augengegend gelbgrau; Füße und Krallen schwärzlichgrau. Größe nahezu die des schwarzkäppigen Breitschwanzlori (Länge 25—26 cm; Flügel 13—15 cm; Schwanz

Digitized by Google

8,2—9,8 cm). Heimat: Molukken. Er ist schon von Sonnerat (1776) erwähnt, dann von Latham nach einem lebenden Vogel beschrieben und von Bechstein (1811) benannt. Weder über das Freileben, noch über das Benehmen in der Gefangenschaft liegen bis jetzt Nachrichten vor, und er gehört zu den bisher am allerseltensten lebend eingeführten Arten. Latham hatte behauptet, daß er zum Sprechenlernen unfähig sei, Frau Dr. Platen aber berichtet, daß von den 6 Köpfen, welche sie mitgebracht, der eine recht hübsch und ein andrer ein wenig plauderte. Ein Preis läßt sich nicht angeben.

Der weißbürzelige Breitschwanzlori

[Psittacus fuscatus, *Blth.*].

Weißbürzel-Lori. — White-rumped Lory. — Perruche Lori à cul blanc. — Witstuit Loeri.

Er ist an Stirn, Vorder- und Oberkopf braunschwarz; Scheitelmitte bräunlichgelb, mit weißgelbem Bande eingefaßt, der übrige Kopf, Hals und Oberkehle schwarzbraun, hell geschuppt; Schultern und Oberrücken schwarzbraun, jede Feder matt heller gesäumt; Hinterrücken und Bürzel gelblich- bis fast reinweiß, zart dunkel geschuppt; Schwingen an der Außenfahne grünlichschwarz, Innenfahne orangegelb, unterseits schwarzgrau mit rothgelber Binde; obere und untere Flügeldecken dunkelbraun; mittlere und große unterseitige Flügeldecken zinnoberroth; Schwanzfedern düstergrünlichgrau, Ende breit graublau, Innenfahne bis zum Enddrittel zinnoberroth, die beiden mittelsten Schwanzfedern nur längs der Schaftmitte düsterroth, alle unterseits an der Grundhälfte gelblichroth, Endhälfte düsterolivengelb; Oberbrust mit breitem zinnoberrothen Querband, dann ein dunkelbraunes, weißlich geschupptes Querband, dann wieder ein rothes und über Unterbrust und Bauchseiten ein schmales schwarzes Band; Bauchmitte und Schenkelgegend roth; untere Schwanzdecken schwarz; Schnabel roth; Wachshaut röthlichschwarz, breite nackte Haut am Unterschnabel roth; Auge gelb bis karminroth, nackte Haut ums Auge schwarz; Füße und Krallen schwarz. Beim

Digitized by Google

Weibchen sollen alle rothen Theile orange- bis reingelb sein. Nahezu die Größe des schwarzkäppigen Breitschwanzlori (Länge 26 cm; Flügel 13,6—15,5 cm; Schwanz 7,6—9 cm). Heimat: Neu-Guinea, Salawatti und Jobi. Er wurde von Blyth (1859) beschrieben und benannt. Irgend etwas Näheres über die Lebensweise ist nicht bekannt. Dr. Meyer erlegte ihn zahlreich an verschiedenen Oertlichkeiten und sagt, seine Verbreitung sei eine ziemlich ausgedehnte. In Dr. Platen's Sammlung befanden sich 4 Köpfe.

Herr Scheuba schildert einen solchen Weißbürzel in folgender Weise: „Ich hatte ihn als ‚samenfressend' gekauft und in dem Reisekäfig lagen in der That Hanfkörner, aber davon gefressen hatte der Vogel unterwegs nichts. Daher war er bei der Ankunft unsäglich freßgierig. Fast 8 Tage lang war es unmöglich, ihm in die Futtererker die in ausgepreßter Semmel und Biskuit bestehende Nahrung zu stellen, ohne verletzt zu werden; denn so schnell es auch geschehen mochte, er wußte einen Finger zu erhaschen, klammerte sich unter Geschrei und Flügelschlagen daran fest und biß wie toll darauf los. Hatte er sich dann aber den Kropf vollgestopft, so war er wieder das gemüthlichste Thier. Er kam auf die Hand, schmiegte sich unter sonderbaren knurrenden Lauten, Zeichen des Behagens, in dieselbe oder knusperte an den Fingern herum. Auch er saß nach dem Fressen ruhig da und — kaute das verschlungne Futter nochmals durch. Allmälig gelang es mir, ihn an recht weich gekochten Mais und Vogelbeeren zu gewöhnen, außerdem nahm er nur selten einmal ein Körnchen Kanariensamen. Er begann Sprechübungen, bei denen ich jedoch nur ein Wort wie ‚wrau' verstehen konnte; leider starb er bald an Krämpfen." Ein Preis läßt sich nicht angeben, da der Vogel bisher zu selten herübergekommen.

*

Digitized by Google

Die Stumpfschwanzloris oder Nestorpapageien [Nestor, *Wgl.*] darf ich hier nur beiläufig berücksichtigen, denn sie haben für die Liebhaberei eine geringe Bedeutung, weil sie nämlich einerseits selbst in ihrer Heimat äußerst selten sind, ja sogar der Ausrottung entgegengehen sollen, weil sie andrerseits nur gelegentlich und einzeln lebend eingeführt werden und weil sie schließlich als große, schwer zu haltende Vögel eigentlich nur für die bedeutenderen zoologischen Gärten u. a. Anstalten von Wichtigkeit sind. Als besondere Merkmale ergeben sich folgende: Schnabel kräftig, länger als hoch, stark seitlich zusammengedrückt, Oberschnabel mit schmaler gerundeter First und flacher Längsrinne, in gestrecktem Bogen gekrümmter, ansehnlich hervorragender Spitze und flachem Zahnausschnitt, Unterschnabel mit schief nach oben gerichteter Dillenkante, nicht kielförmig, Schneiden ohne Ausbuchtung; Zunge dick, weich, fleischig, glatt, oberseits abgeflacht, unterseits gerundet, jedoch ohne die kennzeichnenden Papillen, dagegen an der Oberseite mit einem Nagel versehen, welcher sich in einer dichten Reihe von Borsten über die Zungenspitze hinaus fortsetzt; Nasenlöcher groß, rund, frei, in breiter, spärlich mit Warzen besetzter Wachshaut; Auge klein, Augenkreis nackt, schmal; Füße kräftig, mit stark gekrümmten Nägeln; Flügel lang und spitz; Schwingen breit abgerundet; Schwanz mittellang, gerade; Gefieder weich, aus breiten, am Ende stumpf zugerundeten Federn bestehend; Gestalt kräftig und gedrungen. Dohlen- bis Rabengröße. Heimat: Neuseeland. Von den vier Arten sollen zwei etwa seit dem Beginn dieses Jahrhunderts ausgerottet sein und auch die übrigen diesem Schicksal wahrscheinlich anheimfallen. Nahrung: Honigsaft der Blüten, Früchte und andere Pflanzenstoffe, auch Sämereien, sodann Kerbthiere, ja, wie man behauptet, selbst Aas. Aufenthalt: Gebirgswälder in 2000 m Meereshöhe und darüber. Uebrigens hat man sie an verschiedenen Stellen eingereiht; ich schließe mich auch bei ihnen Finsch' Auffassung an, welcher sie, obwol als abweichendes Glied, zu den Pinselzünglern stellt.

Der braunbrüstige Stumpfschwanzlori

[Psittacus meridionalis, *Gml.*],

Kakanestor, Kaka oder Kakalori — Ka-Ka Parrot — Perroquet Ka-Ka, Nestor de la Nouvelle Zélande — Kaka Papegaai —

Digitized by Google

und der olivengrüne Stumpfschwanzlori

[Psittacus notabilis, *Gld.*].

Keaneftor, Kealori — Mountain Ka-Ka, Kea Parrot, Notable Parrot — Nestor olivâtre — Kea Papegaai.

Der Kakaneftor, welcher zu den auf Cook's Reisen von Forster gesammelten Vögeln gehört, von Latham beschrieben und von Gmelin benannt ist, wurde von den Naturforschern in mehreren Arten geschildert, welche Finsch jedoch nach sorgfältigen vergleichenden Studien sämmtlich als eine zusammenwirft. Gleichviel, ob der letztre Ornithologe dies mit Berechtigung gethan oder ob er sich geirrt, hier für uns möge der Kaka nur als eine Art inbetracht kommen. An Stirn, Ober- und Hinterkopf ist er weißlichgrau bis düsterweiß; Kopf-, Halsseiten und Nacken sind umbrabraun, letztrer mehr oder minder grau; Wangen purpurrothbraun; Ohrgegend ockergelb; Querband über den Hinterhals purpurbraunroth; Rücken und Mantel dunkelolivenbraun; Bürzel und obere Schwanzdecken purpurbraunroth; Schwingen an der Außenfahne grünlich-, Innenfahne dunkelbraun, letztre mit rothen Randflecken; Deckfedern der ersten Schwingen heller olivenbraun, ebenfalls mit Randflecken, alle übrigen oberseitigen Flügeldecken olivenbraun, schwärzlich gesäumt; Achseln und unterseitige Flügeldecken zinnober- bis düsterroth; Schwanzfedern dunkelolivenbraun, am Ende schwarz, unterseits am Grunde der Innenfahne röthlichbraun mit rothen Randflecken; Kehle bis Oberbrust reingrau bis dunkelbraun; übrige Unterseite weinroth bis dunkelpurpurbraun; Schnabel grauweiß; Wachshaut schwarz; Auge dunkelbraun bis blaugrau, nackter Kreis weißlichgrau; Füße grauschwarz. Rabengröße (Länge 44,5 — 52 cm; Flügel 26,6 — 30 cm; Schwanz 14—17,6 cm). Er erscheint übrigens in der Färbung sowol als auch in der Größe ungemein veränderlich und daher erklärt sich der oben angeführte Streit inbetreff einer oder mehrerer Arten.

Seine Heimat erstreckt sich, wenn man die verschiedenen Spielarten berücksichtigt, über fast ganz Neuseeland. Unter den Reisenden, welche seine Lebensweise geschildert, hat Dr. Haast die

Digitized by Google

ausführlichsten Nachrichten gegeben. Aufenthalt: Gebirgswald; zur rauhen Jahreszeit weithin umherstreichend, zur Brutzeit parweise, nach derselben familienweise. Als Baumvogel klettert und schlüpft er gewandt durch die Zweige; auf dem Boden hüpft er krähenartig. Im Fluge, der langsam und schwerfällig ist, stößt er hin und wieder einen Ruf aus. Bei Sonnenschein führen die Kakas unter Schwatzen und Geschrei Flugkünste aus, stürzen sich plötzlich aus der Höhe herab, steigen wieder empor und fliegen in hurtigen Schwenkungen dahin. Auch der Kaka zeigt die bereits mehrfach geschilderte Eigenthümlichkeit, daß auf das Geschrei eines krank geschoßnen alle übrigen herbeieilen und ihn klagend umschwärmen. Bei Tage ruht er, erst in der Dämmerung hört man seine schnarrenden Rufe und sieht ihn auf einer Baumspitze sitzen oder nach Nahrung umhersuchen. Letztre ist bereits Seite 262 angegeben. Er verursacht dadurch Schaden, daß er, nach Insektenlarven suchend, große Rindenstücke von den Bäumen abschält, ferner die Knospen und Blüten der Obstbäume vernichtet, die Weinreben beschädigt u. s. w. Das Nest befindet sich in einer weiten Baumhöhle, zuweilen niedrig über dem Boden; Gelege: 2—4 Eier; alljährlich werden zwei Bruten, im Februar oder März, gemacht. Die Entwicklung der Jungen und die ganze Lebensweise dürften im weitern denen anderer Papageien gleichen. Auch die jungen Kakas werden von den Eingeborenen vielfach aus den Nestern gehoben und aufgefüttert; das erstre ist aber recht gefährlich, denn die Alten vertheidigen die Brut mit scharfen Schnabelbissen. Als Wildbret werden diese Papageien ebenfalls viel verfolgt und Alte und Junge sollen in Netzen, Schlingen und allerlei Fallen leicht zu überlisten sein. Wie schon S. 262 gesagt, hat man behauptet, daß diese Art der Ausrottung entgegengehe, in manchen Gegenden soll sie jedoch noch überaus zahlreich vorhanden sein.

Digitized by Google

In letztrer Zeit sind mancherlei Erfahrungen über das Gefangenleben dieses Nestors gewonnen worden, so sagt Rowley, welcher mehrere im Käfig beobachtet hat, daß der Kaka leicht einzugewöhnen und gut zu erhalten sei, überaus zahm werde, vor allem vortrefflich sprechen lerne, sich auch spaßhaft in wunderlichen tanzenden Bewegungen und überhaupt außerordentlich liebenswürdig zeige, aber Tag und Nacht ruhelos sei, fortwährend im Käfig umherlaufe und dabei sonderbare Töne hören lasse oder mit dem gewaltigen Schnabel alles Holzwerk zerstöre. Wenn man ihn erst näher kennen gelernt habe, müsse man ihn als einen Vogel, der Interesse errege und Vergnügen bereite, hochschätzen. Linden fügt hinzu, daß er nicht allein durch seine schöne Gestalt, angenehmen Farben und anmuthige Haltung einen ansprechenden Eindruck mache, sondern auch an geistiger Begabung hoch zu stehen scheine. Er bleibe stets in der Höhe des Käfigs, springe und klettre sehr geschickt auf den Stangen und am Gitter umher und verarbeite die ersteren, wenn sie nicht aus ganz hartem Holz seien, in kürzester Frist zu Splittern und Spähnen. Im übrigen sei er gegen alle Genossen friedfertig, und mit einem Rosakakadu habe sich ein in seinem Besitz befindlicher Kaka vortrefflich vertragen. In den ersten Tagen ließ er ein sonderbares Grunzen hören, späterhin wohllautendes Pfeifen und zwar letztres schon sehr früh morgens, spät abends und in hellen Mondnächten zu jeder Stunde. Als seine besonderen Eigenthümlichkeiten seien Behendigkeit, Neugierde, Kopfschütteln u. a. sonderbare Geberden und komisches Hüpfen zu erwähnen. Fütterung: Kanarien- und Sonnenblumensamen, sowie etwas Zwieback in Milch getaucht, welchen letztern er besonders gern frißt. — Neuerdings ist er mehrfach lebend eingeführt worden; in den zoologischen Garten von London kam er zuerst i. J. 1863, späterhin noch mehrmals, dann auch in die Gärten von Amsterdam und Hamburg.

Digitized by Google

Sollte er häufiger zu uns gelangen und billiger werden, so würde er jedenfalls als eine absonderliche Bereicherung für unsre Liebhaberei willkommen sein. Der Preis steht gegenwärtig freilich noch außerordentlich hoch: 200 bis 300 M. für den Kopf.

Der olivengrüne Stumpfschwanzlori ist bräunlich-olivengrün, jede Feder mit halbmondförmigem braunen Fleck und schmalem braunen Schaftstrich; Oberkopf und Wangen olivengrünlichbraungrau; Hinterrücken und obere Schwanzdecken mattscharlachroth; Schwingen erster Ordnung braun, Außenfahne grünlichblau gerandet, Innenfahne mit gelben Flecken, Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne schwach bläulichgrün, Innenfahne ebenfalls mit Randflecken; Deckfedern grünlicholivenbraun; Achsel und unterseitige Flügeldecken scharlachroth; Schwanzfedern grün, mit breiter brauner Querbinde, Innenfahne mit blaßgelben Randflecken; ganze Unterseite düsterbräunlicholivengrün; Oberschnabel dunkelbleigrau, Unterschnabel röthlich, mit grauer Spitze; Auge dunkelbraun; Füße bleigrau, Krallen schwärzlich. Ueber Krähengröße (Länge 39—50 cm; Flügel 30—31 cm; Schwanz 15,7—20 cm). Auch er soll überaus veränderlich in der Färbung sein. Heimat: vorzugsweise der Süden von Neuseeland und zwar im Gebirge zwischen 1000 bis 2000 m Höhe, doch soll er einzeln auch in den Hügelgegenden, welche die Canterbury-Ebene begrenzen, vorkommen. Potts und Dr. Haast haben über sein Freileben berichtet, indem sie ihn in ganz ähnlicher Weise wie den vorigen schildern. Seine Stimme erschallt klagend, dem Miauen einer Katze ähnlich, und es macht einen eigenthümlichen Eindruck, wenn man sie in jenen einsamen unwirthlichen Gegenden vernimmt. Beim Anblick des Menschen aber erhebt er schon in weiter Entfernung ein durchdringendes Geschrei, nach welchem er seinen Namen Kea haben soll. Er ist viel seltner als der vorige. In der Ernährung und allem übrigen dürfte er mit jenem durchaus übereinstimmen, nur in einer Hinsicht zeigt er sich abweichend, er soll nämlich

Digitized by Google

hin und wieder oder vielmehr garnicht selten die in seinen Heimatsstrichen zahlreich vorhandenen Schafherden dadurch schädigen, daß ein solcher Papagei ein Stück überfällt, ihm die Wolle auszupft und handgroß das Fleisch aushackt und frißt. Ob diese Behauptung auf Wahrheit beruht, also die verwundet, bzl. gestorben aufgefundenen Schafe wirklich durch den Kea oder von Hunden und anderen Räubern umgebracht worden, ist bis jetzt noch nicht mit Sicherheit festgestellt. Thatsache ist es dagegen, daß der Keanestor um deswillen arg verfolgt und wol in kurzer Zeit völlig ausgerottet sein wird. In der Gefangenschaft dürfte er dem Verwandten in jeder Hinsicht gleichen und zweifellos auch sprachbegabt sein. Daher habe ich ihn hier mitgezählt, befürchte aber, daß er für die Liebhaberei der seltnen Einführung wegen keine Bedeutung gewinnen wird. In den zoologischen Garten von London gelangte der erste i. J. 1872. Ein Exemplar führte etwa um dieselbe Zeit A. Jamrach in London ein. Sonst dürfte er in den Vogelhandel kaum gekommen sein; ein Preis läßt sich daher nicht angeben.

*

Die Keilschwanzloris [Trichoglossus, *Vgrs.*], ein sehr artenreiches Geschlecht der glänzendsten und farbenprächtigsten Vögel, bieten uns bis jetzt nur zwei Arten als Sprecher dar; diese aber gehören zu den interessantesten aller Papageien überhaupt, denn sie zeichnen sich nach drei Seiten hin aus; sie sind schön, absonderlich und liebenswürdig im Benehmen, kräftig und ausdauernd, und die eine hat in der Gefangenschaft schon vielfach genistet und ist zugleich der einzige Zuchtvogel in der ganzen Gruppe der Pinselzüngler. Da zweifellos auch noch mehrere verwandte Arten über kurz oder lang als sprachbegabt sich zeigen werden, so muß ich zunächst die Gesammtheit der Keilschwanzloris hier kennzeichnen. Sie haben folgende Merkmale: Schnabel meist so hoch wie lang, seitlich zusammengedrückt, Oberschnabel mit kantiger First, verschmälerter, überhängender Spitze und sanft gerundeter aber deutlicher Bucht, Unterschnabel mit schief auf-

Digitized by Google

steigender Dillenkante, Schneiden gerade, ohne Ausbuchtung; Zunge dick, fleischig, an der Spitze oberseits löffelartig ausgehöhlt und mit dehnbaren beweglichen Papillen bedeckt; Nasenlöcher klein, oval, frei in deutlicher schmaler Wachshaut; Auge meistens dunkel, verhältnißmäßig klein, lebhaft; Zügel und Augenkreis befiedert, ums Auge nur ein schmaler nackter Ring; Füße kurz, kräftig, mit dicken Zehen und starken gekrümmten Nägeln; Flügel lang und spitz; Schwanz keilförmig mit stark abgestuften, am Grunde breiten, gleichmäßig spitz zulaufenden und am Ende zugerundeten Federn. Geschlechter nicht, Jugendkleid wenig verschieden; Gestalt schlank; Sperlings- bis Dohlengröße. Heimat: Australien, Polynesien, Neuguinea, Molukken und Papuinseln. Gesellig, wahrscheinlich auch zur Brutzeit, sammeln sie sich nach derselben aber manchmal zu überaus großen Schwärmen von mehreren Arten an, als Strichvögel umherstreifend oder als Zugvögel wandernd. Sie fliegen schnell und gewandt und unter ohrenbetäubendem Geschrei durch die Luft dahin, fallen auf den Gummibäumen ein und lassen sich selbst durch Schüsse nicht vertreiben, indem sie aufgescheucht nur von einem Baum zum andern eilen. Durch die vorwärts schreitende Kultur, namentlich durch das Herunterschlagen der Gummibäume und durch Verfolgung, sind sie bereits allenthalben sehr verringert und in die Wildniß zurückgedrängt, auch scheu und vorsichtig geworden, sodaß sie nicht mehr in die Nähe der Ortschaften kommen. Auf der Erde springen sie komisch seitwärts und in den Zweigen klettern oder vielmehr schlüpfen sie hurtig. Nach Angaben der Reisenden soll ihre Nahrung hauptsächlich im Honigsaft der Blüten bestehen und bei den kleinsten Arten mag dies auch der Fall sein; die großen aber ernähren sich, wie dies in der Gefangenschaft festgestellt worden, vorzugsweise von Sämereien, nebst etwas süßer Frucht. Sie alle sind an Nutzgewächsen wol kaum schädlich; im übrigen ist das Freileben der meisten wenig oder garnicht bekannt. Mehrere Arten werden neuerdings immer häufiger lebend bei uns eingeführt, indem man sie zu gewissen Zeiten, wenn sie wandernd umherstreichen, an der Tränke u. a. schwarmweise in Netzen fängt. Die nachfolgende Art gibt ein treues Spiegelbild aller, welche hier inbetracht kommen können, und daher werde ich sie möglichst eingehend behandeln.

Digitized by Google

Der blaubäuchige Keilschwanzlori

[Psittacus Swainsoni, *Jard. et Slb.*].

Lori von den blauen Bergen, Gebirgslori, fälschlich blauer Gebirgslori, sodann auch noch Allfarblori und einfältigerweise Pflaumenkopf, ja sogar Pflaumenkopffittich (!). — Blue Mountain Lory, Blue Mountain Parrot, Swainson's Lorikeet, Blue-bellied Lorikeet. — Perruche Lori de Swainson, Perruche à bouche d'or. — Swainson's Loeri.

In wahrhaft überraschender Weise hat der Gebirgslori ein Beispiel für die Bedeutung gegeben, welche die Liebhaberei in ihren Züchtungsversuchen und Erfolgen für die Wissenschaft und das praktische Leben zugleich in manchen Fällen gewinnen kann. Wie bereits Seite 140 erwähnt, ergibt seine Einführung und Züchtung in ihrem ganzen Verlauf sich als eine hochinteressante Geschichte. Von Buffon (1783) zuerst beschrieben und abgebildet und von Gmelin benannt, war er damals bereits in der Gefangenschaft gehalten und sogar von Josef Banks (1771) schon lebend nach Europa gebracht. Wahrscheinlich ist es, daß er seitdem hin und wieder einmal herübergekommen. Nach dem zoologischen Garten von London gelangte ein Pärchen im Jahre 1868; aber erst im Jahre 1870 begann seine regelmäßige Einführung und zwar zuerst durch den Großhändler Chs. Jamrach in London.

Der Lori von den blauen Bergen ist an Kopf und Kehle lilablau, Hinterkopf schwach bräunlich scheinend; breites Nackenband gelbgrün; ganze Oberseite dunkelgrasgrün; Oberrücken olivengrünlich, manchmal mehr oder minder gelb und roth gescheckt (jede Feder mit rothem oder gelbem Querfleck); Schwingen an der Außenfahne grün, Innenfahne schwarz, unterseits schwarzgrau, mit breiter hellgelber Querbinde; Achseln und unterseitige Flügeldecken zinnoberroth; Flügelbug grün; Flügelrand roth und gelb geschuppt; Schwanzfedern grün, Innenfahne gelb, unterseits düsterbräunlichgelb, an der Innenfahne hellgelb; Brust und Hals zinnoberroth; Brustseiten, gelb; Bauch dunkelblau; Bauchseiten, Schenkel, Hinterleib und untere Schwanzdecken roth, gelb und grün gescheckt; Schnabel glänzend

Digitized by Google

roth; Nasenhaut bläulich bis dunkelbraun; Auge orange- bis amethystroth, Augenkreis röthlichbraun; Füße braungrau, Krallen schwärzlich. Stark Dohlengröße (Länge 33—35 cm; Flügel 13—15 cm; Schwanz 12,2 — 15,2 cm).

Seine Heimat erstreckt sich, wie neuerdings festgestellt worden, wol über ganz Australien und auch Vandiemensland. Ueber sein Freileben liegen bisher erst außerordentlich geringe Nachrichten vor. Verschiedene Arten dieser lang- und spitzschwänzigen Loris schweifen, wie schon S. 268 gesagt, nach der Nistzeit scharenweise gemeinsam umher und fallen nahrungsuchend auf den Gummibäumen ein. Ein Schuß, sagt Gould, scheucht sie nur für den Augenblick auf; sie fliegen schreiend empor, lassen sich jedoch sogleich wieder auf die nächsten Bäume nieder und fressen emsig weiter. Solch' riesiger mit Blüten bedeckter Baum, von den farbenprächtigen Vögeln belebt, gewährt einen bewundernswerthen Anblick. Die Reisenden hatten behauptet, daß die Nahrung dieser Loris ausschließlich im Honigsaft der Blüten bestehe, dies dürfte jedoch keineswegs richtig sein, denn nicht einmal Früchte, sondern Sämereien fressen sie vorzugsweise; außerdem auch Kerbthiere. Die Brutzeit dürfte in die Monate September bis Januar fallen und das Gelege sollten nach Gould's Angabe nur zwei Eier bilden; die Erfahrung bei der Züchtung hat diese letztre Angabe indessen widerlegt.

Als Chs. Jamrach das erste Pärchen Gebirgsloris einführte und für den Preis von 210 Mark an Herrn E. Linden in Radolfzell verkaufte, hatte er mit dem Scharfblick eines erfahrenen Händlers sogleich ermessen, daß diese Vogelart ausdauernd sein müsse, da sie vornehmlich Sämereien fresse, und wirklich, abgesehen von einzelnen Fehlschlägen in der ersten Zeit, zeigte sich jene Voraussetzung als durchaus zutreffend. Der prachtvolle Vogel wurde immer häufiger eingeführt, ließ sich

Digitized by Google

sehr gut erhalten und nach kurzer Zeit in immer mehreren Fällen mit Erfolg züchten. Hier liegt es zu fern, auf die Züchtung näher einzugehen; zuerst Herr Bildhauer A. Heublein in Koburg (1873) und dann viele andere Vogelwirthe haben Gebirgsloris gezogen und Herr Kaufmann K. Petermann in Rostock erreichte diese Zucht sogar in dritter Generation. (Eine eingehende Schilderung ist in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III [‚Die Papageien'] gegeben).

Die prächtigen Farben, sein ungemein lebhaftes, komisch-anmuthiges Wesen, nicht minder seine Züchtbarkeit, haben dem Gebirgslori in überaus kurzer Zeit zahlreiche Freunde geworben und ihm allenthalben bei Liebhabern und Züchtern Bürgerrecht verschafft. In der That, man kann sich kaum schönere und reizvollere Vögel denken, als ein Pärchen dieser Loris, wie die Herren Dr. Frenzel und Direktor Scheuba solche schildern, wenn sie unter drolligen Gebehrden, ausdrucksvoll kopfnickend, schief seitwärts springen, im Kreise herum, dann sich balgend und kugelnd, zutraulich ‚Pfotchen' geben, am Finger knabbern, ohne jemals wirklich zu beißen u. s. w. Sie würden noch viel reichern Beifall finden, wenn sie nicht leider nur zu oft ihr schmetterndes, gellendes Geschrei erschallen ließen, wobei sie noch dazu kaum zu beruhigen sind. Obwol kräftig und ausdauernd, muß der Gebirgslori doch vor übelen Einflüssen sorgsam behütet werden; so darf man ihn niemals in zu großer Wärme halten, so muß man jeden schroffen Uebergang in der Fütterung entschieden vermeiden u. s. w. Bei verständnißvoller Pflege hat er sich jedoch, wie schon erwähnt, vielfach lange Jahre vortrefflich in der Gefangenschaft erhalten. Die Fütterung besteht in Sämereien, insbesondere Kanariensamen, Hafer und ein wenig Hanf, dann etwas eingeweichtem und ausgedrücktem Eierbrot oder altbacknem Weizenbrot; anstatt des letztern kann man auch Kakes oder Biskuit geben. Durchaus nothwendig

Digitized by Google

sind täglich gute süße Früchte. Bei Darreichung von Grünkraut sei man recht vorsichtig. Zweige zum Benagen darf man dagegen immer geben.

Nach allen bis hierher gemachten Angaben würde der Lori von den blauen Bergen als Schmuck- und Zuchtvogel immerhin einen recht bedeutenden Werth haben — aber trotzdem nicht unter den in diesem Werk zu berücksichtigenden Vögeln einen Platz einnehmen dürfen, wenn man inzwischen nicht festgestellt hätte, daß er auch sprachbegabt ist. Die erste Mittheilung, welche in dieser Hinsicht veröffentlicht wurde, stieß wol nicht allein auf Kopfschütteln und Verwundrung, sondern auch mehrfach auf Zweifel, denn in der ganzen Gruppe der Keilschwanzloris hatte man bis dahin noch keinen einzigen Sprecher gekannt. Herrn K. Petermann verdanken wir aber nicht allein die Züchtung dieser Art, wie gesagt in mehreren Generationen, sondern auch die erste Mittheilung über die Sprachbegabung. Auf der großen Vogelausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin i. J. 1879 befand sich ein junger Lori des genannten Züchters, welcher kräftig, schön im Gefieder und äußerst zahm war, den Pirolruf und mehrere Signale pfiff und ziemlich deutlich, wenigstens verständlich, den Namen seiner Beschützerin ‚Bertha', der ältesten Tochter des Herrn Petermann, aussprach. Demnächst berichtet von einem sprachbegabten Gebirgslori Herr Hüttenchemiker Dr. Frenzel in Freiberg. Dann theilte auch Herr E. Rüdiger in Darmstadt mit, daß ein solcher in seinem Besitz die Worte ‚komm her' und ‚mach' fort' spreche. Hiernach läßt sich mit Bestimmtheit annehmen, daß über kurz oder lang sicherlich weitere Fortschritte in solcher Hinsicht bei dieser Art zu erwarten sind. Ermessen wir also, daß der Gebirgslori einzeln gehalten bei verständnißvoller Verpflegung nicht allein zu den sprechenden, sondern zugleich zu den schönsten, liebenswürdigsten und ungemein zahm und zutraulich werden-

Digitized by Google

den Vögeln gehört, so dürfen wir wol hoffen, daß er wie als Schmuck- und Zuchtvogel auch als Sprecher in der Zukunft eine hohe Bedeutung erlangen wird.

Wer ihn zähmen und zum Sprechen abrichten will, möge sich für solchen Zweck einen hier gezüchteten, noch ganz jungen Lori zu verschaffen suchen, denn dieser wird sich ungleich gefügiger und lernfähiger zeigen als der ältere eingeführte, der, wenn er aus dem Pärchen gerissen wird, sich noch dazu schwieriger eingewöhnen läßt. Der Preis ist von der vorhin angegebnen Summe auf 100 M., selbst auf 80 M., ja zeitweise sogar auf 60 M. für das Pärchen herabgegangen und der einzelne Lori ist also für 30 bis 45 M. zu kaufen.

Der blauohrige Keilschwanzlori

[Psittacus ornatus, *L.*].

Schmucklori. — Ornamented or Ornamental Lory or Lorikeet. — Perruche Lori ornée. — Blauwoor Loeri.

Es dürfte nicht leicht einen Vogelliebhaber geben, der beim Anblick dieses kleinen wunderhübschen Pinselzünglers gleichgiltig bleiben könnte; ich erachtete ihn, als ich ihn zum erstenmal sah, für einen der schönsten unter allen bunten und farbenprächtigen Loris. In ähnlicher Weise äußert sich Dr. Scheuba — und auch den alten Autoren ist es so ergangen, denn sie benannten diesen Vogel Paradisparkit. Den volksthümlichen Namen Schmucklori, unter welchem er überall bekannt ist, gab ich ihm, der lateinischen Benennung entsprechend.

Er gehört zu den seit altersher bekannten Papageien, denn schon Edwards (1747) hat ihn abgebildet, Brisson (1760) beschrieben und Linné benannt. Trotzdem waren bis zur neuesten Zeit weder über sein Freileben, noch über sein Wesen in der Gefangenschaft eingehende Nachrichten vorhanden.

Digitized by Google

An Stirn und Oberkopf ist er violettblau; Hinterkopf mehr schwarzblau; um den Hinterkopf, über den Nacken ein scharlachrothes, zart schwarz geschupptes Band; Zügel und Fleck an der Ohrgegend schwarzblau; an jeder Halsseite ein breiter hochgelber Streif; ganze Oberseite dunkelgrasgrün; am Oberrücken jede Feder mit breitem gelben Querstreif; Schwingen an der Außenfahne grün, Innenfahne schwärzlichgrau, unterseits dunkelgrau; Achseln und unterseitige Flügeldecken hochgelb; mittelste Schwanzfedern grün, äußere an der Spitze gelbgrün, an der Grundhälfte der Innenfahne scharlachroth; Wangen und Kehle scharlachroth; Hals und Brust ebenso, breit schwarz gestreift; Bauch dunkelgrün; Seiten, Hinterleib und untere Schwanzdecken grün und gelb geschuppt; Schnabel roth; Wachshaut schwärzlich; Auge dunkelbraun bis rothbraun, nackte Haut bläulichschwarz; Füße dunkelgrau, Krallen schwarz. Kaum Drosselgröße (Länge 22—25 cm; Flügel 11,8 — 12,6 cm; Schwanz 6,7 — 8,7 cm). Heimat: Celebes und die Togianinseln. Dr. A. B. Meyer fand ihn dort überall häufig und gemein und zeitweise in sehr großen Scharen, welche mit raschen Flügelschlägen schnell dahin fliegen, indem sie ihre kurzen schrillen Schreie erschallen lassen. Ihre Nahrung besteht in allerlei Früchten. Die Eingeborenen halten sie vielfach und zwar vermittelst eines Ringes aus Kokusnußschale an einen kleinen Ständer angekettet vor den Thüren der Hütten und füttern sie mit Reis und Bananen. Der genannte Forscher gibt noch an, daß dieser Vogel (wie auch einige andere Loris) einen bemerkbaren, nicht unangenehmen Moschusgeruch wahrnehmen lasse.

Bei uns ist er leider zu den sehr seltenen Erscheinungen des Vogelmarkts zu zählen, und noch dazu haben die Händler mit ihm recht böse Erfahrungen gemacht, denn die meisten, ja fast alle Schmuckloris, sterben, trotzdem sie anscheinend kerngesund und im besten Gefieder zu uns kommen, doch plötzlich dahin. Dies liegt indessen nach meiner Ueberzeugung nur in der unzweckmäßigen Behandlung und ich bitte daher, das in der Einleitung Seite 140 Gesagte zu beachten. Gelangt dieser

Digitized by Google

Pinselzüngler gesund zu uns, so ist er ebenso leicht wie der Gebirgslori zu erhalten, denn er erfordert nur dieselbe Verpflegung und Fütterung, und gleicht ihm in fast allem andern.

Auch er hat übrigens bereits liebevolle Pfleger und Beobachter gefunden. Herr Kreisgerichtsrath Heer in Striegau schreibt folgendes: „Mein Männchen Schmucklori ist ein lieber Vogel, sehr zahm und erinnert in seinem Benehmen, namentlich den Verbeugungen, dem wunderlichen Schnauben u. s. w. sehr an den Gebirgslori. Dabei scheint er recht gelehrig zu sein, denn er hat von anderen Vögeln schon allerlei Worte aufgeschnappt, die er nachahmt; besonders abends plappert er allerlei." Von einem andern Pärchen beim Vogelhändler Franz Petzold in Prag schreibt Herr A. Eberle, daß das Männchen italienische Worte spreche, welche es wahrscheinlich von den Matrosen während der Ueberfahrt gelernt habe. „Unter meinen kleinen Pinselzünglern," sagt Herr Scheuba sodann, „sind die Schmucklorís nicht allein die weitaus farbenprächtigsten, sondern auch die lebhaftesten, ungestühmsten und ruheloseſten; von Schüchternheit und Scheu, selbst vor Fremden, ist bei ihnen keine Spur zu bemerken. Naht man ihrem Käfig, so rücken sie sogleich an das Gitter, um den Besuch mit ziemlich schrillem Geschrei zu begrüßen, und wenn das alte Männchen kann, so klammert es sich mit Schnabel und Füßen an ein zu nahe gebrachtes Kleidungsstück fest an, ebenso an die Hand, von der es nur mit Mühe wieder herabzubringen ist, wobei es ohne einige empfindliche Schnabelhiebe nicht abgeht. Bei Vernachlässigung fordert es durch heftige Lockrufe zur Unterhaltung mit ihm auf; tritt man dann heran, so zeigt es seine Freude durch Neigen des Kopfs und Verbeugungen, wobei es häufig mit einem Füßchen das Ende der Schwingen ergreift, so den Flügel etwas hebt und den Kopf zwischen diesen und die Brust steckt. Ebenso versucht es allerlei zu plappern, doch sind nur

Digitized by Google

die Worte ‚Papagei' und ‚Wart, wart' ziemlich deutlich zu verstehen. Die Fütterung besteht in Hanf und gekochtem Mais, welchen letztern er ebenso wie Ebereschen und Feigen leidenschaftlich gern frißt; von Fichtenzweigen benagt er eifrig die Spitzen und Nadeln." Im übrigen gilt von dieser Art alles inbetreff der vorigen Mitgetheilte; auch sie hat vorzugsweise als Schmuckvogel Werth und wird sich sicherlich wie jene züchten lassen. Die Abrichtung zum Sprechen scheint bei ihr noch leichter zu sein, doch wird sie über einige Worte kaum hinauskommen.

Wie schon gesagt, ist der Schmucklori im Handel sehr selten. Er wurde erst i. J. 1873 nach dem zoologischen Garten von London in einem Kopf gebracht; in der Sammlung des Herrn Dr. Platen befanden sich 28 Stück, sonst aber wird er nur immer pärchenweise oder in wenigen Exemplaren eingeführt. Preis hoch, 120 bis 150 M. für das Pärchen und 50, 60 bis 80 M. für den einzelnen.

* * *

Die Araras (Sittace, *Wgl.*) haben für die Leser dieses Buchs von vornherein insofern großes Interesse, als sie zunächst zu den seit ältester Zeit her bekannten sprechenden Papageien gehören — wir finden sie schon bei Aldrovandi, Geßner und anderen alten Autoren — und sodann sämmtlich ohne Ausnahme sprachbegabt sind. Die meisten und zwar die größten unter ihnen, stehen uns freilich im gleichen Verhältniß wie die Kakadus gegenüber, da sie aus denselben Ursachen (s. S. 201) wie diese nicht als eigentliche Stubenvögel zu betrachten sind, sondern gleichsam nur als Schmuckvögel für Vorzimmer, Veranda, Garten, selbst für Geflügelhof und Park, gelten können. Als solche aber haben sie noch ganz besondern Werth dadurch, daß sie fast durchgängig als überaus kräftig und ausdauernd sich ergeben. Deshalb sind sie auch vorzugsweise geschätzte Schaustücke für zoologische Gärten und dergleichen Naturanstalten.

Als ihre unterscheidenden Merkmale sind folgende zu nennen: Schnabel sehr groß und kräftig, Oberschnabel stark herabgekrümmt,

Digitized by Google

mit weit überhängender Spitze und deutlichem Zahnausschnitt, Unterschnabel höher, mit breiter, abgeflachter Dillenkante, abgestutzter Spitze und längs der First mit flachem, nicht scharfkantigem Streif; Zunge dick, vorn etwas stärker, dann fleischig, oberseits mit feinen Längsfurchen, zwischen denen auf den Schwielen kleine stumpfe Papillen reihenweise stehen, hinten vier Par ungleiche Warzen und ein leicht gezackter, schief nach außen gerichteter Rand; Nasenlöcher rund, in nackter Wachshaut, letztre nur bei einigen mit Federchen bedeckt; Wangen, Augengegend und neben dem Unterschnabel nackt, bei manchen unterm Auge Reihen kleiner Federchen; Flügel lang, spitz; Schwanz lang, spitz, keilförmig, die Federn stufenartig, jede mit abgerundetem Ende; Füße kräftig, Lauf kurz und dick, Krallen groß und stark gekrümmt; Gefieder derb und hart, ohne Puderdaunen; Gestalt gedrungen, durch den langen Schwanz aber viel größer als in Wirklichkeit erscheinend. Tauben- bis Haushahngröße.

Ihre Heimat ist nur Amerika, wo sie vom nördlichen Mexiko bis Südbrasilien und Paraguay vorkommen. Der dichte Urwald ist ihr Aufenthalt und zwar besonders die Niederungen längs der Ströme und Flüsse, doch auch im Gebirge bis zu 3500 m Höhe. Sie leben parweise und nach der Nistzeit familienweise; manche vereinigen sich zu Zeiten und zuweilen in mehreren Arten gemeinsam zu großen Schwärmen. Ihr Flug ist reißend schnell, bei den größten jedoch schwerfällig; ihr Gang auf der Erde ist ungeschickt, seitwärts schreitend, dagegen klettern sie im Gezweige hurtig und gewandt. Allerlei Baumfrüchte und Sämereien, besonders steinharte Palmennüsse, welche sie mit den gewaltigen Schnäbeln zertrümmern, sind ihre Nahrung. Als Standvögel fliegen sie manchmal überaus weit, um die Nutzgewächse der Ansiedler räuberisch zu überfallen, und da sie nur zu großen Schaden anrichten, so werden sie, wie auch der Federn und des freilich nicht besonders schmackhaften Fleisches wegen, eifrig verfolgt. Dadurch sind sie aber außerordentlich scheu geworden und wissen sich in den dichten Kronen der höchsten Urwaldbäume so listig zu verstecken, daß man sie nur schwer zu erlegen vermag. Aus den bewohnten Gegenden sind sie fast überall vertrieben und in den tiefen Urwald zurückgedrängt. Das Nest steht in der Höhlung eines uralten riesigen Baums und wird alljährlich von demselben Par bezogen. Das Gelege besteht in nur zwei Eiern, die vom Weibchen allein erbrütet werden.

Digitized by Google

Junge, welche die Indianer vielfach aus den Nestern rauben, aufziehen und nach den Hafenstädten bringen, bilden die Mehrzahl der eingeführten und daher sind fast alle in den Handel gelangenden Araras bei der Ankunft bereits völlig oder wenigstens halb zahm.

In der Gefangenschaft sind sie, wie vorhin erwähnt, überaus kräftig und ausdauernd, zugleich meistens gutmüthig und zutraulich; andrerseits aber kann ein boshafter Arara auch nur zu gefährlich werden. Als den bedeutendsten Kenner dieser Unterfamilie der Papageien muß ich Herrn Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram nennen. Derselbe hat seit Jahren zahlreiche Arten gehalten und spricht sich vor allem dahin aus, daß es durchaus ein Irrthum sei, wenn man annehme, diese Vögel eigneten sich nicht als Zimmerbewohner; „ich kann vielmehr versichern", sagt er, „daß sie sämmtlich keine Schreier sind, sondern sogar im Zimmer einer nervenschwachen Dame gehalten werden dürfen. Dabei ist es allerdings nothwendig, daß man nicht den ersten besten Arara kauft, sondern selbstverständlich einen noch jungen, welcher liebevoller Behandlung und Abrichtung sich zugänglich zeigt. Ein solcher wird nicht allein ungemein zahm, läßt sich von jedem Kinde anfassen und liebkosen, fliegt frei aus, kommt auf den Ruf zurück, sondern kreischt auch niemals. Im Gegensatz zu ihm kann ein Arara im zoologischen Garten, wo er seitens der Wärter vielleicht unzweckmäßig behandelt, vom Publikum geneckt worden u. s. w. zu einem der schlimmsten Schreier und zugleich bösartigsten Vögel werden."

Die Araras lernen mit starker, kräftiger, meistens aber undeutlicher Stimme viele Worte und manchmal ganze Sätze nachsprechen, im allgemeinen bleiben sie jedoch hinter Graupapagei und Amazone, sowie auch hinter den ihnen näher verwandten Alexandersittichen an Sprachbegabung weit zurück, während sie sonst geistig recht befähigt sind. Die kleineren Arten wiederum stehen den größeren in beider Hinsicht erheblich nach. — Man füttert alle Araras ganz ebenso wie die Amazonen und den Graupapagei, hält die großen meistens einzeln an der Kette auf dem Ständer und die kleinen parweise im Heckkäfig. Fast sämmtliche bekannten Arten werden lebend eingeführt. Bei zweckmäßiger Verpflegung erreichen die Araras, vornehmlich die größeren und großen Arten, auch in der Gefangenschaft ein staunenswerth hohes Alter.

Digitized by Google

Der hyazinthblaue Arara

[Psittacus hyacinthinus, *Lth.*].

Großer blauer Arara, Hyazinth-Arara. — Hyacinthine Macaw. — Ara hyacinthine, Ara Maximilien. — Maximilian's Ara.

Der prachtvolle Vogel mit dem gewaltigen Schnabel kann weder übersehen noch verwechselt werden; er bildet so recht eigentlich ein kostbares Aushängeschild für jeden zoologischen Garten und ähnliche Naturanstalten. Am ganzen Körper dunkel kobaltblau, ist er an Kopf und Hals etwas heller, an Scheitel, Nacken, Flügeln und Schwanz aber dunkler; Schwingen an der Innenfahne schwärzlich gerandet, unterseits glänzend schwarz; größte unterseitige Flügeldecken schwarz; Schwanzfedern unterseits schwarz; Schnabel schwarz; Auge schwarzbraun; Zügel befiedert; großer nackter Augenkreis und nackte Haut um den Unterschnabel orangegelb; Füße schwärzlichbraun, Krallen schwarz. Haushahngröße, doch weit länger gestreckt (Länge etwa 1 m; Flügel 36,5 — 41,7 cm; längste Schwanzfedern 45,6 — 57 cm). Heimat: mittleres Brasilien bis zum Amazonenstrom. Ueber sein Freileben ist äußerst wenig bekannt. Er wurde von Latham (1790) beschrieben, und namentlich Azara hat einige Mittheilungen über ihn gemacht. In der Heimat selbst ziemlich selten, kommt er nur parweise oder familienweise vor. Palmennüsse sind vornehmlich seine Nahrung. Das Nest soll in Uferhöhlungen, welche er mit dem Schnabel selber gräbt, stehen und zwei Eier als Gelege enthalten; alljährlich sollen zwei Bruten erfolgen. Sein Fleisch soll fast ungenießbar sein. Bis vor kurzem gelangte er äußerst selten zu uns. In den zoologischen Garten von London kam der erste i. J. 1867. Nach und nach haben ihn wenigstens die großen derartigen Naturanstalten sämmtlich erlangt und im Berliner Garten befinden sich gegenwärtig zwei Köpfe. Fräulein Hagenbeck hatte hin und wieder einen solchen Prachtvogel auf den Ausstellungen. Dr. Finsch sagt, er habe zuge-

Digitized by Google

hört, wie einer mit tiefer Baßstimme Worte in fremder Sprache Worte murmelte. Der Preis beträgt 600 — 750 M.

Der meerblaue Arara

[Psittacus glaucus, *Vll.*].

Blauarara. — Glauceous Macaw. — Ara bleuâtre, Ara grisbleu. — Groenblauwe Ara.

Fast noch seltner als der vorige, ihm auch in allen Eigenthümlichkeiten gleich oder doch sehr ähnlich, ist er düster meerblau; Kopf, Wangen und Kehle mehr graulich oder grünlichblau; Schwingen und Schwanzfedern an der Innenfahne schwarzbraun, unterseits braunschwarz, ebenso die größten unterseitigen Flügeldecken; kleine unterseitige Flügeldecken hell meerblau; Schnabel schwarz; Auge dunkelbraun; Füße schwärzlichbraun; Größe bedeutend geringer als die des hyazinthblauen Arara (Länge 72,8; Flügel 33,8 — 35 cm; längste Schwanzfeder 33,8 — 36,5 cm). Heimat: südliches Brasilien, Paraguay, Uruguay. In der Lebensweise wird er von jenem nicht abweichen, auch soll er in Uferlöchern und Baumhöhlungen nisten. Außer diesen kurzen Nachrichten von Azara liegen nähere nicht vor. Was seine Einführung anbelangt, so war in den zoologischen Garten von London ein Kopf im Jahre 1860, in den Amsterdamer ein solcher im Jahre 1868 und in den Hamburger im Jahre 1878 gekommen; auf den Ausstellungen und in den Vogelhandlungen ist er nur gelegentlich einmal zu sehen. Preis 350 M.

Lear's blauer Arara [Psittacus Leari, *Bp.*] — kleiner Hyazintharara — Lear's Blue Macaw — Ara bleu de Lear — Lear's blauwe Ara — ist an Kopf, Nacken und unteren Theilen meerblau; ganze übrige Oberseite, nebst Flügeln und Schwanz dunkelblau; nackter Augenkreis und Rand am Unterschnabel gelb; Schnabel und Füße schwarz. In der Größe und allem übrigen dem vorigen gleich. Da bisher nur ein Balg im Pariser zoologischen Museum vorhanden war, so dürfte er hier kaum mitgezählt werden, allein

Digitized by Google

er ist i. J. 1880 in einem Kopf lebend in den zoologischen Garten von London gelangt. Als Heimat ist Südamerika angegeben.

Spix' blauer Arara [Psittacus Spixi, *Wgl.*] — kleiner meerblauer Arara, kleiner Blauarara — Spix' blue Macaw — Ara bleu de Spix — Spix' blauwe Ara — ist dunkelblau (nach Burmeister himmelblau); Scheitel dunkler; Ohrgegend graulich; Flügel dunkelblau, unterseits schwarz; Schwanz gleichfalls blau, unterseits schwarz; Schnabel schwarz, Spitze und First des Oberschnabels weißlich; Auge weiß bis gelb; Zügel und Wangen nackt, gelblichweiß; Füße schwarz. Größe um die Hälfte geringer als die des dunkelblauen Arara. Heimat: nördliches und östliches Brasilien. Er ist erst einmal (1878) in den zoologischen Garten von London gelangt.

Lafresnaye's rother Arara [Psittacus Lafresnayei, *Fnsch.*] — Rothbug-Arara — Red-cheeked Macaw or Lafresnaye's Red Macaw — Ara rouge de Lafresnaye — Lafresnaye's roode Ara — ist an Stirn und Streif an der Ohrgegend dunkelscharlachroth; Vorder- und Oberkopf, Ohrgegend, Flügelbug, kleine oberseitige Flügeldecken längs des Oberarms, kleine unterseitige Flügeldecken, Achseln und Brustseiten lilaorangeroth; Nacken, Halsband orangeroth; Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken gelblicholivengrün; Eckflügel, größte Schwingen und Deckfedern sowie die Schwanzfedern am Enddrittel dunkelblau, ganze übrige Oberseite olivengrün; ganze Unterseite gelblicholivengrün, Schenkelgegend dunkelscharlachroth; Schnabel hornbraun, Auge braun mit nacktem weißen Kreis; Füße und Krallen schwarz. Heimat: Bolivia. Dürfte bis jetzt noch nicht lebend eingeführt sein.

Der rothstirnige Arara

[Psittacus militaris, *L.*].

Soldatenarara, großer grüner Arara, albernerweise auch militärischer Arara. — Military Macaw, Green Macaw. — Ara militaire. — Groene Roodvoorhoofd Ara.

Den volksthümlichen Namen, welcher auch in der von Linné gegebnen lateinischen Bezeichnung ausgedrückt ist, trägt

Digitized by Google

dieser Vogel wol von den absonderlichen purpurbraunen Streifen an den Wangen, welche gleichsam einen Spitzbart bilden, sowie zugleich von seiner bunten Färbung. Er soll übrigens schon von Garcilasso de la Vega (1609) erwähnt sein; von Edwards (1747) wurde er bereits gut beschrieben und abgebildet. Trotzdem er also zu den seit ältester Zeit her bekannten und immer schon lebend eingeführten Papageien gehört, weiß man über sein Freileben bis zur Gegenwart doch erst recht wenig.

Er ist an Stirn und Vorderkopf scharlachroth; Ober- und Hinterkopf grasgrün; Mantel schwach gelblicholivengrün; Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken himmelblau; Schwingen dunkelblau, Innenfahne olivengelblichschwarz, unterseits ganz olivengrünlichgelb; Deckfedern der ersten und zweiten Schwingen und Eckflügel dunkelblau; kleine unterseitige Flügeldecken grün, größte olivengrünlichgelb; Schwanzfedern kupferrothbraun, Innenfahne olivengelblich gerandet, Enddrittel blau, die beiden äußersten ganz blau, alle unterseits olivengrünlichgelb; ganze übrige Ober- und Unterseite olivengrün; untere Schwanzdecken blau; Schnabel schwarz; Auge graugelb; die nackten Wangen fleischfarben mit vier schmalen purpurbraunen Federstreifen, welche sich zu einem Fleck am Unterschnabel zusammenziehen. Mittelgroß; weit kleiner als der dunkelblaue Arara. (Länge $62_{,5}$—78 cm; Flügel 35—$41_{,7}$ cm; Schwanz $32_{,5}$—$40_{,5}$ cm).

Heimat: von Bolivia bis in den Norden von Mexiko, vornehmlich in Kolumbien, Peru, Ekuador, Panama und Mittelamerika. Er kommt ebenso in den niederen heißen Ebenen wie in den Anden bis zu 3500 m Höhe vor. Bei seinen Streifereien soll er zuweilen in Westindien und auf Jamaika erscheinen. In der Lebensweise, Ernährung u. s. w. dürfte er von den Angaben, welche ich in der einleitenden Uebersicht gemacht, nicht abweichend sich zeigen. Durch vielfache Verfolgungen ist er überaus scheu und vorsichtig geworden und verhält sich in den Kronen der hohen Urwalds-

Digitized by Google

bäume so laut- und regungslos, daß er nur schwer zu bemerken ist.

Buffon gibt nichts Näheres über ihn an, dagegen hat ihn Bechstein beim Händler F. Thieme in Waltershausen gesehen und schildert ihn als außerordentlich gelehrig und gesprächig; „er sprach sogleich alles nach, nannte alle Kinder im Hause bei Namen, war geduldig, folgsam, zuthätig und zeichnete sich dadurch vor den blauen und rothen Araras zu seinem Vortheil aus; er ist aber auch theurer als jene und gilt als große Seltenheit." Gegenwärtig sieht man ihn zuweilen in den Vogelhandlungen und auf den Ausstellungen; die bedeutenderen zoologischen Gärten besitzen ihn sämmtlich und er zeigt sich dort sehr ausdauernd, denn in Frankfurt a. M. lebt ein Soldatenarara seit nahezu 15 Jahren. Im Hamburger Garten sitzt einer unangekettet auf der Stange, und es fällt ihm nicht ein, dieselbe zu verlassen. Bei den Großhändlern kommen die rothstirnigen Araras in außerordentlich verschiedner Größe vor und die Systematiker haben ihn daher auch in zwei Arten geschieden. Für die Liebhaberei hat dies jedoch keine Bedeutung, allenfalls kann man nach Geschmack einen großen oder kleinen Soldatenarara einkaufen. Preis 100 M., meistens aber 150 bis 180 M.

Der hellrothe Arara

[Psittacus macao, *L.*].

Arakanga, scharlachrother Arara, großer gelbflügeliger Arara, Makao. — Red and blue Macaw. — Ara rouge, Ara macao. — Groote Geelvleugel Ara.

Geßner (1557) und Aldrovandi (1599) haben diesen Arara bereits beschrieben und so gehört er also zu den am allerlängsten bekannten Arten und zwar ebensowol inbetreff seiner Lebensweise im Freien, als auch hinsichtlich seines Gefangenlebens. Unter den reisenden Naturforschern, welche über ihn berichtet,

Digitized by Google

sind besonders Alexander von Humboldt, Schomburgk und Arthur Schott zu nennen. Nach deren Angaben gilt alles hier in der allgemeinen Uebersicht der Araras über das Freileben Gesagte von ihm vorzugsweise. Im rabenähnlichen Fluge läßt er seine weithin schallenden Töne hören. Sein Aufenthalt ist vornehmlich der Urwald, wo er in der Nistzeit pärchenweise lebt, nach derselben sich aber zu großen Schwärmen ansammelt, welche umherstreichend die Feigen- u. a. Bäume an der Küste überfallen. Aus dem hoch im gewaltigen Urwaldsbaum befindlichen Nest ragt der Schwanz des brütenden Weibchens lang hervor. Die Ansiedler hassen und schießen diese Araras erbarmungslos des Schadens wegen, den sie am Mais u. a. Nutzgewächsen verursachen; die Eingeborenen verfolgen sie leidenschaftlich um der bunten Federn willen. Ihr Fleisch ist wenig genießbar. Ein Baum, in welchem das Nest sich befindet, vererbt sich bei den Indianern als Familieneigenthum vom Vater auf den Sohn und wird von den Vögeln, obwol immer ausgeraubt, doch alljährlich wieder bezogen. Die eingeführten Arakangas sind fast regelmäßig solche jungen aufgefütterten Vögel und daher bei der Ankunft bereits zahm und weitrer Abrichtung zugänglich.

Der hellrothe Arara ist an Kopf und Kopfseiten scharlachroth; Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken himmelblau; Schwingen nebst Deckfedern blau, an der Innenfahne schwärzlich; die größten oberseitigen Flügeldecken nebst den langen Schulterfedern orangegelb mit grünem Endfleck; Eckflügel blau; ganze übrige Oberseite scharlachroth; Schwanzfedern am Ende himmelblau, die beiden äußersten ganz blau, dann diese Farbe allmälig abnehmend, sodaß sie auf den beiden mittelsten nur noch als kleiner Punkt erscheint; ganze Unterseite gleichfalls scharlachroth, nur die unteren Schwanzdecken blau; Oberschnabel horngrauweiß, am Grunde mit schwarzem Fleck, Unterschnabel schwarz; Auge gelblichweiß; die nackten Wangen fleischfarbenweiß; Füße schwärzlichgrau mit schwarzen Krallen. Fast Haushahngröße (Länge $0_{,93}$—1 m; Flügel $37_{,5}$—42 cm; Schwanz

Digitized by Google

$49_{/5}$—$62_{/5}$ cm). Heimat: das nördliche Südamerika, Bolivia, Nordbrasilien, Guatemala und Honduras, selbst Mexiko und Peru.

Ueber sein Gefangenleben berichtet bereits Bechstein recht ausführlich, doch macht er im allgemeinen nur die Angaben, welche ich in der Einleitung vorausgeschickt. Dieser Arara gewähre einen prächtigen Anblick, lasse sich zum Ein- und Ausfliegen gewöhnen, sei sehr abrichtungsfähig und lerne besonders gut Worte nachsprechen, doch zeige er sich nicht selten bösartig, sodaß man keinenfalls Kinder im Zimmer mit ihm allein lassen dürfe. Die Beobachtung in späterer Zeit bis zur Gegenwart hat nicht viel Neues ergeben. Der hellrothe Arara ist eine der gemeinsten Erscheinungen in den zoologischen Gärten, wo ein solcher nach Angabe des Herrn Dr. Max Schmidt in Frankfurt a. M. 20 Jahre und darüber gut ausdauerte. Auf den Vogelausstellungen ist er fast regelmäßig zu finden. Ein Herr Czarnikow hatte auf der „Ornis"-Ausstellung in Berlin i. J. 1879 einen hellrothen Arara im prächtigen Gefieder, welcher ungemein zahm und liebenswürdig sein und gegen hundert Worte sprechen sollte. Sein Preis beträgt etwa 100 M.

Der dunkelrothe Arara

[Psittacus chloropterus, *Gr.*].

Großer grünflügeliger Arara, Grünflügelarara. — Red and Yellow Macaw, Green-winged Macaw. — Ara chloroptère, Ara aux ailes verts. — Groote Groenvleugel Ara.

Von der vorigen unterscheidet sich diese Art nur dadurch, daß sie im ganzen Gefieder viel dunkler roth und an den Schultern und oberen Flügeldecken grün, nicht gelb ist. Schon von Geßner, dann von Brisson (1760) beschrieben, ist der dunkelrothe Arara von Gray (1859) benannt worden. Er erscheint

Digitized by Google

am Kopf und der ganzen übrigen Oberseite dunkelscharlachroth, am Nacken und Oberrücken jede Feder grün gerandet; Mittel- und Unterrücken, sowie obere Schwanzdecken himmelblau; Schwingen erster Ordnung dunkelblau, Innenfahne breit schwarz, unterseits purpurroth; Deckfedern düsterblau; Flügel- und Schulterdecken düsterolivengrün; kleine unterseitige Flügeldecken roth, breit grün gerandet; Schwanz am breiten Ende und den beiden äußersten Federn dunkelblau; ganze Unterseite dunkelscharlachroth, untere Schwanzdecken himmelblau; Oberschnabel weißlichhorngrau, am Grunde mit schwarzem Fleck, Unterschnabel schwarz; nackte Wangen weiß; Auge gelb bis gelblichperlgrau; Füße schwärzlichbraun mit schwarzen Krallen. Größe etwas geringer als die des vorigen (Länge 78—83,2 cm; Flügel 39—41,7 cm; Schwanz 31,2—46,8 cm). Seine Heimat erstreckt sich von Süd-Brasilien, dem Amazonenstrom, Guiana bis Panama und Uruguay. Nach den vorliegenden Berichten von Azara, Prinz v. Wied, Burmeister u. A. zeigt er sich in der Lebensweise vornehmlich wie in der Einleitung geschildert. Als seinen Hauptaufenthalt bezeichnet der letztgenannte Forscher den dichten Urwald längs der Ströme und an der Küste, während der Prinz behauptet hatte, daß er auch auf den Höhen, in offenen mit Wald wechselnden Gegenden und sogar auf den felsigen Gebirgen vorkomme. Seine Federn dienten zum Schmuck für die Eingeborenen bei Festlichkeiten, und in allem übrigen stimmt er gleichfalls mit dem vorigen überein. Auch er ist im Handel und in den zoologischen Gärten gemein und erhält sich in den letzteren Jahrzehnte hindurch vortrefflich, in der verständnisvollen Pflege des Liebhabers natürlich noch viel länger. Preis 75 bis 100 M.

Der dreifarbige Arara [Psittacus tricolor, *Bchst.*] — Dreifarben-Arara, gelbnackiger Arara — Tricolored Macaw — Ara tricolore — Driekleur Ara — ist dunkelscharlachroth; Stirnrand und Wangen etwas lebhafter roth; Hinterkopf, Nacken und Hinterhals dunkelorangegelb; Mantel bräunlichroth; Hinterrücken, Bürzel, obere und untere Schwanzdecken, Schwingen und Deckfedern blau; kleine und

Digitized by Google

mittlere obere Flügeldecken dunkelbraunroth; mittlere untere Flügeldecken roth, breit gelb gesäumt; Schwanz bräunlichkupferroth, Enddrittel blau; ganze Unterseite düsterroth; Schnabel schwärzlichhorngrau; Auge gelb; Füße hornbraun, Krallen schwarz. Etwas über Taubengröße. Heimat: die Insel Kuba. Nach Mittheilungen des Reisenden Dr. Gundlach geht er dem Aussterben entgegen, denn er ist bereits sehr selten geworden, während man ihn gegen die fünfziger Jahre hin noch vielfach sah; er kommt nur noch in der Wildniß, fern von Ansiedelungen, vor. In der Lebensweise, Ernährung u. a. zeigt er nichts Abweichendes. Obwol er früher vielfach aus den Nestern genommen, aufgezogen und gehalten worden, so dürfte er bisher doch kaum lebend eingeführt sein, denn die Liste der Thiere des zoologischen Gartens von London hat ihn nicht einmal aufzuweisen. Uebrigens soll er gleich den anderen sprachbegabt sein.

Der blaue gelbbrüstige Arara

[Psittacus ararauna, *L.*].

Gemeiner blauer Arara, Ararauna, großer gelb und blauer Arara. — Blue and yellow Macaw, Blue and buff Macaw. — Ara bleu, Ararauna. — Blauwgeele Ara.

Der gemeine blaue Arara, wie er im Handel meistens heißt, wurde schon von Thevet (1558), dann von Geßner und Aldrovandi geschildert, auch geben jene ältesten Schriftsteller bereits Mittheilungen über sein Leben in der Gefangenschaft, seine Ernährung und alle übrigen Eigenthümlichkeiten, welche im wesentlichen mit dem übereinstimmen, was wir heutigentags über ihn wissen; freilich fließen in solche Angaben auch regelmäßig mancherlei Fabeln ein. Die späteren Schriftsteller, Buffon u. A., haben sich gleichfalls viel mit ihm beschäftigt.

Er ist an Stirn und Vorderkopf bis über die Augen hinaus olivengrün; Ober- und Hinterkopf grünlichblau; Wangen und Ohr-

Digitized by Google

gegend hoch orangegelb; Streif um die Wangen und Oberkehle schwarz; Schwingen und Schwanzfedern an der Innenfahne olivengelblich, schwarz gerandet; ganze übrige Oberseite blau; ganze Unterseite hochorangegelb; Flügel und Schwanz unterseits olivengelb; die unteren Schwanzdecken blau; Schnabel schwarz; Wachshaut, Streif neben dem Schnabel, Zügel und nackte Augengegend fleischfarben, meist bepudert; unterhalb des Auges drei Linien von kleinen schwarzen Federn, drei gleiche Linien vor dem Auge, die ersteren wagerecht, die letzteren lothrecht; Auge grünlichweiß oder grünlichperlgrau; Füße bräunlichschwarz, Krallen schwarz. Nahezu Haushahngröße (Länge 96,5 cm; Flügel 36,5—39 cm; Schwanz 49,5—54,5 cm).

Heimat: Südamerika von Honduras bis Peru, Bolivia und auch Uruguay. Ueber sein Freileben haben Burmeister, Schomburgk u. A. berichtet, jedoch nur kurz und im wesentlichen das in der einleitenden Uebersicht inbetreff aller Gesagte. Das Gelege soll in zwei Eiern bestehen. In der neuern Zeit wird er vielfach eingeführt, sodaß er eigentlich zu den gemeinsten Erscheinungen auf dem Vogelmarkt gehört, und namentlich darf er als eins der gewöhnlichsten Schaustücke in den zoologischen Gärten, wandernden Menagerien und auch auf den Ausstellungen gelten. Nach Dr. Schmidt u. A. ist er recht ausdauernd. Linden theilt mit, daß ein Ararauna in seinem Besitz sich hochbegabt zeigt, vornehmlich sehr klug ist und sehr viel sprechen gelernt, besonders aber eine rasche Auffassungsgabe hat. Die Händler schätzen ihn als den besten Sprecher unter allen Araras. Preis 75 bis 100 M.

Der Caninde-Arara [Psittacus caninde, *Wgl.*] — kleiner gelb und blauer Arara — Caninde Macaw — Ara caninde — Caninde Ara — ist oberseits blau; unterseits orangegelb; ohne schwarze Wangeneinfassung und Kehlfleck; auch an Schenkeln und Hinterleib blau; in allem übrigen dem vorigen durchaus gleich, jedoch viel kleiner. Wagner (1832) hat ihn beschrieben, doch bleibt es sehr fraglich, ob er als selbständige Art oder nur als

Digitized by Google

Spielart angesehen werden darf. Für die Liebhaberei hat er keine Bedeutung.

Der rothbäuchige Arara [Psittacus macavuana, *Fnsch.*] — Rothsteiß-Arara — Red-bellied or Red-vented Macaw — Ara à ventre rouge — Roodbuik Ara — ist gleichfalls noch nicht lebend eingeführt, obwol er nach Burmeister, Schomburgk u. A. zu den gemeinsten Papageien seiner Heimat gehören soll. Es läßt sich aber erwarten, daß er über kurz oder lang zahlreich herüberkommen wird. Er erscheint dunkelgrasgrün; Kopf und Wangen blau; Hinterhals und Oberrücken olivengrünlich; Schwingen und Schwanz unterseits olivengelb; Kehle und Brust blaugrau; Hinterleib düsterblutroth; Schnabel schwarz; nackte Wangen fleischfarbenweiß; Auge ?; Füße schwarzbraun, Krallen heller. Mehr als Taubengröße. Heimat: Brasilien und Guiana. Ueber das Freileben haben die genannten Reisenden wenig berichtet. Er lebe pärchenweise unzertrennlich bei einander und fresse vorzugsweise gern die Früchte der Itapalme. Das Gelege bestehe nur in zwei Eiern; das Geschrei sei hell und kreischend. Früher muß er wol lebend eingeführt sein, denn Buffon erwähnt einen in der Gefangenschaft gehaltnen und sagt, er spreche mit höherer und nicht so rauher Stimme wie die anderen Araras.

Der Arara mit rothem Handgelenk

[Psittacus severus, *L.*].

Anakan, Rothbug-Arara, Zwergarara. — Green, Small or Brown-fronted Macaw. — Ara vert, Ara à front châtain. — Roodhand Ara.

Der Anakan, wie er im Handel gewöhnlich genannt wird, ist schon vom alten Markgraf (1648), dann von Brisson beschrieben und von Linné benannt. Er erscheint in folgender Weise gefärbt: schmaler Stirnrand, Wangenstreif und Streif an der Oberkehle neben dem Unterschnabel röthlichbraun; Kopf und Nacken dunkelgrasgrün, jede Feder breit meerbläulich gesäumt;

Digitized by Google

Schwingen düsterblau, Innenfahne und Spitze schwärzlich, die zweiten Schwingen grün gesäumt, alle unterseits kupferroth; Deckfedern der ersten Schwingen düsterblau; Deckfedern längs des Handgelenks einen breiten scharlachrothen Rand bildend; Schwanzfedern rothbraun, am Enddrittel düsterblau, unterseits kupferroth; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün; ganze Unterseite düstergrün; Schnabel schwarz, an der Spitze heller horngrau; Wachshaut und nackte Wangen gelblichfleischfarben mit Reihen schwarzer Federchen vor und unter dem Auge nach dem Ohr hin besetzt; Auge gelblichweiß bis gelb; Füße schwarzbraun, Krallen schwarz. Beim ganz alten Vogel sind Flügelrand, kleine und mittlere unterseitige Flügeldecken scharlachroth; die größten Flügeldecken kupferroth; an der Schenkelgegend einige rothe Federn. Etwas über Taubengröße (Länge 52 cm; Flügel 22,4—26 cm; Schwanz 20,8—24,3 cm).

Seine Heimat ist ein weiter Strich vom südlichen Brasilien bis Panama, und auch am obern Amazonenfluß hat man ihn erlegt. Ueber sein Freileben haben Prinz von Wied und neuerdings Karl Petermann berichtet. Erstrer sagt, daß er diese kleinen Araras in der Nistzeit parweise, nach derselben in Schwärmen, in denen die Pärchen aber stets beisammen bleiben, beobachtet habe. Sie sitzen besonders gern auf den höchsten dürren Aesten eines Waldbaums, lassen sonderbare knurrende Töne erschallen und selbst der stärkste Gewitterregen vermag sie nicht zu vertreiben; wenn jedoch eine Gefahr naht, so eilen sie unter lautem Kreischen in reißend schnellem Fluge davon. Die Nahrung besteht in Früchten und Sämereien; in den Maispflanzungen und an anderen Kulturgewächsen richten sie großen Schaden an. Herr Petermann traf diesen Arara noch in der Provinz Santa Katharina als Brutvogel und zur Winterzeit in den Flußgebieten unterhalb der Sierra in großen Scharen.

Ueber sein Leben in der Gefangenschaft schreibt schon Buffon recht ausführlich. Er lobt den kleinen Arara, nicht allein als schönen und seltnen Vogel, sondern auch seines sanf-

Digitized by Google

ten einschmeichelnden Wesens halber; er vermöge sowol die menschliche Sprache, als auch das Geschrei und Pfeifen anderer Vögel nachzuahmen, und die erstre lerne er leichter und deutlicher als die großen Araras, er höre anderen sprechenden Papageien zu und unterrichte sich von ihnen. Im übrigen sei seine Stimme nicht so stark und er spreche das Wort ‚Ara' nicht so deutlich aus wie die großen Arten. Im Vogelhandel und auf den Ausstellungen ist er gemein, wenn auch meistens nur einzeln; bei den Liebhabern findet man ihn recht selten, mehr dagegen in den zoologischen Gärten. Der Preis beträgt nur 30 bis 45 M.

Der rothrückige Arara

[Psittacus maracana, *Vll.*].

Rothstirniger Arara, Marakana, Illiger's Arara. — Illiger's Macaw. — Ara à joues rouges, Ara d'Illiger. — Illiger's Ara.

Von Vieillot (1816) beschrieben und benannt und im Handel fast ebenso gemein wie der vorige, ergibt er bis jetzt doch weder hinsichtlich des Freilebens, noch des Benehmens in der Gefangenschaft irgendwelche ausführlichen Nachrichten. Er ist an Stirn und Hinterrücken düster zinnoberroth; Oberkopf düster grünlichblau; Bürzel und obere Schwanzdecken gelbgrün; Schwingen himmelblau, Innenfahne bräunlichgelb; Schwingen unterseits und große unterseitige Flügeldecken düsterolivengelb; Schwanzfedern an der Grundhälfte bräunlichroth; Endhälfte grünlichblau; unterseits düsterolivengelb; ganze übrige Oberseite olivengrasgrün; ganze Unterseite ebenso; Bauchmitte und Hinterleib düster zinnoberroth; Schnabel schwarzbraun, Oberschnabel an Grund und Spitze heller, graulich; nackte Wangen röthlich- bis schwefelgelb mit Reihen schwärzlicher Borstenfederchen besetzt; Auge orange mit graubraunem Ring um die Iris; Füße bräunlichfleischroth, Krallen schwarz. Taubengröße (Länge $41_{,7}$ cm; Flügel $18_{,8}$—$20_{,8}$ cm; Schwanz $18_{,3}$—$19_{,8}$ cm). Heimat: Südbrasilien. Burmeister sagt, er sei hauptsächlich in der Nähe der Strommündungen zu finden; Prinz v. Wied berichtet, daß

Digitized by Google

er gleich allen übrigen in der Nistzeit par-, sonst scharenweise lebe. Schnell dahinfliegend stoßen die rothrückigen Araras helle Rufe aus. Da sie an den Maispflanzungen Schaden verursachen und zugleich ihr Fleisch vortreffliche Brühe liefre, so werden sie stark verfolgt. Gleich dem vorigen sieht man auch diesen hin und wieder in den zoologischen Gärten und auf den Ausstellungen. Dr. Schmidt berichtet von einem, der im Frankfurter Garten 15 Jahr lebte. Bei Herrn Dr. Frenzel in Freiberg nistete ein Pärchen, brachte jedoch die Jungen leider nicht auf. Der Vogel ist im übrigen ebensowenig beliebt wie sein vorhergegangner Verwandter. Preis 30—45 M.

Der Arara mit gelbem Halsband [Psittacus auricollis, *Css.*] — Goldnacken-Arara — Golden-collared Macaw — Ara à collier d'or — Goudkraagen Ara — ist an Stirn und ganzem Vorderkopf tief schwarzbraun; breites Halsband, welches vom Hals nach den Nackenseiten zu sich verschmälert, zitrongelb; Rücken olivengrünlich; erste Schwingen grünlichblau, Innenfahne düsterolivengelb, alle Schwingen unterseits olivengelb; Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel grünlichblau; Schwanzfedern an der Grundhälfte kupferroth; Endhälfte bläulich, Schwanz unterseits düsterolivengelb; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, die Flügeldecken olivengrünlich; Unterseite dunkelgrasgrün; Bauch gelblicholivengrün; Hinterleib blaßröthlich verwaschen; Schnabel bräunlichhornfarben, Spitze heller; Auge?; Füße gelbbräunlich, Krallen dunkler. Größe des vorigen. (Beschreibung nach Dr. Finsch). Heimat: Brasilien. Er wurde von Natterer (1825) gesammelt und von Cassin (1853) benannt. Nach Burmeister soll er auch in den Wäldern von Bolivia nicht selten sein. Bis jetzt ist aber nichts Näheres bekannt. Wenn er, was sich wol voraussetzen läßt, demnächst lebend eingeführt wird, so dürfte er sowol in der Begabung als auch im ganzen Gefangenleben überhaupt den vorhergegangenen Verwandten gleichen. Bisher ist er noch nicht in den Handel gelangt.

Digitized by Google

Der kleine grüne Arara

[Psittacus nobilis, *L.*].

Blaustirniger Arara, Blaustirn-Arara. — Noble Macaw, Noble Parrot. — Ara noble, Petit Ara vert, Ara pavouane. — Blauwneus Ara.

Unter den kleinen Araras der bekannteste und zugleich beliebteste, ist er an Stirn und oberm Augenrand meerblau; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün; Schwingen an der Innenfahne düsterolivengelb, unterseits ganz olivengelb; Deckfedern am Flügelbug längs des Unterarms und Handrands, sowie kleine unterseitige Flügeldecken dunkelscharlachroth; größte unterseitige Flügeldecken olivengrünlichgelb; ebenso der Schwanz unterseits; ganze Unterseite düstergrasgrün; Oberschnabel horngrauweiß, Unterschnabel hornbraunschwarz, Spitze heller; nackte Wangen weiß, ohne Federreihen; Auge orangegelb; Füße dunkelgrau, Krallen schwarzbraun. Nahezu Taubengröße (Länge 33,8 cm; Flügel 17—17,9 cm; Schwanz 13—17 cm). Heimat: Mittelbrasilien.

Der kleine grüne Arara wurde von Linné (1764) zuerst beschrieben und bekannt gemacht. Der Prinz v. Wied berichtet, daß er ihn, obwol er ziemlich scheu und nirgends häufig sei, mitten in einem Städtchen auf Kokuspalmen in kleinen Scharen gesehen und deren lautes Geschrei im Fluge gehört habe. Burmeister sagt, er gleiche in jeder Hinsicht den Verwandten. Näheres ist nicht bekannt. Im Handel und auf den Ausstellungen ist er recht selten, doch sieht man ihn in den zoologischen Gärten ziemlich regelmäßig. In Frau H. v. Proschek in Wien hat er eine liebevolle Pflegerin gefunden, welche berichtet, daß ein Pärchen in ihrem Besitz an Zahmheit und Liebenswürdigkeit unübertrefflich sei und das Männchen an Sprachbegabung mit dem besten Graupapagei wetteifern könne. „Er singt, lacht, klopft an und wenn ich ‚herein' rufe, so fragt er: ‚wo ist die Frau?' u. s. w.; im ganzen hat er wol fünfzig Worte gelernt, und es ist staunenswerth, wie richtig er dieselben anzuwenden weiß. Mit einer Amazone spielt er, als

Digitized by Google

wenn zwei junge Hunde sich balgen.“ Das Pärchen war jahrelang im Besitz der Frau v. P., machte auch mehrmals Nistversuche, doch leider immer vergeblich. Preis 100 M. für das Pärchen, für den einzelnen 60 M.

Hahn's Arara [Psittacus Hahni, *Spc.*] braucht kaum angeführt zu werden, denn er soll dem vorigen durchaus gleichen und sich nur durch einfarbig schwarzbraunen Schnabel und geringre Größe unterscheiden. Heimat: nördliches Südamerika. Hahn (1832) hat ihn schon abgebildet, jedoch von dem vorigen nicht unterschieden. Dies geschah erst von Souancé, der ihn benannte und dann namentlich von Natterer, welcher ihn auf Fruchtbäumen in der Steppe am Rio branco zahlreich erlegte. Obwol aber in den zoologischen Garten von London i. J. 1872 sogar ein lebendes Pärchen gelangt sein soll, dürfte dadurch doch noch nicht der Beweis dafür gegeben sein, daß es eine feststehende Art und nicht blos eine Lokalrasse sei.

Der Arara mit gelben unterseitigen Flügeldecken [Psittacus pachyrrhynchus, *Sws.*] ist an Stirn, Vorderkopf, Zügel- und Augenbrauenstreif dunkelscharlachroth; ganze Oberseite dunkelgrasgrün; Augen- und Ohrgegend heller grün; Flügelbug und Flügeldecken längs des Oberarms scharlachroth; große unterseitige Flügeldecken zitrongelb; ganze Unterseite dunkelgrasgrün; Schenkelgegend scharlachroth; Schnabel schwärzlichhorngrau; Spitze und Dillenkante weißlich; Auge?; Füße und Krallen schwärzlichhorngrau (Beschreibung nach Dr. Finsch). Etwa Taubengröße. Heimat: Mexiko. Von Swainson i. J. 1827 beschrieben. Ueber das Freileben ist nichts bekannt. Da er selbst in den Museen recht selten und lebend noch garnicht eingeführt ist, so brauche ich nichts weiter hinzuzufügen.

* * *

Der jetzt folgende **Langschnabelsittich** [Henicognathus, *Gr.*] ist von Dr. Finsch als ein besondres Geschlecht aufgestellt worden, während

Digitized by Google

andere Ornithologen ihn entweder mit den Araras oder mit den Keilschwanzsittichen zusammengeworfen hatten. Folgende absonderliche Merkmale sind hervorzuheben: Oberschnabel zweimal so lang als hoch, wenig gebogen, an den Seiten abgeflacht, auf dem Rücken mit einer breitern abgerundeten Fläche, die lange verschmälerte Spitze fast wagerecht hervorstehend, am Grunde mit deutlichem Zahnausschnitt, Unterschnabel ebenso hoch, seitlich abgeflacht mit gerundeter Dillenkante und sanft gebogenen Schneideränderu; Nasenlöcher, Wachshaut und Zügel mit Federchen besetzt; nackter Augenkreis schmal; Flügel lang und spitz; Schwanz lang, spitz, keilförmig; Füße und Zehen kräftig, mit starken gekrümmten Nägeln; Gefieder hart. Heimat: nur Chile und Chiloë.

Der Langschnabelsittich

[Psittacus leptorrhynchus, *Kng.*].

Brillensittich, rothstirniger Langschnabelsittich. — Slight-billed Parrakeet. — Ara à lunettes, Enicognathe à bec mince. — Langbek Parkiet.

Bereits von Molina (1776) erwähnt, ist er von King (1838) beschrieben und benannt. Stirnrand, Federchen auf der Wachshaut, Zügel und Augenrand sind purpurroth; Oberkopf dunkelgrün, jede Feder mit breitem schwarzen Endsaum, so daß der Kopf wie geschuppt erscheint; ganze Oberseite dunkelolivengrasgrün; Schwanz ober- und unterseits kupferroth; ganze Unterseite heller olivengrün; Bauchfleck roth; Schnabel bleiblau; Auge hell- bis röthlichgelb; Füße blaugrau. Elsterngröße (Länge 40—41 cm; Flügel 20—21,3 cm; Schwanz 17—18,3 cm). Die Heimat ist oben angegeben; er gehört zu den am weitesten nach Süden hin verbreiteten Papageien und sein Aufenthalt sollen vornehmlich die Buchenwälder sein. Nach den Mittheilungen der Reisenden v. Boeck und Landbeck kommt er als Zugvogel im Oktober in Chile an und zwar in mehr oder minder großen Schwärmen, von denen, wie es scheint, jeder genau ein- und denselben Strich dahinfliegt, und im April wandert er wieder von dannen. Im Vorüberfliegen lassen die Langschnäbel laute, schrille Schreie erschallen. An den Brutorten fliegen sie zu ganz bestimmter

Digitized by Google

Zeit futtersuchend an gewisse Stellen oder zur Tränke. Ihre Nahrung sollen hauptsächlich wildwachsende Wurzeln und Knollen bilden, die sie vermittelst des langen Schnabels ausgraben, doch verursachen sie auch an Reis, Mais u. a. Nutzgewächsen, namentlich aber an den Aepfelbäumen, vielen Schaden; von den Aepfeln fressen sie nur die Kerne und lassen das Fleisch fallen. Die Ansiedler verfolgen sie daher eifrig und suchen sie soviel als möglich zu vernichten oder zu vertreiben. Das Fleisch soll zähe und ungenießbar sein. Nach Valdivia bringen die Eingeborenen häufig junge, aus den Nestern gehobene und aufgefütterte Langschnäbel zum Verkauf. Die genannten Berichterstatter, welche leider garnichts Näheres über das Freileben, die Brut u. s. w. angeben, sagen nur noch, daß dieser Papagei sprechen lerne, jedoch wenig mehr als seinen Namen, welcher Choroy, Cheroy oder Catita laute. In den zoologischen Garten von London soll er bereits i. J. 1836 in einem Kopf gelangt sein. Ich erhielt einen i. J. 1873 und späterhin einen zweiten, von denen der erstre noch jetzt im zoologischen Garten von Berlin lebt. Im Wesen gleicht er den Araras. Anfangs bösartig, wurde der eine, ohne daß ich mich viel mit ihm beschäftigte, ganz von selber zutraulich und fingerzahm, doch habe ich weder ihn, noch den andern sprechen gehört. Der ersterwähnte ließ blos ein wunderliches undeutliches Geplauder erschallen. Freilich besaß ich beide nur je einige Monate. An Sprachbegabung dürfte diese Art den kleinen Araras etwa gleichstehen. Meine beiden Langschnäbel fraßen ausschließlich Hanf, Mais und Kanariensamen und verschmähten alles übrige. Preis 45 bis 60 M.

* * *

Die Edelsittiche [Palaeornis, *Vgrs.*] haben in mehrfacher Hinsicht hohen Werth für die Liebhaberei gewonnen, ja, sie sind durch ihre Eigenthümlichkeiten bereits seit den ältesten Zeiten her beliebt und

Digitized by Google

hochgeschätzt. Ihre Vorzüge beruhen in angenehmer Gestalt und schöner Färbung, sodann in hervorragender Sprach- und geistiger Begabung überhaupt, bzl. in ungemein großer Zähmungs- und Abrichtungsfähigkeit; zu diesen Vorzügen ist neuerdings noch der gekommen, daß eine Anzahl von ihnen zu dem ergibigsten Zuchtgefieder in der Vogelstube gehört.

Während die Araras, welche ebenfalls zu den langschwänzigen Papageien gehören und hier bereits geschildert worden, als wirkliche Stubenvögel kaum mitgezählt werden können, bilden die Edelsittiche in der Gruppe der jetzt folgenden eigentlichen Sittiche das erste und streng genommen einzige Geschlecht, in dessen Reihen wir hervorragend sprachbegabte Arten vor uns sehen. Sie dürfen daher den noch zu behandelnden übrigen Sittichen, welche an Sprachfähigkeit weit hinter ihnen zurückbleiben, billigerweise vorangestellt werden.

Als ihre besonderen Kennzeichen sind folgende hervorzuheben: Schnabel kräftig, ebenso lang oder länger als hoch, Oberschnabel an der Grundhälfte kantig abgesetzt mit flacher Längsrinne, Seiten nur etwas zusammengedrückt, Spitze stark abwärts gekrümmt, überhängend mit kleinem Zahnausschnitt, Unterschnabel mit breiter, gerundeter Dillenkante; Zunge dick, fleischig, mit breiter stumpfer Spitze; Nasenlöcher klein, frei, in schmaler Wachshaut; Auge groß und rund, auffallend durch die Fähigkeit, je nach wechselnder Empfindung die Pupille außerordentlich zu vergrößern oder zu verkleinern; Zügel und Augenkreis befiedert; Flügel lang und spitz; Schwingen am Ende stumpf zugerundet, selten ganz spitz; Schwanz keilförmig abgestuft, die beiden mittelsten Federn gewöhnlich weit länger als die übrigen; Füße kurz und stark; Gefieder ziemlich hart ohne Puderdaunen; Gestalt kräftig, doch schlank. Drossel- bis Taubengröße. Flug überaus gewandt, hurtig, mit raschem Flügelschlag, beim Herablassen schwebend; Gang watschelnd, doch nicht ganz so ungeschickt wie bei den nächsten Verwandten; sie klettern rasch und anmuthig.

Ihre Verbreitung ist eine sehr weite und zwar sind sie in Afrika und Asien heimisch; der eine wird sogar in beiden Welttheilen zugleich gefunden, während die meisten anderen nur je einen beschränkten Heimatsbezirk haben. Ihr Freileben ist erst verhältnißmäßig wenig erforscht; auch hier sei mir gestattet, beiläufig mit Freude darauf hinzuweisen, daß die Züchtung in der Gefangenschaft die Brutentwicklung mehrerer Arten kennen gelehrt hat. Die Edel-

Digitized by Google

sittiche sollen fast immer gesellig leben, jedoch niemals in mehreren Arten zusammen. Hinsichtlich des Nistens gleichen sie den übrigen Papageien insofern, als das Nest in einem hohlen Baumstamm, bei einigen Arten aber auch in einer Felsen- oder Mauerhöhlung sich befindet. Das Gelege sollen zwei bis vier Eiern bilden; jedes Pärchen macht alljährlich mehrere Bruten hintereinander. Ihren Aufenthalt bilden vornehmlich die Niederungen längs der Ströme, welche mit dichtem Wald bestanden sind, aber auch freiere ebene oder hügelige Gegenden, und manche Arten sollen bis zu 1600 m hoch im Gebirge anzutreffen sein. Die Nahrung besteht in allerlei Sämereien und Früchten. Nach der Brutzeit sammeln sie sich zu mehr oder minder großen Schwärmen an und fallen nahrungsuchend über die Nutzgewächse, namentlich Reis und Mais her. Deshalb werden sie häufig in erbitterter Weise befehdet. Dann zeigen sie sich als überaus verschlagen und vorsichtig; in den dichten Kronen der höchsten Bäume wissen sie sich, durch ihre grüne Farbe geschützt, vortrefflich zu verbergen, indem sie sich regungslos verhalten, bis einer nach dem andern heimlich von dannen flüchtet. Wo sie nicht verfolgt werden, wie in Indien, sind sie so dreist, daß sie inmitten volkreicher Städte in Höhlungen der auf freien Plätzen stehenden Bäume oder in Löchern an hohen Gebäuden nisten.

In ihren Heimatsländern sind manche Arten, so erzählen die Reisenden, gleichsam halb gezähmt in den Ortschaften zu finden, indem sie dort nicht allein wie erwähnt nisten, sondern auch mit dem Hausgeflügel zusammen gefüttert werden. Bei den Eingeborenen sind alle diese Sittiche überhaupt ungemein beliebt und man sieht sie zahlreich in Käfigen oder auf Bügeln angekettet. Manche Arten werden in sehr großer Anzahl aus den Nestern gehoben und aufgezogen, die meisten eingeführten aber sind jedenfalls Vögel, welche vermittelst großer Netze bei der Tränke u. a. eingefangen worden. Auch diese letzteren sind der Zähmung und Abrichtung jederzeit unschwer zugänglich, und von den zu uns gelangenden werden nicht allein die jüngeren aus den Nestern geraubten und aufgezogenen, sondern selbst die älteren Wildfänge fast immer in verhältnißmäßig kurzer Zeit zahm und zutraulich und ergeben sich als abrichtungsfähig.

Auch bei den Edelsittichen äußert sich die Sprachbegabung als außerordentlich verschiedenartig je nach der Befähigung des einzel-

Digitized by Google

nen Vogels von einunddersel̈ben Art, doch darf man hier, ganz ebenso wie bei den großen Kurzschwänzen annehmen, daß sich die beiweitem meisten als Sprecher und nur überaus wenige als garnicht für einen sachgemäßen Unterricht geeignet ergeben.

Alles bis hierher Gesagte bezieht sich im wesentlichen nur auf eine Gruppe, die sog. Alexandersittiche, wie sie im Handel genannt werden, während die reizenden, leicht züchtbaren Pflaumen- oder Rosenkopfsittiche sowie der absonderlich und schön gefärbte Taubensittich u. a. sich bisher noch nicht als sprachbegabt erwiesen haben. Selbstverständlich muß ich die nichtsprechenden hier ausschließen und mich nur den Alexandersittichen zuwenden.

Sie sind kräftige, derbe Vögel, welche sich bei einfachster Verpflegung eigentlich nur mit Sämereien: Hanf, Hafer, Kanariensamen und Mais, nebst Zugabe von guter Frucht und allenfalls etwas Biskuit oder Eierbrot, viele Jahre hindurch vortrefflich im Käfig erhalten lassen. Mit dieser Anspruchslosigkeit vereinigen sie den eingangs schon erwähnten und für die Leser dieses Buchs vorzugsweise bedeutungsvollen Vorzug, daß sie zu den besten Sprechern gehören und in einzelnen Arten, bzl. Köpfen den Amazonen und dem Jako nahe oder wol gar gleich kommen, sodann auch den, daß sie unendlich zahm, liebenswürdig und sanft ihrem Herrn gegenüber sich zeigen. Dabei haben sie aber freilich auch ihre Schattenseiten, denn sie zählen zu den allerschlimmsten Schreiern, die sich zeitweise garnicht beruhigen lassen, ferner zu den unverwüstlichen Holzzerstörern, die an Käfig oder Ständer alles, was nicht von Metall ist, völlig zersplittern und zertrümmern, und schließlich auch anderen Vögeln gegenüber zu den bösartigsten Raufbolden. Bei unvorsichtigem Verkehr ergeben sie sich als sehr arge Beißer und bei unverständiger kenntnißloser Behandlung kann kein Vogel leichter zum störrischen, boshaften und bissigen Geschöpf verdorben werden, als gerade ein Alexandersittich.

Einige der hierher gehörenden Arten zählen zu den gewöhnlichsten im Handel, andere dagegen sind sehr selten. Bei den einzelnen Arten werde ich Näheres in dieser Beziehung und auch die sich sehr verschieden stellenden Preise angeben. In Anbetracht dessen, daß häufig unausgefärbte Vögel eingeführt werden oder daß ein Liebhaber solche hier gezüchtet kauft, sei bemerkt, daß alle diese Sittiche sich sehr spät, meistens erst zu Ende des zweiten Jahres, ausfärben.

Digitized by Google

Der Halsband-Edelsittich

[Psittacus torquatus, *Bdd.*].

Kleiner Alexandersittich oder Alexanderpapagei, Halsbandsittich. — Ring-necked Parrakeet, Rose-ringed Parrakeet, Ring-necked Alexandrine Parrakeet. — Perruche à collier rose, Perruche Alexandre à collier de l'Inde, Perruche Alexandre à collier du Sénégal. — Kleene Alexanderparkiet of Halsband Edelparkiet.

Wo in der frühesten betreffenden Literatur ein Papagei erwähnt ist, handelt es sich immer um diese Art. Seit Plinius bis zu Aldrovandi und Geßner geben die Schriftsteller Beschreibungen und Schilderungen von ihm. Daher ist es erklärlich, daß bis zur neuern Zeit her auch mancherlei Irrthümer inbetreff seiner unterlaufen sind; so ließ man ihn in Amerika heimisch sein, beschrieb ihn in mehreren Arten u. s. w. Nachweislich ist er schon zur Zeit Alexander des Großen nach Europa gebracht worden. Buffon, sodann Bechstein u. A. geben auch bereits Nachrichten über sein Gefangenleben.

Seit altersher also und bis zu unseren Tagen ist er beliebt und geschätzt geblieben und zwar wenn auch vorzugsweise als Sprecher, so doch zugleich als Schmuckvogel. In der neuesten Gegenwart hat man noch einen besondern Anreiz für seine Hegung als Stubenvogel gefunden, in seiner Züchtung nämlich. Durch die letztre ist zugleich seine naturgeschichtliche Entwicklung so eingehend erforscht worden, wie dies in der Freiheit, trotz seiner außerordentlich weiten Verbreitung, trotz seines massenhaften Vorkommens und trotzdem er zu den seit den ältesten Zeiten her bekannten Vögeln gehört, noch nicht geschehen war.

Der Halsband-Edelsittich, altes Männchen, ist an Stirn, Oberkopf und Kopfseiten grasgrün; schmaler Zügelstreif schwarz; Hinterkopf und Nacken zart lilablau; um den Hinterhals ein breites rosenrothes Band; an der Kehle ein hellgelbes Band; Bartfleck schwarz, von dem letzern aus an den Kopfseiten entlang ein schwarzer

Digitized by Google

Streif, welcher schmaler werdend sich bis zum Hinterkopf hinzieht; Rücken gelblicholivengrün; Unterrücken und obere Schwanzdecken grasgrün; Schwingen dunkelgrasgrün, Außenfahne schmal hellgelb gesäumt, Schwingen unterseits aschgrau; die beiden mittelsten Schwanzfedern bläulichgrün, die übrigen gelbgrün, Innenfahne mattgelb, unterseits alle mattgelb; ganze übrige Oberseite grün; Oberbrust meerbläulichgrün; ganze übrige Unterseite gelblichgrün; Schnabel blutroth (oder Oberschnabel roth, Unterschnabel schwarz oder Oberschnabel schwärzlichpurpurroth, Unterschnabel schwarz); Auge hellgelb, von nacktem rothen Augenring umgeben; Füße schwärzlichgrau mit schwarzen Krallen. Altes Weibchen: Oberkopf und Kopfseiten grün, viel dunkler als beim Männchen, mit wenig bemerkbarem gelben Ton; nur ein schmales graues Nackenband (das rosenrothe Halsband und der schwarze Bartfleck fehlen); ganze Oberseite schwach düster-, nicht so stark, olivengrün; Unterrücken matt hellgrün; Oberschnabel roth, Unterschnabel schwärzlichgrau; Auge hellgelb. Das junge Männchen gleicht dem alten Weibchen, ist jedoch fahler grün; hat weder das Halsband, noch den Bartfleck und bekommt beides erst im zweiten Jahr. Größe einer kleinen Haustaube (Länge $36_{,5}$—39 cm; Flügel 12—$17_{,2}$ cm; längste Schwanzfeder $12_{,0}$—$25_{,4}$ cm, äußerste Schwanzfeder 5—$7_{,8}$ cm).

Er ist in Asien und Afrika zugleich heimisch; im erstern Welttheil erstreckt sich seine Verbreitung von Bengalen bis Nepal, Kashmir, Tenasserim und Oberpegu, sowie über Ceylon; im letztern Welttheil vom Senegal bis Abessinien, nördlich bis zum 16. Gr., südlich bis zum 7. Gr., im Gebirge bis zu 1500 m Höhe, und in Südafrika hat er sich, zufällig oder absichtlich eingeschleppt, zum Brutvogel eingebürgert. Die Vogelhändler unterscheiden die Vögel von beiden Welttheilen darin, daß die alten ausgefärbten Halsbandsittiche aus Asien rothe Schnäbel, aus Afrika röthlichschwarze Schnäbel haben.

Ueber das Freileben liegen im ganzen recht geringe Nachrichten vor; am eingehendsten berichten Layard und Th. v. Heuglin. In Asien sieht man die Halsbandsittiche nicht allein auf den Bäumen an den Straßen, sondern auch auf den Dächern der

Digitized by Google

Gebäude sitzen. Ganze Schwärme übernachten in alten hohlen Bäumen. Abends zanken sie sich mit lautem Geschrei um die Sitze auf den hohen Kokusnußbäumen, zu denen sie in kleineren oder größeren Schwärmen aus allen Richtungen herbeifliegen. Feuert man dann einen Schuß ab, so erheben sie sich mit einem Getöse, welches man nur mit dem Brausen des Sturmwinds vergleichen kann. Bis zur völligen Finsterniß hin verursachen sie durch ihr Geschrei einen entsetzlichen Lärm. Als ihre Nahrung nennt Heuglin mancherlei Sämereien, die Früchte der Affenbrotbäume, Feigen, Datteln, Dattelpflaumen u. a. m. Die Nester befinden sich in den Astlöchern von Akazien- und anderen Bäumen, namentlich aber von Affenbrotbäumen, und häufig brüten zahlreiche Pärchen nebeneinander. Jerdon berichtet, daß er die Brut auch in den Mauerlöchern alter Pagoden oder anderer Gebäude und sogar in Erdlöchern an steilen Ufern fand. Die Halsbandsittiche überfallen, insbesondre nach der Brutzeit, wenn sie sich zu großen Scharen ansammeln, Gärten und Felder und verursachen besonders dadurch, daß sie viel mehr vernichten als verzehren, überaus großen Schaden. Sie werden deshalb von den Ackerbauern eifrig verfolgt; die Indier aber begnügen sich damit, sie zu verscheuchen.

Wol kaum ein andrer Papagei wird so zahlreich aus den Nestern gehoben und aufgefüttert wie dieser und daher gelangt er nicht allein sehr zahlreich in den Handel, sondern die meisten Halsbandsittiche sind auch bereits fingerzahme Vögel; insbesondre gilt dies von den indischen, während am Senegal oder auf Ceylon auch in großer Anzahl alte mit Netzen gefangen werden.

Als Stubenvogel hat der Halsbandsittich in der That einen bedeutenden Werth, denn er wird, gleichviel ob aus dem Nest genommen oder alt eingefangen, leicht zahm, der erstre überraschend bald, der andre in auch nicht langer Frist. In

Digitized by Google

einzelnen Fällen lernt er sodann vorzüglich sprechen; man hat Beispiele, in denen ein solcher Sittich hundert Worte und ganze Redensarten und noch dazu in mehreren Sprachen, Deutsch, Englisch und Französisch, klar und deutlich aussprechen konnte, während er zugleich staunenswerthe Klugheit und Intelligenz entwickelte. Die Seite 299 erwähnten übelen Eigenschaften der Edelsittiche kommen aber stets, selbst bei einen solchen hervorragenden Sprecher, zur Geltung. Als einen Vorzug muß ich jedoch auch hier noch die kräftige Ausdauer rühmen, denn man hat Vögel dieser Art bereits mehrfach im Freien überwintert.

Herr Photograh Otto Wigand in Zeitz ist so glücklich gewesen, den Halsbandsittich zuerst zu züchten, seinen Brutverlauf, das Jugendkleid und die Verfärbung zu beschreiben. Auf Grund solcher Ergebnisse konnten alle bisher obwaltenden Streitfragen inbetreff dieser Art mit voller Sicherheit entschieden werden.

Will man einen Halsbandsittich zur Abrichtung einkaufen, so wähle man, wenn möglich, einen jungen, noch einfarbig grünen Vogel; ob derselbe sich späterhin zum Männchen oder Weibchen ausfärbt, ist gleichgiltig. Einen alten unbändigen Vogel, der bei jeder Annäherung schreit, nehme man nicht. Die Fütterung ist wie Seite 299 in der Uebersicht mitgetheilt, zu reichen. Inbetreff der Zähmung und Abrichtung wolle man das in dem besondern Abschnitt Seite 49 ff. Gesagte beachten. Der Preis für den rohen Halsbandsittich ist sehr niedrig, beträgt zuweilen nur 9 M., und man braucht sich dann nicht zu scheuen, wenn der Vogel auch sehr schlecht im Gefieder ist. Meistens steht der Preis auf 12 bis 15 M.; das Pärchen kostet 24 bis 30 M.; der abgerichtete, gut sprechende Sittich 50 bis 150 M. und darüber.

Digitized by Google

Der Halsband-Edelsittich von Mauritius [Psittacus eques, *Bdd.*] — breitschwänziger Halsband-Edelsittich, Ritter- oder Reiter-Edelsittich — Mauritius Alexandrine Parrakeet — Perruche Alexandre de l'isle de Maurice — Mauritius Edelparkiet — ist dunkelgrasgrün ohne graugrünen Anflug; schmales Nackenband blau; jederseits an den Halsseiten ein gelblichzinnoberrother Fleck; Bartstreif schwarz; schmaler Zügelstreif schwarz; Rücken und Bürzel nicht bläulich, sondern lebhaft dunkelgrün; große Achselfedern und kleine unterseitige Flügeldecken lebhaft gelb; Schwanzfedern dunkelgrün ohne blauen Anflug, Innenfahne düstergelb, unterseits ganz düsterorangegelb; die beiden mittelsten Schwanzfedern wenig verlängert; ganze Unterseite grasgrün (Brust nicht graulichgrün); Oberschnabel roth, Unterschnabel schwarzbraun; Auge hellgelb, nackter Kreis orangegelb; Füße grau, Krallen schwarz. Weibchen ebenso, doch ohne Halsband und Zügellinie; im Alter an den unteren Wangen ein schwärzlicher Streif; Schnabel einfarbig schwarzbraun. Jugendkleid an der Unterseite schwach gelblichgrün; Oberschnabel am Grunde röthlichbraun; im übrigen dem Weibchen gleich. Größe ein wenig beträchtlicher als die des vorigen. (Länge 38 — 40,5 cm; Flügel 16,4 — 17,6 cm; längste Schwanzfeder 15 — 19,6 cm; äußerste Schwanzfeder 5,4 — 7,8 cm). Heimat: nur die Insel Mauritius. Obwol dem vorigen überaus ähnlich und hauptsächlich nur durch dunkler grüne Färbung verschieden, ist er doch von Dr. Finsch u. A. mit Entschiedenheit als besondre Art aufgestellt worden, und auch ich muß ihn selbstverständlich als solche festhalten. Er wurde von Boddaert (1783) wissenschaftlich benannt, nachdem ihn Brisson und Buffon bereits abgebildet und beschrieben. Die Reisenden Gebrüder Newton haben über sein Freileben kurze Mittheilungen gemacht, nach denen er in allem dem vorhergegangnen Verwandten gleicht. Er sei sehr scheu, halte sich in den Waldungen fern von menschlichen Wohnungen auf, sitze immer versteckt in den Kronen der höchsten Bäume und fliege hoch über Schußweite. Infolge des Herunterschlagens der Wälder erleide er eine allmälige, doch bemerkbare Verringerung, sodaß man am Ende gar sein Aussterben befürchten müsse. In

Digitized by Google

den Handel gelangt er höchst selten und dann wird er auch noch wol mit dem Verwandten verwechselt. Ein Edelsittich dieser Art in meinem Besitz wurde überaus zahm und liebenswürdig und lernte gut sprechen. Preis dem des vorigen gleich.

Der rothschulterige Edelsittich mit rosenrothem Halsband

[Psittacus eupatrius, *L.*].

Großer Alexandersittich, blos Alexandersittich, rothschulteriger Edelsittich, Hochedelsittich. — Great Alexandrine or Alexander Parrakeet. — Grande Perruche Alexandre, Grande Perruche d'Alexandre. — Groote Alexanderparkiet.

Nicht ganz so gemein im Handel wie der vorige und bis vor kurzem sogar recht selten eingeführt, ist er doch ebenfalls allbekannt und erscheint im wesentlichen als das größre Abbild jenes. Er wurde von Edwards (1747—1764) zuerst beschrieben und abgebildet und von Linné wissenschaftlich benannt.

Das alte Männchen ist grasgrün; Hinterhals und Oberbrust schwach graugrün angeflogen; im Nacken ein breites rosenrothes Halsband, welches sich jederseits an den Halsseiten mit einem schwarzen Bande vereinigt, während das letztre am Grunde des Unterschnabels beginnt und die Oberkehle bedeckt; Rücken reingrün; die kleinsten Deckfedern am Unterarm bilden einen großen kirschbraunrothen Fleck; Schwanzfedern an der Endhälfte bläulich, unterseits dunkelolivengrünlichgelb; Schnabel dunkelpurpurroth; Auge gelblichweiß; Füße fleischfarben, Krallen schwärzlich. Das Weibchen hat kein rothes Nacken-, und kein schwarzes Oberkehlband, doch den rothen Fleck am Unterarm; Schnabel roth. Jugendkleid (wie die jungen Vögel in den Handel gelangen): oberhalb mehr graulich-olivengrün; unterhalb gelbgrün; von Nacken- und Kehlband, sowie Schulterfleck keine Spur; Auge gelblichweiß. Stark Taubengröße (Länge 40—45 cm; Flügel 18—$22_{,2}$ cm; längste Schwanzfeder $20_{,4}$—$31_{,2}$ cm; äußerste Schwanzfeder $7_{,4}$—9 cm).

Heimat: das ganze Festland von Ostindien und Ceylon.

Digitized by Google

Besonders zahlreich soll er auf der indischen Halbinsel sein. Ueber sein Freileben haben Jerdon, Blyth, Layard u. A. berichtet. Er halte sich besonders in den hügeligen Wäldern und Dickichten auf und komme nicht in die Gärten oder Ortschaften wie der kleinre Verwandte. Große Schwärme überfallen die Reisfelder. Die Brut soll in den Monaten Dezember bis Januar stattfinden und das Gelege in zwei bis vier Eiern bestehen; jährlich werden zwei Bruten gemacht. Hiermit sind die Nachrichten über sein Freileben erschöpft. Hagmann berichtet, daß er in Indien ebenso bekannt und allbeliebt wie der Halsbandsittich sei.

Seit altersher bis vor ganz kurzer Zeit herrschten inbetreff des großen Alexandersittich mancherlei Irrthümer, selbst Dr. Finsch wußte in seiner hier mehrfach erwähnten Monographie die Geschlechter nicht zu unterscheiden, sondern behauptete, den Angaben der indischen Naturforscher entgegengesetzt, daß das Weibchen übereinstimmend mit dem Männchen gefärbt sei. In meinem Werke „Die fremländischen Stubenvögel" III. sind beide Geschlechter mit voller Sicherheit auseinander gehalten und beschrieben.

Auf Ceylon werden die Jungen vielfach aus den Nestern gehoben, aufgezogen und abgerichtet. Diese Art steht dort und ebenso bei uns in dem Ruf, daß sie zu den hervorragendsten Sprechern und begabtesten Papageien überhaupt gehöre. Ihr Leben in der Gefangenschaft haben neuerdings liebevolle Beobachter und Kenner geschildert, so insbesondre die Herren E. Lieb in Palmyra in Südrußland und Dr. Steinhausen in Straßburg i. E. Erstrer bezeichnet diesen Sittich als überaus klug und intelligent; sein Geschrei sei aber unerträglich, denn selbst die schrillen Töne der Amazonenpapageien bleiben dagegen Stümperei. Dr. St. fügt hinzu, daß er doch eigentlich nur dann die Gehörnerven seines Pflegers peinige,

Digitized by Google

wenn er sich langweile, unbehaglich fühle oder etwas verlange, was man ihm vorenthalte; auch wenn er sich über eine fremde Erscheinung ärgre. „Sonst zeigt er sich außerordentlich liebenswürdig, nimmt mir das Futter aus dem Munde, küßt und plaudert fast den ganzen Tag, letztres freilich ohne große Abwechselung, doch außerordentlich deutlich und wohlklingend. Besonders auffallend ist bei ihm die gefühlvolle Betonung, welche er z. B. in das Wort ‚Girawa' — seinen Namen — zu legen vermag. Die Menschenähnlichkeit der Stimme, deren Zartheit und Veränderungsfähigkeit, ist erstaunlich und die unendliche Sehnsucht, welche darin ausklingt, hat oft etwas tief Ergreifendes. . . Zu loben ist auch, daß er sein Gefieder stets reinlich und glatt erhält. Wenn er Wallnüsse bekommt, welche er überaus gern frißt, so benutzt er die lere Schale in eigenthümlicher Weise. Er trinkt dann nie anders, als daß er die Schale mit dem Schnabel ergreift, sie vorsichtig mit Wasser vollschöpft und dieses auf seinem Futterplatz ausschlürft." Man hat auch mit ihm mehrfach Züchtungsversuche angestellt, doch haben dieselben bis jetzt zu keinem erfolgreichen Ergebniß geführt. Um seiner Schönheit, Zahmheit und Zutraulichkeit willen ist er der allgemeinen Beliebtheit werth und wenn man ihn zweckmäßig zu behandeln verstände, so würde er dieselbe in noch viel höherm Maße finden, als er sich derselben erfreut. Ich bitte die Liebhaber, meine in dem btrf. Abschnitt (Seite 49) gegebenen Rathschläge über die Abrichtung zu beobachten und dann einen solchen Erzschreier, wie man ihn wol vielfach nennt, ohne Bedenken zu kaufen. Er wird sich nicht undankbar zeigen. Der Preis steht auf 50 bis 75 M. für den Sprecher und 30 bis 45 M. für den rohen Vogel; das Par etwa 60 M.

Der rothschulterige Edelsittich ohne rothes Halsband [Psittacus Wardi, *Nwtn.*] ist dunkelgrasgrün; an Stirn und Vorder-

Digitized by Google

kopf smaragdgrün; Hinterkopf und Kopfseiten bläulich angeflogen, jederseits ein breiter schwarzer Bartstreif, welcher sich im schmalen Bande bis zum Nacken zieht, ober- und unterseits von einem bläulichgrünen Bande begrenzt; großer Fleck am Unterarm kirschroth; Schnabel purpurroth. Weibchen übereinstimmend; mit Schulterfleck, doch ohne Bartfleck und Halsstreif. Vom vorigen nur durch den Mangel des rosenrothen Nackenbands verschieden. Heimat: Seyschellen. Erst i. J. 1867 wurde er von E. Newton beschrieben. Er soll, da er an Mais u. a. Feldfrüchten großen Schaden anrichtet und deshalb schonungslos verfolgt wird, sowie durch das Herunterschlagen der Wälder der Ausrottung entgegengehen und schon jetzt sehr selten sein. Diese Erwähnung genügt daher. — **Hodgson's Edelsittich** [Psittacus Hodgsoni, *Fnsch.*] — Hodgson's Parrakeet — Perruche de Hodgson — Hodgson's Edelparkiet — ist grasgrün; Kopf schwärzlichschiefergrau; Halsband hellgrasgrün; Bartfleck und schmaler Streif bis an die Halsseiten schwarz; Fleck am Unterarm purpurbraun; Schwanzende gelb. Weibchen ebenso, doch das Nackenband schwächer; der Fleck am Unterarm fehlt; (Bartfleck?). Durch die schwärzlichgraue Kopffärbung und die bedeutendere Größe vom Halsbandsittich zu unterscheiden. Heimat: das indische Festland und die Regionen des untern und mittlern Himalaya; dort soll er zu den gemeinsten Vögeln gehören und namentlich in ganz Bengalen überall häufig sein. Trotzdem wurde er erst i. J. 1836 von Hodgson beschrieben und dann von Finsch wissenschaftlich benannt. Inanbetracht seiner weiten Verbreitung, seines häufigen Vorkommens und der Angabe, daß er in Kalkutta, vornehmlich aber in Dakka u. a., sehr häufig zu Markt gebracht werden soll, ist es verwunderlich, daß er bei uns erst ein einziges Mal und zwar von Herrn Großhändler J. Abrahams in London, in einem Pärchen lebend eingeführt worden. Wenn er demnächst, woran nicht zu zweifeln ist, häufiger kommt, so dürfte er in seinen Eigenthümlichkeiten wol den nächsten Verwandten gleichen und eine willkommne Bereicherung der Liebhaberei bilden. —

Digitized by Google

Der blaubürzelige Edelsittich [Psittacus Cathropae, *Blth.*] ist an Stirn, Zügeln, Augengegend, Nackenband und Kehle smaragdgrün; Kopf lilablau; Bartfleck und schmaler Saum um die Wangen schwarz; Mantel bläulichgrau; Rücken und Flügel grasgrün; Hinterrücken, Bürzel und Schwanz blau; Schnabel roth. Heimat: Ceylon, wo er von Layard (1849) in gebirgigen Gegenden entdeckt worden; die wissenschaftliche Benennung hat Blyth gegeben. Für die Liebhaberei mangelt diesem Sittich jegliches Interesse und daher mag diese Erwähnung ausreichend sein.

Der rothschnäbelige Edelsittich mit rother Brust

[Psittacus Alexandri, *L.*].

Rosenbrüstiger Alexandersittich von Java, blos Alexandersittich von Java, javanischer Edelsittich, blos Alexandersittich (!), Rosenbrustsittich. — Javan Alexandrine Parrakeet, Javan Parrakeet, Jew Parrakeet. — Perruche Alexandre de Java, Perruche à poitrine rose. — Java Alexanderparkiet.

Drei Arten dieser Papageien erscheinen einander recht ähnlich und man nennt sie daher gemeinsam Rosenbrüstige Alexandersittiche. Sie sind auch vielfach verwechselt und zusammengeworfen worden, sodaß es erst der gründlichen Forschung des hervorragendsten Gelehrten auf diesem Gebiet, Dr. Finsch, bedurfte, um sie mit Sicherheit zu unterscheiden. Sie sollen in ihrer Heimat überaus beliebt sein und viel gehalten werden, doch hatten sie bei uns bis vor kurzem für die Liebhaberei sämmtlich recht geringes Interesse, denn man erachtete sie als wenig begabt und als auch nicht liebenswürdig; in der neuesten Zeit aber sind Pfleger und Kenner dieser Vögel aufgetreten, welche Bedeutsames zu ihren Gunsten mitgetheilt haben.

Der rothschnäbelige Edelsittich mit rother Brust hat Stirnrand und Zügelstreif schwarz; Kopf und Kopfseiten sind graugelb; breiter Bartstreif und Streif an der Wange bis über die Halsmitte schwarz; Hinterhals und Nacken grasgrün; Schwingen an den Innen-

Digitized by Google

fahnen grau, unterseits ganz aschgrau; großer länglicher Fleck auf dem Flügel olivengelb; Schwanzfedern grün, fahlgelb gespitzt, die beiden mittelsten blau, alle unterseits düstergelb; ganze übrige Oberseite olivengelblichgrün; von der Kehle bis zur Bauchmitte matt rosenroth; übrige Unterseite gelbgrün; Schnabel roth, Wachshaut weiß; Auge hellgelb, Augenring gelblichgrau; Füße bräunlichgrau, Krallen schwärzlich. Größe etwas geringer als die des Halsbandsittichs (Länge 32—34 cm; Flügel $13_{,6}$—$14_{,8}$ cm; längste Schwanzfeder $11_{,8}$—15 cm; äußerste Schwanzfeder 5—$5_{,9}$ cm). Heimat: Java, Borneo, wahrscheinlich auch Sumatra und Malakka.

Zu den auf Osbeck's Reise (1757) gesammelten Vögeln gehörend, ist diese Art von Odhel (1760) zuerst beschrieben und von Linné benannt; sie darf daher als der eigentliche Alexanderpapagei Linné's gelten; keineswegs aber ist sie jener Papagei, der seit Alexander's und Cäsar's Zeit in Europa bekannt geworden, sondern dies war, wie S. 300 angegeben, der sog. kleine Alexandersittich oder Halsbandsittich.

Nach Angabe der Reisenden, insbesondre des Dr. H. A. Bernstein, bewohnt dieser Edelsittich vorzugsweise die heißen, niedrig gelegenen Striche, sowie die Vorberge bis zu 1300 m Höhe. Während er sich in den dichten Kronen der höchsten Bäume geschickt zu verbergen weiß, verräth er sich durch seine laute, kreischende Stimme. Ueber die Brut ist nichts Näheres bekannt. Das Gelege soll nach Mittheilungen verschiedener Forscher in zwei bis vier Eiern bestehen. Nach der Nistzeit streichen sie nahrungsuchend, bei Tage par- oder familienweise, umher, gegen Abend aber scharen sie sich in großen Schwärmen zum Uebernachten auf hohen dichtbelaubten Bäumen oder im Bambusdickicht zusammen. An einem solchen Versammlungsort verursachen sie ohrenbetäubenden Lärm, welcher spät bis zum Dunkelwerden dauert und mit dem anbrechenden Tage von neuem beginnt.

Da auch dieser Sittich, gleich allen vorhergehenden, in

Digitized by Google

seiner Heimat als Stubenvogel gehalten wird, sehr beliebt und geschätzt sein soll, so ist es wiederum verwunderlich, daß er nur selten lebend bei uns eingeführt wird. Schon Bechstein schildert ihn als „allerliebsten, gelehrigen und gesprächigen Papagei von außerordentlicher Zahmheit, zärtlichem und schmeichelhaftem Betragen". Vor Jahren besaß ich einen rosenbrüstigen Sittich von Java, hatte aber wenig Freude an ihm, denn er wurde weder zahm, noch ergab er sich als gelehrig. Schlechtendal machte eine ähnliche Erfahrung, doch zeigte sich bei ihm ein zweiter Sittich dieser Art als recht begabt, indem derselbe ohne besondern Unterricht etwas sprechen lernte und überaus zahm wurde. Als die liebevollste Pflegerin der rothschnäbeligen Alexandersittiche erscheint Frau Baronin S. v. Schlechta in Wien. Sie hatte bis jetzt fünf Köpfe und lobt alle als ungemein liebenswürdig. Von einem Weibchen sagt sie: „Kein Ton ist widerlich oder auch nur grell, alle erklingen hell und heiter. Es zeigt gegen mich keine Spur von Bosheit oder Heftigkeit, läßt sich vielmehr streicheln und aus dem Munde füttern. In kurzen Zwischenräumen hintereinander legte es 42 Eier, die jedoch sämmtlich weichschalig waren und von ihm selber gefressen oder doch vernichtet wurden. Auch die übrigen rosenbrüstigen Alexandersittiche äußern eine innige Anhänglichkeit gegen meine Person und zeigen sich reizend neckisch und begabt. Der eine dieser Vögel spricht mit deutlicher Betonung ‚Papagei', dann ‚Anna, Papagei', ‚gei, gei' und ‚ei, ei', dann lacht er hell auf, sodaß ich mitlachen muß. Das Männchen singt ein helles kurzes Lied und wirft den Kopf nach rechts und links. Im Wesen sind sie sehr drollig, machen tiefe Verbeugungen u. s. w." Wir haben in dieser Art also immerhin einen bei verständniß- und liebevoller Behandlung lieblichen und liebenswürdigen Stubenvogel vor uns; seine Sprachbegabung ist indessen doch nur gering im Verhältniß zu der, welche die

Digitized by Google

vorangegangenen Verwandten entwickeln. Preis 40 bis 60 M. für den Kopf.

Der roth- und schwarzschnäbelige Edelsittich mit rother Brust [Psittacus Lathami, *Fnsch.*] — Latham's rosenbrüstiger Edelsittich, blos Latham's Edelsittich, Kochinchinasittich, Bartsittich, Schnurrbartsittich, Rosenringsittich(!) — Rose-breasted Alexandrine Parrakeet, Cochinchina Parrakeet — Perruche à bavette rose, Perruche de Pondicherry, Perruche à moustaches — Latham's Alexanderparkiet, Zwartkeel Edelparkiet. — Dem vorigen überaus ähnlich, sodaß die älteren Schriftsteller, insbesondre aber die S. 306 genannten Forscher in Ostindien ihn immer mit Entschiedenheit als das Weibchen oder das Jugendkleid jener Art bezeichnet hatten, ist er eigentlich nur in folgendem abweichend: breiter Stirnrand, Zügelstreif und großer Bartfleck schwarz; ganzer Oberkopf und Wangen bläulichhellgrau, letztere hinterwärts matt rosenroth umsäumt; Nacken glänzend grasgrün; großer Schulterfleck olivengrünlichgelb; Flügeldecken gelbgrün; ganze übrige Oberseite olivengelblichgrasgrün; Hals und Brust bis zum Beginn des Bauchs fahlrosenroth; übrige Unterseite bläulichgelbgrün; Oberschnabel roth, Unterschnabel schwarz; Auge lebhaft gelb; Füße schwärzlichgrau, Krallen schwarz. Größe kaum wahrnehmbar bedeutender als die des vorigen (Länge $33_{,5}$—36 cm; Flügel $15_{,7}$—$16_{,2}$ cm; längste Schwanzfeder $15_{,9}$—17 cm; äußerste Schwanzfeder $5_{,2}$—$5_{,4}$ cm). Heimat: das ganze indische Festland bis zu Pinang hinauf; auch in Kochinchina soll er vorkommen. In Unterbengalen verursachen die Schwärme dieser Sittiche großen Schaden an den Nutzgewächsen, namentlich in den Reisfeldern. Die aus den Nestern gehobenen und aufgefütterten Jungen sind gleich denen des javanischen Edelsittichs in der Heimat als Stubenvögel überaus beliebt. Zu uns gelangen sie nur selten. Mehrere Züchtungsversuche, welche man angestellt, sind erfolglos geblieben; Herr Kreisgerichtsrath Heer in Striegau erzählt aber von einem Pärchen, welches im Besitz eines Tischlers nach und nach in alle Winkel gegen 50 Eier gelegt hatte. In den zoologi-

Digitized by Google

schen Gärten hat sich diese Art recht ausdauernd gezeigt und selbstverständlich wird bei den anderen Gleiches der Fall sein. Näheres ist über den Vogel noch nicht bekannt. Preis wie der des vorigen; ein Par war für 120 M. ausgeboten.

Der schwarzschnäbelige Edelsittich mit rother Brust [Psittacus melanorrhynchus, *Wgl.*] — schwarzschnäbeliger Alexandersittich mit rosenrother Brust, Schwarzschnabelsittich — Black-billed Alexandrine Parrakeet — Perruche Alexandre à bec noir — Zwartbek Edelparkiet, Smous- of Baardparkiet — wurde von Blyth und Jerdon als das Weibchen oder Jugendkleid des vorigen angesehen, jedoch von Finsch mit Entschiedenheit als besondre Art festgehalten, nachdem er von Wagler (1832) nach einem lebenden Vogel im Besitz des Königs von Baiern beschrieben worden. Auch Fraser (1850) hielt ihn als Art fest und bildete ihn als solche ab. Er ist den beiden vorigen sehr ähnlich und nur in folgenden Merkmalen verschieden: schmaler Stirn- und Zügelstreif, sowie breiter Bartstreif neben dem Unterschnabel tief rußschwarz; Stirn grünlichblau; Oberkopf violettblau; Streif ober- und unterhalb des Auges jederseits bis zum Nasenloch gelblichgrün; Gegend hinter dem Auge violett gewellt; Wangen und Ohrgegend blau; Streif vom Vorderhals um die Wangen bis zur Mitte des Hinterkopfs fleischroth; Nacken maigrün; Schulterfleck klein, länglich, dunkel olivengrünlichgelb; untre Schwanzseite düster olivengrünlichgelb; ganzer übriger Körper grün wie bei den vorigen; Schnabel glänzend bräunlichschwarz; Wachshaut bläulichgrau; Auge perlweiß, Iris grau, mit großer schwarzer Pupille; Füße blaugrau, Krallen bläulichhorngrau. Größe mit der des vorigen völlig übereinstimmend. Weder inbetreff der Verbreitung noch der Lebensweise liegen Mittheilungen vor. In den Vogelhandel und auf die Ausstellungen kommen mehrfach rosenbrüstige Sittiche mit schwarzem Schnabel; so sandte Herr Wiener aus London einen zur „Ornis"-Ausstellung nach Berlin i. J. 1879, ein zweiter befand sich im Besitz des Herrn Rittner-Bos in Amsterdam, welcher dann in

Digitized by Google

den zoologischen Garten dort gelangte, sich viele Jahre gut erhielt, seinen schwarzen Schnabel aber nicht verfärbte. Sollte er öfter eingeführt werden, so wird er dem erstbeschriebnen Verwandten sicherlich in jeder Hinsicht gleichen.

Prinz Luzian's Edelsittich [Psittacus Luziani, *Vrrx.*] — Bartsittich, Luzianssittich — Luzian's Parrakeet — Perruche de Luzian — Luzian's Edelparkiet — ist grün; Stirnrand schwärzlichgrün; Ober- und Hinterkopf röthlichgraugrün; Zügelstreif und Bartfleck schwarz; Kopfseiten zinnoberroth; Nacken und Hinterhals rosaröthlichgelb; Rücken blaßgrün; Schwingen dunkler grün, unterseits schwärzlichgrün; Schwanzfedern unterseits graugelb; Kehle grau; Hals und Oberbrust gelblichgrün; ganze übrige Unterseite grün; Oberschnabel zinnoberroth, Unterschnabel schwarz; Auge gelblichweiß; Füße schwärzlich. Weibchen oder Jugendkleid: Kopfseiten düsterroth; Oberkopf grün; Schnabel schwarz; in allem andern übereinstimmend. Vom rothschnäbligen Edelsittich mit rother Brust unterscheidet sich das Männchen dieser Art dadurch, daß es keinen gelben Schulterfleck, keine rothe Brust, dagegen einen stärkern Schnabel hat und viel größer ist. Heimat: China (nach Sclater). Er wurde von Verreaux (1850) nach einem lebenden Vogel im zoologischen Garten von Amsterdam beschrieben; ein zweiter befand sich in der van Aken'schen Menagerie und ein dritter in dem zoologischen Garten von London (1857). Seitdem ist dieser Edelsittich hin und wieder in den Handel gekommen, so hatte der Großhändler Heinrich Möller in Hamburg i. J. 1878 ein schön ausgefärbtes Männchen, welches ganz zahm war, und mehrere Worte deutlich sprach. Zwei Köpfe gelangten im Jahre 1880 in den zoologischen Garten von Hamburg, und ein Par bot i. J. 1882 Herr Vogelhändler Dieckmann in Hamburg für 120 M. aus. Hiernach läßt sich wol erwarten, daß diese schön gefärbte Art über kurz oder lang als eine willkommene Bereicherung unserer Liebhaberei häufiger im Handel erscheinen wird.

Digitized by Google

Der rothnackige Edelsittich

[Psittacus longicaudatus, *Bdd.*].

Langschwänziger Alexandersittich, Langschwanzsittich, Malakkasittich. — Long-tailed Alexandrine Parrakeet, Malaccan Parrakeet, Madna Bhola Parrakeet. — Perruche Alexandre à queue longue, Perruche à joues roses, Perruche de Malais. — Langstaart Edelparkiet.

Als einen durch schöne Färbung besonders angenehm ins Auge fallenden Papagei bezeichnet Dr. Finsch diesen Edelsittich und in der That mit Recht, denn er steht den vorhergegangenen rosenbrüstigen Edelsittichen nahe, dürfte dieselben jedoch sowol an Farbenschönheit, als auch an Anmuth und wahrscheinlich auch an Begabung übertreffen.

Er ist in folgender Weise gefärbt: Stirnrand und Zügelstreif schwärzlichgrün; Ober- und Hinterkopf smaragdgrün; breite Binde vom Schnabel unterhalb des Auges um den Hinterkopf, nebst Nacken und kurzem Streif oberhalb des Auges hellrosen- bis pfirsichblütroth; Oberrücken gelblichgrün, schwach bläulich; Mittelrücken grünlichblau; obere Schwanzdecken grün; Schwingen grün, an der Außenfahne blau, Innenfahne schwarz; unterseits schwärzlichgrau; Deckfedern der ersten Schwingen grünlichblau; die übrigen Deckfedern gelblicholivengrün; kleine unterseitige Flügelbecken gelb; die beiden mittelsten Schwanzfedern blau, die übrigen grasgrün, alle unterseits düsterolivengrünlichgelb; breiter Bartstreif schwarz; ganze übrige Unterseite gelbgrün; Oberschnabel scharlachroth, Unterschnabel schwärzlichhorngrau; nackte Nasenhaut schwärzlichgrau; Augapfel gelblichweiß, Iris grünlichgrau, um die schwarze Pupille ein schmaler heller Ring; Augenlider gelblichgrau; nackte Haut ums Auge schwärzlichgrau; Füße bräunlichgrau, Krallen horngrau. Weibchen (nach Platen): Ober- und Hinterkopf einfarbig grün, nur die Wangen und ein Fleck überm Auge düsterweinroth; Bartfleck nicht schwarz, sondern grün; Halsband dunkelgrün; Schnabel einfarbig bräunlich. Jugendkleid dem des Weibchens gleich, doch matter und die mittelsten Schwanzfedern kürzer. Größe der rothbrüstigen Edelsittiche. (Länge 32 — 34 cm; Flügel 13,6 — 14,6 cm; längste Schwanzfedern 20 — 25,6 cm; äußerste Schwanzfedern 4,8 — 5,9 cm). Seine Heimat sind Borneo, Sumatra und Malakka.

Digitized by Google

Der rothnackige Edelsittich wurde schon von Boddaert (1783) abgebildet und benannt und bei den älteren Schriftstellern bis auf Buffon hat auch er vielfach Anlaß zu Irrthümern gegeben, welche erst in neuester Zeit, insbesondre durch Finsch, berichtigt worden. Sein Freileben ist seit kurzem etwas bekannter als bisher. An der Nordküste von Borneo, wo er ziemlich häufig ist, sahen Mottley und Dillwin ihn frühmorgens in Familien bis zu 8 Köpfen unter schrillem Geschrei um die Spitzen der Bäume fliegen; im Süden von Borneo und im Osten von Sumatra haben die Reisenden (Dr. Platen, Dr. Hagen u. A.) Schwärme von Hunderten hoch in der Luft gleichfalls mit lauten Rufen dahinziehend angetroffen. Ueberhaupt sollen sie sich immer in den Gipfeln der höchsten Bäume aufhalten. Ihre Nahrung besteht in Beerenfrüchten, so denen eines Rosenapfels, den stark riechenden und brennend schmeckenden Samenlappen des Kamphorölbaums u. a. m. Dr. Platen beobachtete ihn im Stromgebiet des Sarawak und sagt, die Brutzeit soll nach Angabe der Eingeborenen in die Monate Februar bis Mai fallen, das Nest in Höhlungen der höchsten, vornehmlich abgestorbenen Bäume sich befinden und das Gelege in zwei bis drei Eiern bestehen. Die Eingeborenen fangen diese Sittiche zahlreich mit Vogelleim, doch nur, um sie zu verzehren. Frau Dr. Platen fütterte ihre Gefangenen mit gekochtem Reis und Zuckerrohr und sie wollten nichts andres annehmen, dabei hielten sie sich ziemlich gut, magerten jedoch ab. Sie kletterten viel im Käfig umher, liefen die Sitzstangen auf und ab und suchten die futterspendende Hand immer zu beißen. In den zoologischen Garten von London gelangte der langschwänzige Alexandersittich zuerst i. J. 1864 in zwei Köpfen, und seitdem ist er von Zeit zu Zeit, jedoch immer nur einzeln, eingeführt worden. Ein schönes Männchen in meiner Pflege zeigte sich im ganzen Wesen als übereinstimmend mit

Digitized by Google

den rosenbrüstigen Alexandersittichen. Weder an ihm, noch an anderen wurde bis jetzt Sprachbegabung festgestellt, doch ist an derselben, wie eingangs erwähnt, sicherlich nicht zu zweifeln. Preis 60 bis 90 M.

Der rothschnäbelige Edelsittich von den Nikobaren [Psittacus nicobaricus, *Gld.*] — Rothwangensittich, rothbäckiger Edelsittich — Red-masked Conure, Red-cheeked Parrakeet — Perruche à tête d'écarlate — Roodmasker Edelparkiet — ist am Oberkopf smaragdgrün, Zügel, Kopfseiten und Ohrgegend ziegelroth; schmaler Zügelstreif und großer Bartfleck schwarz; Nacken und Halsseiten gelblicholivengrün; Hinterhals und Mantel graulichgrün verwaschen; Schwingen an den Außenfahnen dunkelblau, unterseits ganz schwärzlichgrau; die beiden mittelsten Schwanzfedern blau, alle unterseits olivengrünlichgelb; ganze übrige Oberseite lebhaft grün; Kehle und Oberbrust gelblichgrün, graulich verwaschen; übrige Unterseite rein grün; Oberschnabel blutroth, Unterschnabel schwarz; Auge grau bis reinweiß; Füße bleigrau, mit gelben Schildchen. Er ist dem vorigen ähnlich, aber dadurch zu unterscheiden, daß das Roth der Kopfseiten sich nicht um Hinterkopf und Nacken zieht, auch ist er bedeutend größer; von Prinz Luzian's Edelsittich unterscheidet er sich vornehmlich nur dadurch, daß die ersten Schwingen und deren Deckfedern blau sind. Heimat: die Nikobaren und Andamanen. Die Naturforscher der Nowara-Expedition fanden ihn auf allen jenen Inseln und keineswegs selten. Von Blyth (1846) beschrieben, ist er bis jetzt selbst als Balg in den Museen noch recht selten. Im Jahre 1873 ist ein rotschnäbeliger Nikobaren-Sittich in den zoologischen Garten von London gelangt; sonst wurde er noch nicht eingeführt. — **Der schwarzschnäbelige Edelsittich von den Nikobaren** [Psittacus Tytleri, *Hume.*] — Tytler's Parrakeet — Perruche de Tytler — Tytler's Edelparkiet — ist von Tytler mit Entschiedenheit als besondre Art aufgestellt, wird neuerdings aber als das Weibchen oder Jugendkleid der vorigen angesehen. Er ist jenem in allem gleich und unterscheidet sich nur durch den ganz schwarzen Schnabel. Von diesem schwarzschnäbligen Edelsittich hatte

Digitized by Google

Fräulein Hagenbeck im Oktober (1881) zwei Köpfe eingeführt, welche fingerzahm und allerliebst waren. Für die Liebhaberei an sprechenden Vögeln ist es gleichgiltig, ob dieser Edelsittich nur in einer oder in zwei wenig von einander abweichenden Arten vorkommt. Würde er häufiger in den Handel gelangen, so dürften wir ihn gewiß willkommen heißen.

* * *

Zu den artenreichsten unter allen Papageiengeschlechtern gehören die **Keilschwanzsittiche** [Conurus, *Khl.*], welche sich in folgenden besonderen Merkmalen kennzeichnen lassen: Schnabel kräftig, stark gekrümmt, so hoch wie lang, mit flacher Rinne auf der stumpf abgesetzten, leicht gefurchten First, deutlichem Zahnausschnitt, breiter abgeplatteter Dillenkante, an der Spitze abgestutztem Unterschnabel, dessen Schneidenränder sanft ausgebuchtet sind; Zunge dick, fleischig, glatt; Augenkreis nackt; Zügel befiedert; Nasenlöcher klein, rund, in schmaler, freier, selten befiederter Wachshaut; Flügel spitz, länger als der Schwanz; Schwingen am Ende spitz zugerundet; Schwanz lang, keilförmig abgestuft, jede Feder nach dem Ende zu gleichmäßig verschmälert und spitz zugerundet; Füße kräftig mit starken Nägeln; Gefieder meistens hart; Gestalt gedrungen. Drossel- bis Dohlengröße. Bei allen Keilschwänzen sind die Geschlechter übereinstimmend gefärbt.

Ihre Heimat ist Südamerika, vornehmlich Brasilien und zwar erstreckt sich ihre Verbreitung von Chile bis zum südlichen Mexiko, einige sind ausschließlich in Westindien und nur eine Art ist in Nordamerika heimisch. Die feuchten und heißen mit Urwald bestandenen Niederungen am Amazonenstrom bilden ihren hauptsächlichsten Aufenthalt. Sie leben gesellig in mehr oder minder großen Schwärmen und manche Arten auch zur Brutzeit. Das Nest bildet wie bei anderen Papageien ein Baumloch und eine Art nistet in Felsenhöhlen. Das Gelege soll in zwei bis drei Eiern bestehen, doch dürfte es bei den meisten Arten wol mehrere enthalten. Als Baumvögel fliegen die Keilschwänze sehr gut, klettern hurtig, wenn auch etwas ungeschickt und gehen auf dem Boden unbeholfen. Manche oder wol alle Arten wandern zeitweise als Zug- oder Strichvögel. Als ihre Nahrung darf man zweifellos vorzugsweise Sämereien,

Digitized by Google

weniger Früchte und andere Pflanzenstoffe, annehmen. Die großen Schwärme verursachen an den Nutzgewächsen umsomehr Schaden als sie, wie ja fast alle Papageien überhaupt beiweitem mehr verderben, als verzehren. Darum und zugleich weil ihr Fleisch wohlschmeckend ist, werden sie eifrig verfolgt. Die Indianer rauben die Jungen zahlreich aus den Nestern, um sie aufzufüttern und zum Verkauf nach den Hafenstädten zu bringen. Alte werden in Schlingen oder mit Vogelleim gefangen und neuerdings schwarmweise in großen Netzen.

Fast alle Keilschwänze gewöhnen sich immer leicht ein und zeigen sich in der Gefangenschaft vortrefflich ausdauernd. Sie sind daher bei uns im Vogelhandel an Arten- und Kopfzahl verhältnißmäßig mehr als die meisten anderen Papageien zu finden; manche gehören zu den gemeinsten Vögeln des Marktes; viele Arten sind aber auch selten und kostbar. Im Handel werden sie gewöhnlich Perikiten oder Perrüschen genannt. Anfangs erscheinen sie, besonders die alten Vögel, in der Gefangenschaft scheu, störrisch, unbändig, also nichts weniger als angenehm, und ihr gellendes, garnicht zu beschwichtigendes Geschrei macht sie manchmal geradezu unausstehlich. Aber alle, selbst die unbändigsten Wildfänge, werden zuweilen in verhältnißmäßig kurzer Zeit ungemein zahm, liebenswürdig und ergeben sich als in hohem Maße abrichtungs- und auch sprachfähig; als hervorragende Sprecher können sie indessen keinenfalls gelten und ihr Geschrei unterlassen auch zahme Vögel niemals ganz. Viel mehr beliebt sind sie als Schmuckvögel, indem sie in mehr oder minder hübscher bunter Färbung, namentlich aber in ihrem sehr komischen Wesen mit wunderlichem Kopfnicken, Knixen, Gefiedersträuben, Vergrößern und Zusammenziehen des Augensterns u. s. w. den Beifall der Liebhaber finden, während diese freilich das schrille und anhaltende Geschrei mit in den Kauf nehmen müssen. Der Züchtung haben sich bis jetzt leider erst wenige Arten zugänglich gezeigt. Als Futter bedürfen die Keilschwanzsittiche nur: Sämereien, Hanf, Kanariensamen, Hafer, nebst ein wenig Frucht und allenfalls etwas Biskuit oder Eierbrot. Frische Aeste noch mit der Rinde zum Nagen soll man niemals fehlen lassen. Ihrer geringern Größe wegen hält man sie selten auf dem Ständer, vielmehr gewöhnlich im Käfig, welcher jedoch ihres nur zu argen Nagens wegen mit Ausnahme der Sitzstange völlig von Metall sein muß. In der Vogelstube sind

Digitized by Google

sie gegen andere kleine Vögel in der Regel recht bösartig. Ihre Preise sind so sehr verschieden, daß ich sie bei jeder einzelnen Art angeben muß. Selbstverständlich werde ich hier nur die Keilschwanzsittiche schildern, von denen bis jetzt nachgewiesen ist, daß sie sprechen gelernt haben.

Der nordamerikanische Keilschwanzsittich

[Psittacus carolinensis, *L.*].

Keilschwanzsittich von Karolina, Karolina- oder Karolinensittich. — Carolina Conure, Carolina Parrakeet. — Perruche de la Caroline, Perruche à tête jaune. — Zon Parkiet of Carolina Parkiet.

Als einen der gemeinsten Vögel des Handels, der zugleich zu den schönsten oder doch buntesten zählt, sehen wir den einzigen Papagei, welcher in Nordamerika heimisch ist, vor uns. Er würde sich daher der eifrigsten und verbreitetsten Liebhaberei erfreuen, wenn er nicht im Gegensatz dazu Eigenschaften hätte, durch welche er sich geradezu unausstehlich macht. Von Catesby (1731) beschrieben und von Linné (1766) wissenschaftlich benannt, ist er auch als Stubenvogel schon von Buffon, dann Bechstein u. A. geschildert worden.

Der Karolinasittich, wie er meistens genannt wird, ist an Stirn, Vorderkopf bis um die Augen, Wangen bis unter den Schnabelgrund orangezinnoberroth; Ober- und Hinterkopf, Kopfseiten, Ohrgegend und Oberkehle rein schwefelgelb; Schwingen dunkelgrün, an der Außenfahne bläulich, Innenfahne schwarz; Deckfedern der ersten Schwingen bläulichgrün; kleine Deckfedern am Flügelbug und Handgelenk zitrongelb, einzelne orangeroth gesäumt; Schwanzfedern dunkelgrasgrün, Spitze bläulichgrün, unterseits Außenfahne schwärzlich, Innenfahne graugelb; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün; Hinterrücken etwas heller; ganze Unterseite hell gelbgrün; Hinterleib orangegelb; Schnabel horngrauweiß; Auge bräunlichgrau; Füße fleischfarbengrau, Krallen schwarz. (Beim alten Männchen ist die orangegelbe Färbung am Flügelbug sehr breit, beim Weibchen dürfte sie ganz fehlen). Dohlengröße, doch schlanker,

Digitized by Google

mit viel längerm Schwanz (Länge 31,2 cm; Flügel 17—18,9 cm; längste Schwanzfeder 13,9—15,9 cm, äußerste Schwanzfeder 7,6—8 cm).

Seine Heimat ist das südliche Nordamerika und zwar soll er vom Nordosten Marylands, Nordwesten Missouris bis zum obern Arkansas, Südwesten Texas' und Süden Floridas verbreitet sein. Obwol gerade dieser Sittich von den hervorragendsten amerikanischen Forschern Wilson, Audubon, Prinz Wied, Coues u. A. beobachtet worden, so bleiben bis jetzt doch noch mancherlei Lücken in der Kenntniß seines Freilebens. In den nördlichen Gegenden lebt er als Zug- oder Strich- und in den südlichen als Standvogel. Gleich anderen Papageien in der Nistzeit parweise, dann in Familien oder kleinen Flügen, sammeln sie sich späterhin zu großen Schwärmen an, in denen aber die Gatten der zusammengehörenden Pärchen stets neben einander bleiben. Im Fluge und insbesondre wenn sie aufgejagt werden, lassen sie ihre schrillen, gellenden Schreie erschallen. Sie fliegen sehr gewandt und im dichtgeschloßnen Schwarm in gerader Richtung oder auch mit malerischen Wendungen reißendschnell dahin; im Klettern sind sie ziemlich geschickt, im Gehen auf der Erde aber unbeholfen. Zur Nachtruhe suchen sie bestimmte hohe Bäume, besonders Platanen, auf und in der kalten Zeit schlüpfen sie in die hohlen Stämme derselben, um darin zu übernachten. In den Astlöchern solcher Waldriesen nisten sie auch, meistens gesellig neben einander und oft legen und brüten mehrere Weibchen in einer Höhlung gemeinschaftlich. Das Gelege soll in drei bis vier oder wol gar bis sechs Eiern bestehen und als Nistzeit werden je nach der Gegend die Monate März bis Juni angegeben. Ihre Nahrung sollen hauptsächlich die Samen der Spitzklette, dann der Sykomoren oder Wasserbuchen, auch anderer Platanen und Cypressen, dann Pekan- oder Illinoisnüsse, sowie mancherlei andere Sämereien, Beren u. a. bilden. Am reifenden Mais

Digitized by Google

sollen sie sehr schädlich werden, zur Satzeit die keimenden Körner aus der Erde zupfen, zur Reifezeit scharenweise die Getreidegarben, sowie auch die Obstbäume überfallen u. s. w. Daher verfolgt man sie vielfach mit großer Erbitterung; anderwärts jagt man sie eifrig um ihres wohlschmeckenden Fleisches willen, und außerdem werden sie von Sonntagsschützen blos zum Vergnügen, manchmal in großer Anzahl, herabgeschmettert. Sie zeigen nämlich ebenfalls die hier schon vielfach erwähnte Eigenthümlichkeit, auf das Geschrei eines krank geschoßnen herbeizueilen und klagend solange über demselben zu flattern, bis wol gar der ganze Schwarm aufgerieben ist. Infolgedessen sind sie nicht allein im ganzen bereits außerordentlich verringert, sondern in den mehr bewohnten Gegenden schon beinahe ausgerottet. Baird sagt, daß dieser Sittich in Pennsylvanien und Südkarolina nur noch sehr selten und Cones, daß er in Michigan und Illinois garnicht, am Missouri kaum mehr anzutreffen sei. Nehrling fügt den Hinweis hinzu, daß sein Verbreitungsgebiet sich von Jahr zu Jahr verkleinere.

Zur Einführung nach Europa werden sie in den hohlen Bäumen, in welchen sie übernachten und auch im Sommer bei starker Hitze ruhen, vermittelst Kätscher, viel mehr aber noch in großen Netzen bei der Tränke u. a., gefangen. Namentlich sammeln sie sich scharen- oder flugweise an den Stellen, wo das Wasser salzhaltig ist, und hier ist der Fang dann natürlich am ergibigsten.

Bechstein sagt vom Karolinasittich, daß derselbe bereits damals nicht selten nach Europa eingeführt wurde; man ernähre ihn mit Hanfsamen; er schreie viel und spreche wenig, trotzdem finde er um seiner Schönheit und Zahmheit willen viele Liebhaber. In einem ähnlichen Verhältniß steht dieser Papagei bis zum heutigen Tage, denn viele Anfänger und Unkundige lassen sich durch seine Farben blenden, schaffen ihn an,

Digitized by Google

um dann bald einzusehen, daß er sich zum Stubenvogel durchaus nicht eignet. Zwar gibt Dr. E. Rey in Halle eine Schilderung, aus welcher hervorgeht, daß dieser Sittich bei verständnißvoller und zweckmäßiger Behandlung eine hohe geistige Begabung erkennen läßt. Ein Pärchen entwickelte überraschende Klugheit und Intelligenz, sodaß der Ornithologe die Meinung aussprechen konnte, der Karolinasittich nehme in dieser Hinsicht unter allen langschwänzigen Papageien (welche er selber gehalten oder anderweit beobachtet) den ersten Rang ein, ja er übertreffe sogar viele der hochbegabten Kurzschwänze. Doch, so fügt der Genannte hinzu, wird er niemals so zutraulich wie viele andere Papageien, sondern zeigt sich immer sehr mißtrauisch und vorsichtig. Jahrelange Versuche und Beobachtungen haben mich sodann zu der Ueberzeugung geführt, daß ein alt eingefangner Karolinasittich keinenfalls als zähmungs- und abrichtungsfähig sich ergibt, sondern stets dummscheu, störrisch und unbändig bleiben wird, daß aber ein sehr jung in den Besitz des sachverständigen Pflegers gelangter und dann sorgsam behandelter Vogel dieser Art ebenso vollkommen zahm und hingebend wird wie alle Verwandten. Inbetreff der Sprachfähigkeit muß ich freilich ausdrücklich hervorheben, daß er jedenfalls nur als ein Sprecher dritten oder vierten Rangs gelten kann und auch als solcher selbst bei ungemein großer Liebenswürdigkeit doch immer durch sein arges Geschrei sich mindestens sehr lästig machen wird. Im übrigen ist er überaus kräftig und ausdauernd. Zuerst Dr. Rey, dann Baron H. von Berlepsch hatten ihn, letztrer in mehreren Köpfen, zum freien Ein- und Ausfliegen gewöhnt und in dieser Weise auch in einem Bretterverschlag auf einem Boden, also an einem ganz kalten Ort, überwintert. In den zoologischen Gärten wird er meistens in Flugkäfigen, welche im Freien, fast immer ungeschützt, stehen, gehalten. Die mehrfachen

Digitized by Google

Züchtungsversuche, welche man im Lauf der Zeit angestellt, haben zum vollständigen Ergebniß nur in wenigen Fällen geführt; in den zoologischen Gärten kamen die Pärchen größtentheils nur bis zum Eierlegen, in meiner Vogelstube sind aber Junge flügge geworden und ebenso hat Herr Dr. Nowotny in Wien einen glücklichen Erfolg erreicht.

Der Karolinasittich gelangt zeitweise in recht großer Anzahl in den Handel und gehört zu den gewöhnlichsten Vögeln auf dem Markt. In der Regel wird er pärchenweise ausgeboten für 15 bis 18 M., zuweilen für 12 M. und wol gar für 7,50 M.; auch einzeln ist er dann stets zu erhalten.

Der Pavua-Keilschwanzsittich

[Psittacus pavua, *Bdd.*].

Paruasittich, Boliviasittich, grüner Keilschwanzsittich mit rothen unteren Flügeldecken, Guianasittich, Goldaugensittich (!). — Green Conure, Bolivia Parrakeet. — Perruche de Bolive. — Bolivia Parkiet.

Von Brisson (1760) beschrieben und von Boddaert (1783) benannt, ist er von den älteren Schriftstellern vielfach verwechselt und in mehreren Arten unter mancherlei Irrthümern behandelt worden.

Er erscheint schön grasgrün, an der Unterseite kaum heller; Kopf, Hals und Unterleib hier und da mit einzelnen rothen Federn; Schwingen an der Innenfahne schwärzlich; unterseits ganz düsterolivengrünlichgelb; kleine Deckfedern am Handgelenk, sowie kleine und mittlere unterseitige Flügeldecken scharlachroth, große unterseitige Flügeldecken goldgelb (zuweilen auch die letzteren und der Flügelbug roth); Schwanz unterseits düsterolivengrünlichgelb; Schnabel röthlichfleischfarben; Auge grau- bis röthlichorangegelb, nackter Augenkreis röthlichaschgrau; Füße hell bräunlichgrau, Krallen schwarzbraun. Größe kaum bemerkbar bedeutender als die des vorigen (Länge 35 cm; Flügel $15,_5$—$18,_3$ cm; längste Schwanzfedern $12,_6$—17 cm; äußerste Schwanzfedern $5,_9$—$10,_3$ cm). Heimat: Brasilien, Ver-

Digitized by Google

breitung von Minas geraes und Paraguay bis zum britischen Guiana. Die reisenden Naturforscher (Natterer, Schomburgk, Prinz Wied und Burmeister) haben ihn vielfach beobachtet, jedoch über sein Freileben fast garnichts mitgetheilt. Er sei die gemeinste Art aller Perikittos, sagt der letztre, man höre und sehe ihn täglich in den Wäldern um Neu-Freiburg. Das Gelege soll in 3—4 Eiern bestehen und das Nest selbstverständlich in einer Baumhöhle sich befinden. In den Maisfeldern sollen die nach der Nistzeit sich ansammelnden Schwärme nicht selten großen Schaden verursachen. Ein Pavuasittich, welcher in den Fluß Avayros gefallen, herausgefischt und von Bates am Leben erhalten wurde, zeigte sich ungemein wild, unbändig und bissig und verschmähte alle Nahrung. Der Reisende übergab ihn einer alten Indianerin, welche ihn, in der S. 14 geschilderten Weise gebändigt, bereits nach zwei Tagen zurückbrachte, und zwar so gezähmt, daß er sich als das liebenswürdigste Geschöpf erwies und auch sprechen lernte.

Ueber sein Gefangenleben berichtet schon Buffon. Er sei unter allen ‚Parkiten' der neuen Welt der, welcher am leichtesten reden lerne, doch bleibe er immer scheu und wild, auch widerspenstig und übler Laune; sein lebhaftes Auge und seine schöne Erscheinung überhaupt machen ihn aber trotzdem geschätzt; die Händler nennen ihn nach seinem Heimatsnamen ‚Pavuane'. Bechstein bemerkt noch, daß man ihn bei den deutschen Vogelhändlern häufig finde, da er nicht zart sei, sondern sich gut einführen lasse. Auch Levaillant rühmt seine Gelehrigkeit und will in Amsterdam einen Pavuasittich gehört haben, welcher das ganze Vaterunser in holländischer Sprache herplapperte. Lenz (1861) berichtet von einem Züchtungserfolge, der in Kayenne erzielt sein soll. Bei uns hat diese Art kaum Gelegenheit zur Beobachtung gegeben, denn sie zählt gegenwärtig zu den seltensten Papageien des Handels, sie ist

Digitized by Google

selbst auf den großen Ausstellungen nur einzeln einmal vorhanden. Fräulein Chr. Hagenbeck hat den Pavuasittich hin und wieder gehabt, aber nur die bedeutendsten zoologischen Gärten besitzen ihn. Seine Seltenheit ist übrigens umsomehr auffallend, da er doch eben früher häufig nach Europa gebracht sein soll und da er auch jetzt noch in seiner Heimat zahlreich ist. Hinsichtlich seiner Sprachbegabung wird er nach meiner Ueberzeugung dem Karolinasittich gleichstehen, denn die, welche ich beobachten konnte, ergaben sich stets im Wesen als übereinstimmend mit jenem. Ein bestimmter Preis ist nicht gut anzuführen; er steht wol etwa auf 50 M. für den Kopf.

Der Keilschwanzsittich von Kuba

[Psittacus euops, *Wgl.*].

Kubasittich, Havanasittich (!). — Cuban Conure. — Perruche de Cuba. — Cuba Parkiet.

Einfarbig dunkelgrasgrün (nach Gundlach mehr gelblichgrün), ist er unterseits heller gelbgrün, an Kopf, Hals und Hinterleib mit zahlreichen einzelnen rothen Federn; Schwingen an der Innenfahne olivengrünlichgelb, unterseits ganz olivengrünlichgelb; Deckfedern der großen Schwingen und Eckflügel bläulich; Flügelrand, kleine und mittlere untere Flügeldecken scharlachroth; Schwanzfedern unterseits düster orangegelb; Schnabel, Wachshaut und nackter Augenkreis röthlichweiß; Auge gelbbraun bis roth, um die Pupille mit schmalem gelben Ring; Füße fleischfarben (nach Gundlach bräunlichgrau). Größe bedeutend geringer als die des Pavuasittich. Bereits Brisson und Gmelin kannten ihn. Beide jedoch, ebenso wie andere der älteren Schriftsteller, haben ihn vielfach verwechselt oder mit verwandten Arten zusammengeworfen. Erst Wagler (1832) beschrieb und benannte ihn und zwar nach vier in München lebenden Vögeln. Seine Heimat ist ausschließlich die Insel Kuba. Ueber das Freileben hat Gundlach berichtet: Er halte sich nicht in den Waldungen auf, sondern in den Savannen

Digitized by Google

an baumreichen Stellen, besonders wo Palmen stehen. Hier sei er sehr häufig und sammle sich nach der Nistzeit zu Schwärmen an. Sein Flug sei hurtig, gradeaus, unter lautem Kreischen. Die Nahrung bestehe in Getreide-, Gräser- und Waldbaum-Sämereien, sowie anderen kleinen Früchten. An den Nutzgewächsen verursache er keinen Schaden; er werde daher weder deshalb, noch um seines Fleisches willen verfolgt. Das Nest befinde sich in den abgestorbenen, von obenher hohlen Stämmen der Fächerpalmen oder auch in anderen Baumlöchern; das Gelege hat der Reisende aber nicht erlangt. Die Jungen sollen aus dem Nest genommen und unschwer aufgezogen, aber auch die alteingefangenen sollen leicht gezähmt werden. Diese Sittiche sind so harmlos, daß man sie vermittelst an Stöcken befestigter Schlingen unschwer fangen kann. Sie lernen einige Worte, selbst kurze Redensarten, nachsprechen, ferner Küßchen geben, sich todtstellen und andere Kunststücke. Bis vor kurzem war der Kubasittich selbst als Balg in den Sammlungen selten, und gleicherweise sehen wir ihn auch jetzt noch im Handel nur zufällig und einzeln. Neuerdings hat der zoologische Garten von Hamburg einen Kopf erhalten. Ein Preis ist nicht anzugeben.

Der Keilschwanzsittich von Patagonien

[Psittacus patagonus, *VIEILL.*].

Patagonischer Keilschwanzsittich, Patagoniersittich, Keilschwanzsittich mit weißer Brustbinde, Felsensittich. — Patagonian Conure. — Perruche de la Patagonie, Perruche patagone. — Patagonien Parkiet.

Im Gegensatz zu allen seinen Verwandten und zu fast allen Papageien überhaupt nistet dieser Sittich nicht in den Höhlungen von Baumstämmen, sondern in den Löchern einer Felsenwand. Eine hübsche Schilderung gibt E. F. Pöppig

Digitized by Google

in Folgendem: „Wenn der Reisende in einsamen Gegenden einer senkrechten Felswand naht und sich in der hier herrschenden Stille ganz allein glaubt, so hört er ein seltsames Knurren, sieht sich jedoch vergeblich nach dem Urheber desselben um. Plötzlich ertönt der Warnungsschrei eines Vogels, welcher von allen Seiten beantwortet wird, und bald umkreist den Wandrer eine Schar kreischender und lärmender Papageien. Hunderte von Löchern, deren jedes von einem Pärchen bewohnt ist, haben die Vögel selber in die das Gestein durchziehenden mürben Tonschichten gegraben. Diese Brutansiedelungen sind fast immer mit solcher Vorsicht angelegt, daß zu denselben weder Menschen noch Raubthiere gelangen können; die Chilenen scheuen aber nicht die Gefahr, sondern lassen sich vermittelst langer Lassos an der Felswand hinab, um trotz des Kreischens der Alten die Jungen, deren Fleisch sehr wohlschmeckend ist, mit Haken aus den Löchern zu holen." Solch' Schwarm soll etwa 30 Köpfe stark sein und ist in mehreren Oertlichkeiten von verschiedenen Reisenden beobachtet worden.

Bereits Molina (1776) hat diese Art beschrieben, aber erst Vieillot (1823) hat sie benannt. Sie ist an Kopf, Hals, Oberrücken, Flügeln und Schwanz düster olivengrün, Oberkopf bräunlicholivengrün; Hinterhals, Mantel und Schultern dunkler olivengrünlichbraun; Mittel-, Unterrücken und Bürzel dunkelgelb; obere Schwanzdecken bräunlicholivengrün; Schwingen düstermeerblau, Innenfahne und Ende breit schwarz, die zweiten Schwingen grün, Innenfahne breit schwarz, alle Schwingen unterseits schwarz; größte Deckfedern düstermeerblau; Schwanzfedern grün, Innenfahne schwärzlich, alle unterseits graulichschwarz; ganze übrige Oberseite grün; Kehle, Hals und Brust olivengrünlichbraun; quer über die Oberbrust eine unregelmäßige weißliche Binde; Bauch, Schenkel und Schenkelseiten dunkelgelb; Bauchmitte, Hinterleib und Schienbein düsterzinnoberroth; untere Schwanzdecken gelb; Schnabel wechselnd, horngrau bis schwarzbraun; Auge gelblich bis weiß; Füße horngrau bis schwärzlich. Größe bedeutender als die des Karolinasittichs; er

Digitized by Google

ist der größte aller Keilschwanzsittiche (Länge 38 — 39 cm; Flügel 24,7 — 26 cm; längste Schwanzfeder 21,3 — 23,4 cm, äußerste Schwanzfeder 11,8 cm). Seine Heimat ist das südlichste Südamerika, Chile, Buenos Ayres, die Laplataſtaten, Paraguay, nördliches Patagonien bis zur Magelhaenſtraße, und in der erwähnten Weiſe niſtet er hier in den Anden, Kordilleren, Toskaklippen u. a. O. Nach Cummingham enthält jedes Neſt 3—6 Eier. Erneſt Gibſon ſchildert das Freileben wie folgt: Von Mitte April bis Ende November durchziehen Flüge von etwa 20 Köpfen, doch auch bis zu Hunderten, morgens kommend und abends zurückkehrend, unter lauten kurzen Rufen Buenos Ayres in kräftigem, ſchnellem, aber ziemlich ſchwankendem Fluge, früh niedrig über dem Boden, abends hoch in der Luft dahineilend. Sie kommen, wie ich vermuthe, von den Klippen oder Baranken der Arroyos diesſeits der Sierra de Tantil, wo ſie brüten. Unterwegs laſſen ſie ſich häufig auf den Bäumen in der Nähe der Anſiedelungen und ſelbſt auf den Gebäuden nieder und ſind garnicht ſcheu. Die Bewohner lieben ſie aber nicht, weil ſie ihnen die Strohdächer verwüſten und ſie mit ihrem Lärm frühmorgens ſtören. Die dort wohnenden Italiener ſchießen ſie zum Verſpeiſen, doch dürften die Alten, wenn auch ſchmackhaftes, doch ziemlich zähes Fleiſch haben. Die Nahrung des Patagonierſittichs ſoll vornehmlich in den friſchen Blättern und dann auch Samen akazienartiger Dornſträucher oder Bäume beſtehen, nach Böck, der ihn in den Wäldern um Valdivia ſah, aber ebenſo in allerlei anderen Früchten. Hier, wo er verfolgt werde, ſei er ſo ſcheu, daß er ſich meiſtens in den Kronen der höchſten Bäume aufhalte. Darwin beobachtete ebenfalls das Niſten dieſes Sittichs in Felſen- und Erdlöchern. Der Reiſende v. Kittlitz ſagt, daß er ihn in Valparaiſo häufig gezähmt unter dem Hausgeflügel gefunden; dieſer Papagei ſei entſchieden geſchickter zum Laufen

Digitized by Google

als zum Klettern, denn auch die auf dem Verdeck des Schiffs gehaltenen Vögel dieser Art kletterten niemals in das Tauwerk empor.

Bis jetzt wird der Patagoniersittich nur überaus selten lebend eingeführt. In den zoologischen Garten von London gelangte er zuerst i. J. 1868. Herr Linden (1874) besaß ein Pärchen, welches sogar Eier gelegt hatte, aber nicht zur glücklichen Brut gelangt war. Der Reisende Landbeck berichtet, daß dieser Keilschwanz sehr zahm werde und auch einige Worte sprechen lerne. Irgend etwas Näheres über ihn ist aber noch nicht bekannt. Der Preis steht der Seltenheit wegen hoch, 90 bis 120 M. für das Pärchen.

Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn

[Psittacus haemorrhous, *Spx.*].

Blaustirniger Keilschwanzsittich, blaustirniger Sittich, Blaustirnsittich. — Blue-crowned Conure or Blue-fronted Parrakeet. — Perruche bouton bleu, Perruche à front bleu. — Blauwvoorhoofd Parkiet.

Unter den Keilschwanzsittichen, welche für dieses Buch in betracht kommen, dürfte der blaustirnige als besonders interessant hoch obenan stehen, denn er ist nach verständnißvoller Beobachtung seitens zweier hervorragenden Vogelpfleger als sprachfähig und geistig begabt überhaupt geschildert worden. Er erscheint an Stirn und Vorderkopf bläulichgrün bis himmelblau; Flügel dunkelgrün; erste Schwinge an der Außenfahne himmelblau, die übrigen grün, alle an der Innenfahne olivengrünlichgelb und ebenso unterseits; Schwanzfedern oberseits grün, die beiden mittelsten einfarbig, die übrigen an der Innenfahne kupferroth, alle unterseits blaßgelb; ganze übrige Oberseite grasgrün, Unterseite schwach heller grün; Schnabel düster fleischfarben bis bräunlichroth (nach Bolau auch hornfarben, an Spitze und Unterschnabel dunkler); Wachshaut fleischroth; Auge orangegelb bis gelbbraun, nackter Augenkreis fleischfarbenweiß; Füße fleischfarben, Krallen hornbraun. Größe des Karo-

Digitized by Google

linasittichs (Länge 36,5 cm; Flügel 17,6 — 21,7 cm; längste Schwanzfedern 16,6 — 18,3 cm, äußerste Schwanzfedern 8,9 — 9,6 cm). Heimat: Brasilien, von Bahia bis zu den Grenzen von Bolivia. Zuerst von Spix (1824) veröffentlicht, dann vielfach mit verwandten Arten verwechselt, hat Souancé (1856) ihn richtig gestellt, doch erst Finsch ihn genau beschrieben. Er gehört also zu den erst seit neuerer Zeit bekannt gewordenen Arten. Die Reisenden Spix, Natterer, Burmeister haben über sein Freileben garnichts mitgetheilt, doch wird er in der Lebensweise mit den Verwandten sicherlich in Allem übereinstimmen.

Obwol er nur höchst selten lebend eingeführt wird und kaum in den bedeutendsten zoologischen Gärten oder auf den größten Ausstellungen zu finden ist, hatte zunächst Herr Ministerialsekretär Schmalz in Wien doch die Gelegenheit, fünf Köpfe zu erlangen, von denen er in anziehender Weise erzählt. „Schon in wenigen Tagen", sagt er, „gewöhnten sie sich an mich, obwol sie sehr scheu waren, und ich konnte mich bald davon überzeugen, daß ich in ihnen Papageien von vorzugsweise hoher Begabung vor mir sah. Der eine hatte eine eiternde Bißwunde, die ich täglich reinigen und mit einem Schwamm auswaschen mußte. Während der Vogel sich dabei anfangs wie sinnlos gebehrdete, war er schon am vierten Tage völlig gefügig und bald brauchte ich ihn garnicht in die Hand zu nehmen, denn wenn er mich mit dem Schwamm kommen sah, hielt er freiwillig den Kopf nach vorn geneigt hin. Als er vollständig hergestellt war, begann er wie toll im Zimmer umherzufliegen, wodurch er die übrigen Vögel nicht wenig beunruhigte, aber auf meinen Ruf ‚Ara' hielt er sofort inne und wenn ich ihm den Schwamm zeigte, flog er sogleich auf den Platz, wo ich ihm immer die Wunde ausgewaschen und ließ sich ruhig in die Hand nehmen. Jetzt ist er überaus zahm, läßt sich auf den Rücken legen u. s. w. Früher ein arger

Digitized by Google

Schreier, der namentlich morgens viel Lärm machte, hat er sich durch einige barsche Worte und leichte Hiebe auf den Schnabel das Lärmen gänzlich abgewöhnen lassen. Im übrigen ist er von entzückender Liebenswürdigkeit, und ohne besondern Unterricht hat er die Worte ‚Ara', ‚guter Ara' und ‚Kakadu' so deutlich wie ein Jako sprechen gelernt. Ein Weibchen dieser Art (welches sich später durch Eierlegen als solches ergab), wurde ganz ebenso zahm und lernte genau dieselben Worte, doch etwas leiser aussprechen." Frau v. Proschek, welche einen Dritten dieser Sittiche erhielt, berichtete, daß derselbe nicht allein gleichfalls ungemein zahm geworden, sondern auch fortwährend und viel plauderte und das Hundegebell nachahmte. Herr Napoleon M. Kheil in Prag kaufte vom Vogelhändler Petzold dort zwei Köpfe, welche sich als so reich begabt, munter und zutraulich, lebhaft und komisch erwiesen wie keine anderen Papageien. Freilich ließen sie zeitweise so unangenehmes gellendes Geschrei hören, daß es kaum auszuhalten war; je mehr Sonnenschein, um so ärgeres Geschrei. Sie lernten auch einige Worte nachplappern. Die Semmel, welche sie stets trocken erhielten, trugen sie jedesmal zum Wassernapf und tauchten sie ein, um sie genäßt zu verzehren. Ihr Behagen gaben sie durch knurrende Töne zu erkennen. — In den zoologischen Garten von London gelangte diese Art zuerst im Jahre 1864 in mehreren Köpfen; seitdem ist sie auch hin und wieder in die übrigen Gärten und auf die Ausstellungen gekommen. Von wo aus die Wiener und böhmischen Händler zweiter Hand sie erhalten, ist mir nicht recht erklärlich; wahrscheinlich sind sie von einem Hamburger Händler irrthümlich als eine Art der wenig beliebten kleinen Araras verkauft worden. Ein bestimmter Preis läßt sich der Seltenheit wegen nicht angeben.

Digitized by Google

Der orangegelbe Keilschwanzsittich

[Psittacus solstitialis, *L.*].

Sonnensittich, Sonnenwendesittich, Keilsittich. — Yellow Conure, Solstitian Parrakeet. — Perruche soleil, Perruche jaune. — Oranjegeele Parkiet.

Zu den schönsten unter den sprachbegabten Keilschwanzsittichen zählend, läßt er es bedauern, daß er trotz weiter Verbreitung und zahlreichen Vorkommens doch nur überaus selten und meistens einzeln lebend eingeführt wird. Er gehört zu den von Linné benannten Vögeln; bei den alten Schriftstellern herrschten auch inbetreff seiner mancherlei Irrthümer, so ließ ihn Albin in Ostindien und noch Bechstein in Angola heimisch sein.

Er ist im ganzen Gefieder zitrongelb; Augenkreis, Wangen und Ohrgegend röthlichorangegelb; Bürzel und obere Schwanzdecken reingelb; erste Schwingen an der Grundhälfte der Außenfahne grün, Endhälfte blau, Spitze und Innenfahne schwarz, an der Spitze ein gelber Fleck, zweite Schwingen blau, Innenfahne schwarz mit gelbem Endfleck, alle Schwingen unterseits schwärzlichgrau; Deckfedern der ersten Schwingen tiefblau, Innenfahne schwarz mit gelbem Endfleck; Schwanzfedern olivengrün, Enddrittel blau, die äußersten an der ganzen Außenfahne blau, die mittelsten an der Grundhälfte gelbgrün; alle unterseits grünlichgelbgrau; Brust und Bauch röthlichorangegelb; Schnabel dunkelbräunlichhorngrau bis schwarzbraun; Auge orangeroth, schmaler nackter Ring fleischroth; Füße bräunlichhorngrau, Krallen schwarz. Größe etwas geringer als die des Karolinasittichs (Länge 30,8 cm; Flügel 14,6 — 15,7 cm; längste Schwanzfedern 12,2 — 15,7 cm; äußerste Schwanzfedern 6,7 — 7,2 cm). Heimat: Südamerika, vom Amazonenfluß bis zum Orinoko. Die Reisenden Natterer und Burmeister haben ihn vielfach erlegt, geben jedoch keine Nachricht über sein Freileben; dieses schildern die Gebrüder Schomburgk, welche ihn am Fuß des Berges Mairari auf der Grenze zwischen Venezuela und Brasilien und am Mahufluß in großen Schwärmen sahen. Letztere machten sich durch weithin schallendes Geschrei bemerkbar.

Digitized by Google

Das Nest in einer Baumhöhle soll 2—3 Eier enthalten. Ihre Nahrung bilden die beerenartigen Früchte von ahornähnlichen Bäumen. Dieser Sittich darf als Lieblingsvogel der Eingeborenen gelten und ist in manchen Dörfern zu 20—30 Köpfen zu finden, welche frei umherfliegen, sich auf den einzelnstehenden Bäumen um die Hütten aufhalten und ein entsetzliches Geschrei erhoben, sobald die Reisenden sich nahten. Sie werden dort Kessi-Kessi genannt.

In den zoologischen Garten von London gelangte der Sonnensittich zuerst, und zwar nur in einem Kopf, i. J. 1862. Bei uns in den Vogelhandlungen und auf den Ausstellungen kommt er nur gelegentlich vor. In Berlin sah ich bei einem Händler zweiter Hand einen Vogel dieser Art, welcher schon längre Zeit im Privatbesitz gewesen, überaus zahm war und einige Worte allerliebst plauderte. Der Preis beträgt 60 bis 90 M. für das Pärchen und der einzelne Sprecher kostete 100 M.

Der hyazinthrothe Keilschwanzsittich

[Psittacus jendaya, *Gml.*].

Jendayasittich, blos Jendaya, hyazinthrother Sittich, Hyazinthsittich. — Yellow-headed Conure, Yellow-headed Parrakeet. — Perruche jendaya, Perruche à tête d'or. — Jendaya Parkiet.

Da es von dem Sonnensittich nachgewiesen, daß er sprachbegabt ist, so muß ich auch den Jendayasittich hier einreihen, denn beide Vögel gleichen einander so sehr in allen ihren Eigenthümlichkeiten, daß sich ein Unterschied eigentlich nur in der Färbung ergibt; das ganze Wesen beider ist durchaus übereinstimmend. Bisher haben wir freilich keinen sprechenden Hyazinthsittich vor uns, nach meiner festen Ueberzeugung aber wird ein junger Vogel dieser Art ebenso der Sprachabrichtung sich fähig zeigen wie der genannte Verwandte.

Digitized by Google

Der hyazinthrothe Sittich ist an Kopf, Hals, Nacken, Kehle und Brust hell- bis orangegelb; Gegend ums Auge, manchmal bis zu den Wangen hyazinthroth; Rücken grün, jede Feder gelb- bis hyazinthroth gesäumt; Unterrücken hyazinthroth; obere Schwanzdecken grün; die ersten Schwingen am Enddrittel indigoblau; Außenfahne grün, Innenfahne schwarz, die zweiten Schwingen blau, die letzten grün, alle unterseits schwarzgrau; Deckfedern der ersten Schwingen blau, die übrigen Deckfedern, Schulterdecken, Flügelrand und Bug grün; kleine unterseitige Flügeldecken hyazinthroth, größte grauschwarz; Schwanzfedern bräunlicholivengrün, Enddrittel tiefblau, unterseits düster olivengrünlichgelb, am Ende schwärzlich; Bauch, Seiten und Hinterleib hyazinthroth; untere Schwanzdecken röthlichgelb; Schenkelgegend roth und grün geschuppt; Schnabel schwarz; Auge perlgrau bis braun, schmaler, nackter Ring fleischroth; Füße und Krallen schwarz. Größe des vorigen (Länge 32,5 cm; Flügel 14,8 — 16,4 cm; längste Schwanzfedern 12,8 — 15,5 cm; äußerste Schwanzfedern 6,7 — 8,2 cm). Heimat: das südliche und mittlere Brasilien.

Auch er war bereits den älteren Ornithologen bekannt und ist, nachdem er schon von Brisson (1760) beschrieben, von Gmelin (1788) wissenschaftlich benannt worden. Bis zur Gegenwart her hat er wiederum vielfach Anlaß zu Irrthümern und Verwechselungen gegeben. Ueber sein Freileben ist wenig mitgetheilt worden. Natterer sah ihn parweise auf dürren Bäumen am Waldrand. Prinz von Wied beobachtete ihn in Flügen von 8 bis 20 Köpfen und sagt, daß er an den Kulturgewächsen, vornehmlich am Mais, manchmal sehr schädlich werde. Forbes fügt die Bemerkung hinzu, daß er in Brasilien häufig gezähmt gehalten werde. In der Thiersammlung von Schönbrunn befand sich schon i. J. 1854 ein hyazinthrother Sittich und während er bisher nur hin und wieder lebend eingeführt sein dürfte, gehört er jetzt im Handel nicht mehr zu den Seltenheiten, denn er ist von Zeit zu Zeit immer und zuweilen in zahlreichen Köpfen vorhanden. Ein Pärchen in meiner Vogelstube zeigte wunderliches Benehmen. Männchen und Weibchen

Digitized by Google

hielten unzertrennlich zusammen und was der eine that, verrichtete auch genau der andre. Wenn Jemand dem Käfig nahte, suchten sie mit gesträubten Federn, namentlich gehobnem Halskragen sich blähend und knixend, den Feind zu verscheuchen und wenn dies vermeintlich geglückt war, so kletterten sie unter gellendem Triumpfgeschrei in den Nistkasten. Nahte der Widersacher dann abermals, so guckten sie beide aus dem großen Schlupfloch hervor, packten wüthend mit den Schnäbeln den Rand desselben und zerrten und schüttelten daran, gleichsam um dem Feinde anzudrohen, daß es ihm schlimm ergehen werde, wenn er näher komme. Dieserhalb und ihres hübschen Gefieders wegen sind die Jendayasittiche recht beliebt; man findet sie hier und da in den bedeutenderen Vogelstuben und zoologischen Gärten und zwar stets parweise. Sie haben auch mehrfach in der Gefangenschaft genistet, so gibt Herr Pfarrer L. Füßle eine hübsche Schilderung, leider jedoch noch nirgends mit vollem Erfolg. Alles übrige inbetreff des vorigen Gesagte, gilt auch von diesem. Preis 60 bis 90 M. für das Pärchen und also die Hälfte für den einzelnen.

Der orangestirnige Keilschwanzsittich

[Psittacus aureus, *Gml.*].

Halbmondsittich, Goldstirnsittich, Goldstirne. — Half-moon Parrakeet, Golden-crowned Conure. — Perruche bouton d'or, Perruche à front jaune, Perruche couronnée. — Halve-maan Parkiet, Oranjevoorhoofd Parkiet.

Als eine liebliche Erscheinung tritt uns dieser schlanke zierliche Sittich entgegen und nur das allen Keilschwänzen eigenthümliche etwas schwerfällige Wesen läßt ihn weniger anmuthig erscheinen als er in Wirklichkeit ist.

Der Halbmondsittich ist in folgender Weise gefärbt: Stirn, Vorderkopf und Ring ums Auge orangegelb bis hochorangeroth;

Digitized by Google

Zügel und Kopfmitte düsterblau; Hinterkopf, Ohr- und Augengegend grün, bläulich verwaschen; ganze übrige Oberseite grasgrün, gelblich scheinend; Hinterrücken und Bürzel deutlicher gelbgrün; Schwingen grün, Spitze schwarz mit blauem Fleck an der Außenfahne und graugelb gesäumter Innenfahne; unterseits glänzend gelbgrau; kleine unterseitige Flügeldecken grüngelb; Schwanzfedern unterseits schwärzlichgrau; Wangen und Kehle graubräunlichgrün bis bräunlichgelbgrau; Unterhals und ganze übrige Unterseite grüngelb, an Brust- und Bauchmitte orangegelblich; Schnabel bräunlichschwarz; Wachshaut schwärzlich; Auge grau-, orangegelb bis röthlichbraun, schmaler nackter Augenkreis graubräunlich; Füße schwarzbraun, Krallen schwarz. Drosselgröße (Länge 28 cm; Flügel 13,2 — 15 cm; längste Schwanzfedern 10,9 — 13 cm; äußerste Schwanzfedern 6,3 — 7,4 cm). In seiner Heimat Südamerika ist er nicht allein sehr weit verbreitet, von Paraguay und Bolivia bis Surinam und Guiana, sondern kommt auch überaus häufig vor. Als seinen Aufenthalt nennen die Reisenden, insbesondre Prinz Wied und Natterer, Steppen und Vorhölzer in der Nähe der Küste, nicht aber den Urwald. Unter großem Geschrei fallen vielköpfige Scharen abends in Gebüsche zum Uebernachten ein und vor Tagesanbruch beginnen sie schon wieder zu lärmen. Sie verursachen dann auch recht großen Schaden an den Nutzgewächsen, vorzugsweise am Mais und Reis. Die Nester stehen in Höhlungen großer Manguebäume und jedes Gelege enthält 2 bis 3 Eier.

Vom alten Markgraf (1648) beschrieben, dann von Brisson (1760) erwähnt und von Gmelin (1788) wissenschaftlich benannt, gehört er nicht allein zu den seit altersher bekannten, sondern auch lebend eingeführten Papageien. Edwards, der ihn freilich verwechselt, hatte bereits ein Weibchen vor sich, welches mehrmals Eier legte und vierzehn Jahre in der Gefangenschaft ausdauerte. Schon Buffon rühmt den orangestirnigen Keilschwanz, welchen er zwar fälschlich in zwei Arten scheidet, als klug, einschmeichelnd und als vortrefflichen Sprecher.

Digitized by Google

Gegenwärtig zählt diese Art zu den gemeinsten Erscheinungen des Vogelmarkts und wird in Vogelstuben und Schmuckkäfigen gern gehalten, obwol sie sich durch schrilles Geschrei lästig macht, welchs jedoch keineswegs so arg ist wie das der verwandten. Auch dieser Sittich zeigt sich ungemein ausdauernd, vorausgesetzt allerdings, daß er nicht bereits kränklich in den Besitz des Pflegers gekommen. Die Mehrzahl der eingeführten besteht nämlich in Jungen, und diese sind in der ersten Zeit recht weichlich. Seine Züchtung ist wenigstens in einem Falle schon erfolgreich gewesen, denn Herr Tapezier E. Wenzel in Danzig hat Junge von ihm zum vollen Flüggewerden gelangen sehen.

Für uns hier, also als Sprecher, steht er unter den Keilschwänzen obenan, wie sich aus zwei Schilderungen ergibt, die ich im Auszuge mittheilen werde. Herr Gymnasiallehrer Schneider in Wittstock berichtet, daß ein sehr zahmer Halbmondsittich, der pfeifen, niesen, schnalzen u. drgl. konnte, auch einige Worte: ‚Ara', ‚Papa' u. a. plauderte. Hochinteressant sind die Angaben des leider zu früh verstorbnen Ornithologen Dr. Stölker in St. Fiden. Er erhielt einen Halbmondsittich in elendem Zustande, der sich dann bald gut erholte und während der Fütterung mit dem bettelnden Ruf ‚bitti, bitti!' begann, wenn er Obst oder dergleichen haben wollte. Dann lernte derselbe die Worte: ‚Das ist guet, recht guet!' ferner ‚guetetag! wie gehts — guet, recht guet!' Wenn Herr Stölker das erstre fragte, so antwortete der Papagei das letztre. Später sprach er ‚guet Nacht, Herr Doktor!' die Namen ‚Marie', ‚Julie' und ‚Leo', weiter ‚Bäberli, ja, wo bist Du?' „Dabei beißt er gern in den vorgehaltnen Finger, sodaß man sich beim Füttern in Acht nehmen muß, und schilt man ihn, so ruft er selbst im Zorn ‚gang a weg, wart', Du Spitzbueb, wart', wart' ich chomme!' ein andermal fragt er, ‚was thueſt?'

Digitized by Google

und ruft, ‚chomm abe‘ (komm' herunter). Er kann lachen und niesen und bei letzterm wünscht er sich selber höflich ‚Gsondheit!‘ Nach längrer Abwesenheit zeigt er bei meinem Kommen außerordentliche Freude und plappert vor Aufregung ein komisches Kauderwälsch. Bei aller Liebenswürdigkeit und Drolligkeit läßt er aber doch zuweilen ein recht abscheuliches Geschrei erschallen und zwar so hartnäckig, daß er trotz aller Drohungen kaum zu beschwichtigen ist. Komischerweise unterbricht er sich dann manchmal selbst mit dem Zuruf ‚bist still!‘ womit er übrigens auch mich selber manchmal mahnt, wenn ich durch Pfeifen oder sonstwie Lärm mache. Singe oder pfeife ich ihm etwas vor, so streckt er sich möglichst in die Höhe, schreitet gravitätisch und mit gesträubtem Gefieder gleichsam tanzend auf der Stange hin und her, dann und wann einen Pfiff oder Schrei ausstoßend. Im Singen hat er es nicht weit gebracht; er versucht immer ‚kommt a Vogerl geflogen‘ und dann folgt noch etwa ‚e Briefle auf mei Fuß‘. Zur Nachtruhe hängt er sich immer ans Gitter. Als Futter nimmt er nur Sämereien: Hirse, Kanariensamen, Hafer und Sonnenblumenkerne und ein wenig Quarkkäse, Rüben oder Obst an, und dabei scheint er sich sehr wohl zu befinden. In Gegenwart fremder Personen läßt er sich niemals hören; wenn meine eigne Katze ins Zimmer kommt, so bleibt sie unbeachtet, während er eine fremde mit gackerndem Geschrei begrüßt. Beiläufig sei noch bemerkt, daß auch ein zweiter Halbmondsittich, welchen einer meiner Bekannten besaß, recht gut sprechen lernte.“ — Ich selber kann hinzufügen, daß ein solcher in meinem Besitz ohne Bemühung meinerseits zahm wurde und wenn ich die Vogelstube betrat, mir sogleich auf die Schulter geflogen kam und auf den vorgehaltnen Finger kletterte. Er dürfte sich daher vor allen Verwandten durch Gelehrigkeit und Liebenswürdigkeit zugleich auszeichnen. In den Vogelhandlungen wird er gewöhnlich pärchenweise ausge-

Digitized by Google

boten für 18, 24 bis 30 M., selten für 15 M.; den einzelnen jungen zum Sprechen abrichtungsfähigen orangestirnigen Sittich kann man für 12 bis 15 M. kaufen.

Der Keilschwanzsittich mit gelbem Gesicht

[Psittacus pertinax, *L.*].

Gelbwangiger Keilschwanzsittich, gelbwangiger Sittich, St. Thomas-Sittich, gelbgrüner Grassittich, Goldmaskensittich. — Yellow-cheeked Conure, St. Thomas Conure. — Perruche à joues jaunes, Perruche à joues oranges. — Geelwang Parkiet.

Der Keilschwanzsittich mit ockerbräunlichem Gesicht

[Psittacus aeruginosus, *L.*].

Keilschwanzsittich mit spangrünem Oberkopf, braungesichtiger Sittich, Braunwangensittich. — Brown-throated Conure. — Perruche à gorge brune, Perruche à joues brunes. — Bruinwang Parkiet.

Der grünwangige Keilschwanzsittich

[Psittacus cactorum, *Pr. Wd.*].

Kaktussittich, Kaktus-Perikit. — Cactus Conure, Curassow Parrakeet, Maccawle Parrakeet. — Perruche cactus, Perruche à joues verts, Perruche à ventre orange. — Groenwang Parkiet.

Die drei letzten Arten der Keilschwanzsittiche, welche als sprachbegabt inbetracht kommen, darf ich zusammenfassen, denn sie sind vom Gesichtspunkt der Liebhaberei für sprechende Vögel aus nur als mittelmäßig oder vielmehr als geringwerthig zu betrachten, und im übrigen in mehrfacher Hinsicht einander ähnlich. Auf den ersten Blick erscheinen sie trotz schlichter Färbung allerliebst, anmuthig oder wenigstens niedlich und komisch und daher finden sie auch manchmal zahlreiche Liebhaber; bei näherer Kenntniß jedoch werden sie durch ihr schrilles, gellendes und dabei unverwüstliches Geschrei nur zu leicht unausstehlich, während zugleich ihre Sprachbegabung,

Digitized by Google

wie erwähnt, doch nur gering ist. Um der letztern willen muß ich sie indessen hier mitzählen.

Bei den Systematikern haben diese Keilschwänze mancherlei Verwirrung und Streit erregt und man ist bis zum heutigen Tage inbetreff ihrer noch nicht völlig im Klaren: ich beschreibe und schildre sie hier so, wie ich sie in zahlreichen lebenden Köpfen seit Jahren vor mir gesehen, also wol gründlicher kenne, als irgend ein Andrer.

Der Keilschwanzsittich mit gelbem Gesicht ist an Stirnrand bis zum Auge, Zügeln, Schläfen, Ohrgegend, Kopfseiten und Schnabelgrund dunkelorangefarben; Oberkopf meerbläulich; Hinterkopf und Nacken grünlichgelb; ganze übrige Oberseite grasgrün; Schwingen am Ende grünlichblau, Innenfahne schwarz gesäumt, unterseits schwärzlichgrau; Schwanzfedern am Ende bläulich, unterseits olivengrünlichgelb; ganze übrige Oberseite grasgrün; Halsseiten, Kehle und Oberbrust ockerbräunlicholivengrün; Brust und ganze übrige Unterseite mehr gelblichgrasgrün; Bauchmitte mit orangegelbem Fleck; Schnabel bräunlichhorngrau bis schieferschwarz; Wachshaut graulich bis reinweiß; Auge bräunlichgelb bis dunkelbraun; nackte Haut ums Auge weiß; Füße bräunlichhorngrau, Krallen schwarz. Jugendkleid nur an Zügeln und Gegend ums Auge orangefarben; Stirn und Oberkopf düstermeerblau; Kopfseiten, Schnabelgrund und Kehle olivenbräunlich, Bauch orange. Uebergangskleid: breiter Stirnrand fahlbräunlichgelb; Stirn und Oberkopf bräunlichgrün, rings ums Auge ein breiter orangegelber Ring; Augengegend, Wangen, Kehle, Oberbrust fahlgelblichbraun; Unterbauch orangegelb. Drosselgröße (Länge 25,2 — 26 cm; Flügel 12,4 — 13,6 cm; längste Schwanzfeder 9,4 — 11,8 cm, äußerste Schwanzfeder 5,4 —7,8 cm). Heimat: Südamerika, von Rio Negro bis Darien über Panama, die westindischen Inseln, Trinidad, St. Croix und St. Thomas.

Der Keilschwanzsittich mit ockerbräunlichem Gesicht ist an Stirnrand fahl ockerbräunlich; Oberkopf düster meerbläulich; Zügel, Augengegend, Wangen und Kopfseiten ockerbräunlichgrau, fein schwarz geschuppt; Schwingen an der Außenfahne schwach

Digitized by Google

grünlichblau, Innenfahne grau, unterseits silbergrau; kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün; die beiden mittelsten Schwanzfedern an der Endhälfte blau, Grundhälfte grünlich, die übrigen bläulichgrün, alle unterseits olivengrünlichgelb; ganze übrige Oberseite rein dunkelgrün; Kehle und Oberbrust ockerbräunlichgrau, fein schwarz geschuppt; Unterbrust und Bauch rein grüngelb; Brust und Bauchseiten gelb; Hinterleib orangeröthlichgelb bis lebhaft orangeroth; Schnabel schwärzlichgrau; Wachshaut weiß; Auge gelbgrau; breite nackte Haut ums Auge weiß; Füße fleischfarben, Krallen schwarz. Größe des vorigen. Seine Heimat ist mit der des vorigen übereinstimmend.

Der grünwangige Keilschwanzsittich ist an Stirn und Vorderkopf fahl olivenbräunlich, graubräunlich verwaschen; Kopf grasgrün; Schwingen dunkelgrün, Ende grünlichblau, Innenfahne breit schwärzlich, unterseits ganz graulichschwarz; kleine unterseitige Flügeldecken grasgrün, mit einigen gelblichen Federn; Schwanzfedern am Ende grünlichblau, unterseits düster graulichorangegelb; ganze übrige Oberseite grasgrün; Zügel, Wangen und Ohrgegend hellgrün; untere Wangen, Kehle und Oberbrust olivengrünlichockerbraun; Brust, Brustseiten, Bauch und Hinterleib tief orangegelb; Schenkel und untere Schwanzdecken hellgrün; Schnabel röthlichgrauweiß; Nasenhaut weiß; Auge gelbgrau bis orangegelb; breite nackte Haut ums Auge weißlichgrau; Füße dunkelfleischfarben, Krallen schwarz. Größe der beiden vorigen. Heimat: der Osten Brasiliens.

Nach den leider kurzen Berichten der Reisenden, Schomburgk, Natterer, Burmeister, wissen wir von diesen Sittichen nur, daß sie im allgemeinen die Lebensweise führen, welche ich in der Uebersicht aller Keilschwanzsittiche geschildert habe; auch die Entwicklung ihrer Bruten ist nicht bekannt. Prinz Wied sah Schwärme des Kaktussittich auf den Hochebenen der Provinz Bahia, wo sie die blutrothen saftigen Früchte der Kaktus', sowie andere Beren fraßen, und aufgescheucht, mit lautem, gellendem Geschrei davonflogen.

Beide ersteren, sowol der Keilschwanzsittich mit gelbem Gesicht, wie der Keilschwanzsittich mit ockerbräunlichem Gesicht,

Digitized by Google

sind bereits von Brisson (1760) beschrieben und von Linné benannt; der Kaktussittich dagegen wurde erst vom Prinzen Max v. Wied (1820) entdeckt und beschrieben. Jene beiden haben erklärlicherweise bei den alten Schriftstellern noch viel mehr Anlaß zu Irrthümern gegeben als bei den späteren, und es läßt sich daher kaum etwas andres anführen, als daß Edwards, Brisson, Buffon u. A. sie schon in Schrift und Bild vielmals dargestellt haben. Bechstein schildert sie nach den Angaben der Genannten und fügt dann hinzu, daß man sie gewöhnlich pärchenweise in einem Käfig von Messingdraht halte, mit in Milch getauchter Semmel und Nüssen füttre, und daß sie um ihrer schönen Farbe, Zutraulichkeit und gegenseitigen Zärtlichkeit willen sehr beliebt seien; „sie lernen aber wenig oder garnicht sprechen und machen beständig häßlichen Lärm."

Gegenwärtig gelangen alle drei Arten so oft und zahlreich in den Handel, daß sie zu den gemeinsten Vögeln des Markts gehören; nur ist der Kaktussittich etwas seltner als die beiden anderen. Die Händler und gleicherweise die Liebhaber unterscheiden sie in der Regel garnicht und nur für Züchter werden sie nach den einzelnen Arten ausgeboten; bis jetzt ist aber ihre Zucht trotz vielfacher Versuche nicht gelungen. Dagegen erscheinen sie ungemein drollig in den beim Jendayasittich erwähnten komischen Gebehrden, werden viel eher als alle vorhergegangenen Verwandten zahm und ungemein hingebend, lassen sich auch so gewöhnen, daß sie frei umherfliegen dürfen, und selbst im Hof und Garten auf einen Ruf zur Hand zurückkehren. Frau Baronin v. Schlechta rühmt den braunwangigen Sittich als „liebenswürdigen, muntern Vogel, der mich auch mit einem einfachen Gesang erfreute, dann in sehr spaßhafter Weise mit dem Füßchen am Schnabel kratzte und dabei rief: ‚Papageichen, Papageichen, da da, da da!' Im übrigen war er sehr klug, oft aber recht unbändig; ein zweiter zeigte sich

Digitized by Google

sanfter." Wenn diese Sittiche in der geschilderten Weise zahm geworden und zum Sprechen abgerichtet sind, so pflegen sie nur selten oder niemals mehr ihr häßliches Geschrei erschallen zu lassen. Man muß für diesen Zweck natürlich möglichst junge Vögel zu erlangen suchen. Der Preis steht bei den rohen Vögeln auf 12, 18 bis 24 M. für das Pärchen und bis 30 M. und darüber für den einzelnen zahmen und abgerichteten Sittich.

* * *

Die Dickschnabelsittiche [Bolborrhynchus, *Bp.*] bilden ein Papageiengeschlecht mit verhältnißmäßig wenigen Arten, von denen nur eine im Handel gemein ist, während alle übrigen noch garnicht oder nur höchst selten lebend eingeführt worden. Jene erstre aber zählt zu den Sprechern. Durch folgende Merkmale zeichnen sich die Dickschnäbel von den Verwandten aus: Schnabel kräftig, dick und kurz, an den Seiten bauchig erweitert, mit abgerundeter First ohne Längsrinne, Oberschnabel mit kurzer, breiter, stumpfer Spitze und flachem Zahnausschnitt, Unterschnabel hoch, mit breit abgerundeter Dillenkante; Nasenlöcher klein, frei, mit wulstigen Rändern, nur ausnahmsweise unter Stirnfedern versteckt; Zügel befiedert; nackter Augenkreis kaum bemerkbar; Füße kurz und kräftig; Flügel lang, Schwingen spitz; Schwanz keilförmig abgestuft; Gefieder weich. Färbung wenig lebhaft. Star- bis Drosselgröße, doch abgesehen von dem längern Schwanz. Heimat: Südamerika. Verbreitung die westlichen, südlichen und mittleren Theile, eine Art geht auch weiter nördlich hinauf. Alle kommen bis zu bedeutender Höhe vor, und einige sollen ausschließlich Gebirgsvögel sein. Das Freileben ist wenig erforscht. Ihre Nahrung dürfte vornehmlich in Sämereien, weniger oder garnicht in Früchten bestehen. Von einem Dickschnabel hat man sowol im Freileben als auch in der Gefangenschaft die Brut erforscht und dieselbe ergibt die auffallende Erscheinung, daß dieser Papagei abweichend von fast allen anderen ein freistehendes Nest errichtet. In der Heimat sollen mehrere dieser Sittiche als Stubenvögel beliebt sein; zu uns wurde bis vor kurzem aber nur einer lebend eingeführt und neuerdings ist noch ein zweiter zum erstenmal hinzugekommen; ein dritter ist vor längrer Zeit in einem

Digitized by Google

Kopf in den zoologischen Garten zu Hamburg gelangt, seitdem aber nicht wieder erschienen. In der Ernährung, bzl. Fütterung stimmen die Dickschnabel- mit den Keilschwanzsittichen überein.

Der Mönchs-Dickschnabelsittich

[Psittacus mónachus, *Bdd.*].

Mönchssittich, Quäkersittich. Mäusesittich. Mönchspapagei, Quäker, junge Witwe, grauköpfiger Dickschnabelsittich. — Grey-breasted Parrakeet, Quaker Parrakeet. — Perruche moine, Perruche souris. — Monniks Dikbekparkiet of Muisparkiet.

In ähnlicher Weise wie der Karolinasittich nimmt auch der Mönch oder Quäker von vornherein für sich ein; freilich sieht sein Gefieder nicht so bunt und auffallend aus, wie das des erwähnten Keilschwanz, sondern vielmehr schlicht, in sanften Farben, aber ungemein ansprechend, ja seine ganze Erscheinung ist so hübsch, daß der Forscher Azara, welcher ihn in der Heimat beobachtet, ihm den Namen Junge Witwe beigelegt hatte. Dem Liebhaber aber, welcher sich dadurch verleiten läßt, ein Pärchen dieser Dickschnäbel anzuschaffen, machen sie sich baldigst im höchsten Grade überdrüssig, nämlich durch ihr unverwüstliches Geschrei. Das anhaltende durch nichts zu stillende Gekreisch für die Dauer zu ertragen, dürften selbst die kräftigsten Nerven nicht ausreichend sein.

Der Mönchs-Dickschnabelsittich ist an Stirn, Vorderkopf, Zügeln, Wangen, Kehle, Vorderhals und Brust hellgrau, jede Feder mit schmalem fahlgrauen Endsaum, sodaß die graue Färbung namentlich an Stirn und Brust wie zart geschuppt erscheint, an der letztern auch mit bemerkbar bräunlichem Ton; ganze übrige Oberseite grasgrün; Mantel olivengrünlichbraungrau verwaschen; Schwingen erster Ordnung indigoblau, Außenfahne grün gerandet, Innenfahne breit schwärzlich, Schwingen zweiter Ordnung, Deckfedern und Eckflügel blau, alle Schwingen unterseits grünblau; Schwanzfedern an der Innenfahne gelblichgrün, unterseits grünlichblau, Innenfahne gelbgrün gerandet; Unterbrust und Bauch hellgelblichgrau; Unterbauch,

Digitized by Google

Schenkel, Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel gelblichgrau; Auge braun; Füße bräunlichgrau, Krallen schwärzlich. Jugendkleid weniger lebhaft grün und mehr einfarbig grau; die hellen Ränder der grauen Federn an Hals und Brust sind noch nicht vorhanden; Schwingen nicht rein-, sondern mehr grünblau. Drosselgröße (Länge 27,3 cm; Flügel 12,2 — 15,2 cm; längste Schwanzfeder 11,3 — 14,8 cm; äußerste Schwanzfeder 5,4 — 8,7 cm).

Seine Heimat ist das westliche Südamerika und in Paraguay, Uruguay, Argentinien und Bolivia soll er sehr gemein sein. Im Gebirge findet man ihn bis zu 1000 m Höhe. Der Mönchssittich wurde von Gmelin (1783) beschrieben und benannt und über sein Freileben haben die amerikanischen Forscher insbesondre Azara, Darwin, Rengger, Burmeister, Gibson u. A. sehr ausführliche Mittheilungen gemacht. Diese Sittiche leben immer, auch während der Nistzeit, gesellig. Ihr Flug ist hurtig und gewandt mit schnellen Flügelschlägen, sie klettern ungemein geschickt, laufen aber unbeholfen auf dem Boden und als Baumvögel kommen sie selten zum letztern herab. Ein Schwarm verräth sich, gleichviel wo er sich aufhalte, stets durch das fortwährende schrille und gellende Geschrei und Gelärme. Die Nahrung besteht in Sämereien, aber auch in Früchten und im Sommer und Herbst vorzugsweise in Distelsamen. Alle Wälder, sagt ein Reisender, enthalten Tausende von Nestern dieser Sittiche, und dieselben hängen gewöhnlich in den Spitzen der Zweige, in welche sie hineingeflochten sind. Jedes einzelne Nest besteht in einem Vorbau und hinter diesem in der eigentlichen Nisthöhle, welche immer von einem Par bewohnt ist. Der Eingang führt gewöhnlich von unten hinauf, befindet er sich an der Seite, so ist er durch ein überragendes Dach geschützt. So errichten etwa ein Dutzend Pärchen ihre Nester dicht nebeneinander, in jedem Frühjahr baut das Par ein neues an oder auf das alte und dadurch entstehen allmälig ungeheure Klumpen von Nestern in einer Masse, welche wol mehrere Zentner schwer

Digitized by Google

wird; auf manchen alten gewaltigen Waldbäumen sieht man aber bis sieben oder acht solcher Brutansiedelungen, an denen die Vögel fortwährend thätig sind, ausbessern u. s. w.; neue Nester werden stets nur im Frühling, zur wieder beginnenden Nistzeit, angefügt. Die Brut fängt mit dem November an, und 7—8, meistens aber nur 6 Eier, bilden das Gelege. Auch nach der Brutzeit, also das ganze Jahr hindurch, werden die Nester von den Vögeln bewohnt. Als Baustoffe werden ausschließlich dornige Reiser benutzt und nach Azara's Angabe soll die Bruthöhle mit Gräsern ausgepolstert sein. In den alten umfangreichen Nesterballen hausen nicht selten auch fremde Gäste, so eine Entenart, die sehr gern sich darin ansiedelt, und manchmal wol gar ein Opossum. Am Nest erschallt den ganzen Tag hindurch das gellende Gekreisch und dadurch, nicht minder aber durch die Plünderungen, welche diese Sittiche an Mais, Obst und mancherlei anderen Nutzgewächsen anrichten, machen sie sich sehr verhaßt, umsomehr, da sie nach Papageienart viel mehr vernichten als eigentlich fressen. Sie werden daher überaus eifrig verfolgt und da sie trotzdem wenig scheu sind, ungemein zahlreich geschossen oder auch in Netzen gefangen. Sie gelten zugleich als schmackhaftes Wildbret und man veranstaltet von Zeit zu Zeit förmliche Papageienschießen. In manchen Gegenden hat man Schußgeld auf ihre Erlegung ausgesetzt und so werden sie z. B. am La Plata zu Tausenden alljährlich abgeschossen. In ihrer Zudringlichkeit lassen sie sich garnicht verscheuchen, sondern kehren nach den Maisfeldern u. a. immer wieder zurück. Nur an wenigen Stellen, wo sie schon wahrnehmbar verringert worden, sind sie vorsichtig und sehr scheu und dann bildet solch' Quäkersittich wol gar den Warner für alle anderen Thiere, zum großen Verdruß des Jägers. Nach beendeter Brutzeit schwärmen sie nicht selten in vielköpfigen Scharen nahrungsuchend umher.

Digitized by Google

Schon die alten Schriftsteller, Buffon, Bechstein u. A., beschäftigten sich mit dem Quäker als Stubenvogel. Letztrer sagt, er scheine melancholischen Temperaments zu sein, werde sehr zahm und lerne auch, wiewol nur wenig, sprechen; seine Lockstimme sei ein hohes, scharf klingendes Kreischen. Azara berichtet, daß er in der Heimat als Käfigvogel recht geschätzt sei und mit Vorliebe zum Sprecher abgerichtet werde. Ueberaus interessant ist die Mittheilung von Gibson, daß man unter den Scharen im Walde manchmal einen Quäker höre, welcher menschliche Worte spreche, die er als Käfigvogel gelernt und nun nach seinem Entkommen hier in der Freiheit noch beibehalten habe; „so hörte ich oft zu meiner Verwirrung, wenn ich durch den Wald streifte, das heisere ‚Pretty Poll' eines solchen Vogels." Der Reisende meint, daß die Mönchssittiche immer nur undeutlich sprechen lernen. Diese letztre Behauptung widerlegt aber ein liebevoller Beobachter, Herr Dr. D. A. Willink in Utrecht, mit voller Entschiedenheit. Er fand bei einer Händlerin Frau Bianchi in Nizza, einen abgerichteten Mäusesittich, welcher zunächst dadurch auffiel, daß er wüthend nach jedem Fremden biß und den daher Niemand kaufen wollte. „Bei häufigen Besuchen gewöhnte sich der Vogel aber bald an mich und begann zu sprechen. Französisch konnte er nur ‚zu den Waffen' rufen und dann ahmte er einen Trommelwirbel nach; italienisch sagte er ‚Rosetta komm' her', ‚gib mir einen Kuß'. Dann hustete und lachte er, wurde bald so zahm, daß er auf den Finger kam und Küßchen gab. Ich kaufte ihn und er ist jetzt gegen mich ungemein liebenswürdig, gegen jeden Fremden bleibt er jedoch unfreundlich und böse. Er spricht übrigens ebenso deutlich wie der beste Graupapagei, sein arges Geschrei hat er aber trotzdem nicht abgelegt, sondern läßt dasselbe leider nur zu oft erschallen." Auch Herr Zahlmeister Exner berichtet von seinem Mönchssittich, welchen er frei in den Garten fliegen

Digitized by Google

lassen durfte und der viel sprechen und singen lernte, auch lachen und weinen konnte.

Wer den Versuch mit der Abrichtung eines solchen Sittichs zum Sprechenlernen unternehmen will, sollte sich vor allem bemühen, daß er einen jungen Vogel dieser Art erlange, und ich habe deshalb das Jugendkleid besonders angegeben; je düstrer, weniger klar und bemerkbar gewellt die graue Färbung und je dunkler die Augen, um so jünger ist der Quäker und um so eher für den Unterricht empfänglich wird er sich ergeben.

Im Handel wird diese Art meistens pärchenweise ausgeboten und dann entweder von unkundigen Liebhabern gekauft und in der Regel schleunigst wieder abgeschafft oder mit Vorbedacht für den Zweck eines Züchtungsversuchs erworben. Der letztre bildet in der That viel Anregung und Vergnügen und hat schon mehrfach zu guten Erfolgen geführt; über solche berichteten die Herren Ministerialsekretär Schmalz in Wien, Kaufmann E. Linden in Radolfzell und Maler Mützel in Berlin, letztrer aus dem zoologischen Garten. In allen diesen Fällen hatten die Sittiche ganz ähnliche Nester wie in der Freiheit errichtet. Für die zoologischen Gärten ist der Quäker um so werthvoller, da er sich kräftig und ausdauernd zeigt und auch ganz gut im ungeheizten Raum überwintern läßt. Preis: 12 bis 18 M. für das Pärchen, 7,50 bis 10 M. für den einzelnen.

Der schwarzgefleckte Dickschnabelsittich [Psittacus lineolatus, *Brd.*] — Katharina-Sittich — Black-spotted Parrakeet — Perruche à tâches noires — Zwartvlek Parkiet. Die zufällige Thatsache, daß ich ein Pärchen schwarzfleckige Dickschnäbel lebend vor mir habe, und die Voraussetzung, daß dieser Sittich ebenso wie der verwandte Quäker sprachbegabt sein wird, veranlassen mich dazu, diese bisher noch niemals lebend eingeführte Art, hier

Digitized by Google

mitzuzählen. Sie ist an der ganzen Oberseite dunkelgrasgrün, jede Feder mit schwärzlichem Endsaum; Hinterrücken olivengrünlich und hier ebenso wie am Bürzel und an den oberen Schwanzdecken jede Feder mit breiten rundlichen schwarzen Endflecken; erste Schwingen dunkelgrün, Innenfahne schwarz, die übrigen Schwingen grün, alle unterseits düstergrün; mittelste Flügeldecken an der Außenfahne schwarz gerandet; kleinste Flügeldecken am Unterarm schwarz (einen großen länglichen Fleck bildend); Flügelrand hell gelbgrün; Schwanz dunkelgrün, die beiden mittelsten Federn am Ende schwarz, alle unterseits düstergrün; Kopfseiten und ganze Unterseite lebhaft grasgrün; an den Schenkelseiten jede Feder mit breitem schwarzen Endfleck; untere Schwanzdecken grasgrün, mit kleinen schwarzen Flecken; Schnabel weiß; Auge braun; sehr schmaler nackter Augenkreis weiß; Füße fleischfarben, Krallen schwarz. Kaum Stargröße (Länge 13—$15_{,5}$ cm; Flügel $10_{,5}$—11 cm; Schwanz $6_{,5}$—7 cm). Heimat: Mexiko und Guatemala. Dieser Sittich erscheint so gekennzeichnet, daß eine Verwechselung garnicht möglich ist. Er wurde erst durch Cassin (1853) bekannt gemacht und dann unter verschiedenen Namen beschrieben; doch haben Baird (1858) und nach ihm Sclater (1859) ihn dann festgestellt. Selbst in der Heimat soll er höchst selten vorkommen, sodaß erst wenige Museen einen Balg von ihm aufzuweisen haben. Die Leser können sich wol denken, wie werthvoll daher das Pärchen dieser Vögel für mich ist. Die beiden Sittiche zeigen sich als ungemein sanft, lassen nur ein leises Geplauder hören und schreien garnicht. Sie wurden mir im Oktober 1882 vom Großhändler H. Fockelmann in Hamburg zur Bestimmung zugeschickt und ich entnahm sie für meine Vogelstube. Obwol die Geschlechter sich in der äußern Färbung nicht unterscheiden lassen, so glaube ich doch mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß die Vögel ein richtiges Pärchen sind und zur Brut schreiten werden. Hoffentlich wird die mir glückende Züchtung und dann weitre Einführung des schwarzgefleckten Dickschnabels auch ihm mehr Bedeutung für die Liebhaber bringen.

Digitized by Google

Von den übrigen Angehörigen dieses Geschlechts ist, wie schon S. 344 erwähnt, nur noch ein einziger, der **Dickschnabelsittich mit gelbem Gesicht** [Psittacus aurifrons, *Lss.*] vor Jahren in einem Kopf lebend eingeführt und zwar in den zoologischen Garten von Hamburg.

* * *

Die Schmalschnabelsittiche [Brotogérys, *Vgrs.*]. Wer diese kleinen Papageien von Finken- bis Drosselgröße selber gehalten hat und sie also ausreichend kennt, zerbricht sich wol vergeblich den Kopf darüber, weshalb der Vogelkundige Vigors ihnen die lateinische Bezeichnung beigelegt, welche in der Uebertragung „mit menschlicher Stimme begabt" lautet. Von den bisher bekannten Arten haben sich mehrere allerdings als fähig erwiesen, menschliche Worte sprechen zu lernen, allein ihre Begabung ist doch nur eine so geringe, daß sie auf der untersten Stufe von allen gefiederten Sprechern stehen. Dagegen sind sie meistens angenehm gefärbt, in ihrer Erscheinung niedlich, im Wesen komisch, sie werden überaus zahm und dreist, aber niemals wirklich zutraulich und hingebend; immer bleiben sie ungemein lästige Schreier.

Ihre besonderen Merkmale hat Finsch in folgendem aufgestellt: Schnabel ziemlich lang, schlank, stark seitlich zusammengedrückt, an der First kantig, mit langer, dünner, stark herabgekrümmter Spitze und tiefem Ausschnitt; Zunge dick, fleischig, vorn abgestumpft, Nasenlöcher rund und frei, in breiter nackter Wachshaut; Zügel befiedert; Augenkreis nackt; Flügel lang, spitz; Schwanz keilförmig, alle Federn an der Spitze zugerundet; Füße ziemlich schwach mit kurzem Lauf; Gefieder weich und voll. Die Geschlechter dürften übereinstimmend gefärbt sein. Heimat: ganz Südamerika, einige auch in Mittelamerika. Ueber das Freileben liegen bisher nur geringe Angaben vor. Sie sind sehr gesellig und im ganzen Wesen harmlos. Man weiß noch nicht, ob sie, wie die vorgegangenen Verwandten, auch zu zahlreichen Pärchen vereint nisten, doch dürfte dies kaum der Fall sein. Ihre Bewegungen sind einigermaßen schwerfällig; sie fliegen zwar hurtig, doch nicht gewandt, klettern auch ziemlich ungeschickt und trippeln unbeholfen auf dem Boden. Die Nahrung soll in allerlei Samen, Früchten, Beren und anderen

Digitized by Google

Pflanzenstoffen bestehen und auch sie sollen manchmal argen Schaden an Mais, Reis, Obst u. a. verursachen. Das Nest steht wie bei allen Verwandten in einer Baumhöhle und das Gelege soll 2—4 Eier enthalten.

Gleich anderen Papageien sind auch sie schon in der Heimat als Stubenvögel beliebt, doch werden sie kaum wie die großen aus den Nestern gehoben und aufgefüttert, sondern vielmehr als alte Vögel gefangen. Dies ist infolge ihrer Harmlosigkeit, ja Dummdreistigkeit, staunenswerth leicht. Man kann vermittelst einer an einen Stock gebundnen Pferdeharschlinge, die man einem nach dem andern über den Kopf streift, oder mit einer Leimrute einen ganzen Schwarm aufreiben, wenn man erst einen einzigen hat, welchen man als Lockvogel benutzt. Von vornherein zeigen sie sich nicht dummscheu wie viele andere gefangene Vögel, sondern, wenn auch anfangs sehr ängstlich, doch bald dreist und sogar frech, indem sie gegen die fütternde Hand, ebenso wie gegen jeden Feind überhaupt, vereint kämpfend losgehen. Unter schnatterndem Geschrei, kopfnickend und mit erhobenen Flügeln erscheinen sie überaus streitbar und dabei zugleich sehr komisch; bei der geringsten Bedrohung aber flüchten sie erschreckt in einen Winkel. Sie halten in innigster Weise zusammen, gleichviel ob ein richtiges Pärchen oder zwei vom gleichen Geschlecht bei einander sind. Alle Verrichtungen, Fressen, Trinken Flügelausschwingen, plötzliches Losschnattern, führen sie immer gleichzeitig aus. In Brasilien werden sie mit verschnittenen Flügeln auf einem Ständer, welcher eine wagerechte Sitzstange und einen Schlupfkasten zur Nachtruhe hat, angekettet gehalten; bei uns dagegen hat man sie in der Regel parweise in einem Käfig, doch dürfen sie nur allein oder mit größeren friedlichen Papageien zusammen sein, denn gegen alle schwächeren Genossen zeigen sie sich bösartig. Wenn A. E. Brehm sagt: „Sie beleben einen Flugbauer im hohen Grade und sind durchaus friedlich", so beruht dies in völliger Unkenntniß. Als Fütterung verlangen sie vorzugsweise Kanariensamen, Hanf und Hafer mit ein wenig Zugabe von süßer Frucht und Biskuit oder eingeweichtem Eierbrot, doch nehmen die meisten beides letztre garnicht einmal an. Sie sind recht kräftig und ausdauernd und lassen sich viele Jahre gut erhalten, nur muß man sie gegen Kälte und Nässe durchaus behüten; zwar ist eine Art, die größte, schon im Freien überwintert worden, doch muß ich inbetreff

Digitized by Google

der anderen kleineren und kleinsten ernstlich warnen. Bis jetzt sind acht Arten lebend eingeführt, aber nur eine gehört zu den gemeinen Vögeln des Handels. Trotzdem sie, wie erwähnt, fast nur pärchenweise gehalten werden, ist erst ein einziger Schmalschnabel in der Gefangenschaft gezüchtet. Die seltneren stehen ziemlich hoch im Preise. Ich werde hier selbstverständlich nur die schildern, welche bisher als Sprecher festgestellt worden.

Der Tovi-Schmalschnabelsittich

[Psittacus tovi, *Gml.*].

Tovisittich, Schmalschnabelsittich mit gelben Unterflügeldecken, Goldkinnsittich (!), gewöhnlich blos Grassittich oder Grasperikit. — Tovi Parrakeet. — Perruche tovi. — Tovi Parkiet.

Im Handel allbekannt und sogar ziemlich gemein, gehört der kleine Tovisittich doch keineswegs zu den häufigsten Erscheinungen des Markts, sondern er wird immer nur in einzelnen Pärchen eingeführt. Obwol schon von Brisson (1760) beschrieben und abgebildet, wurde er von den älteren Schriftstellern vielfach verwechselt und mit anderen Arten zusammengeworfen. Ueber sein Gefangenleben haben sie noch garnichts mitgetheilt.

Er ist am ganzen Körper grün; Kopf grasgrün, malachitgrün scheinend; Hinterhals und Mantel olivenbräunlich verwaschen; übrige Oberseite dunkelgrün; Bürzel und obere Schwanzdecken schwach bläulichgrasgrün; erste Schwingen mit schwärzlich gesäumter Innenfahne, zweite Schwingen an der Außenfahne bläulich, alle Schwingen unterseits düster grünlich, an der Außenfahne schwärzlich; Deckfedern der ersten Schwingen dunkelblau, mittlere und kleinste Flügeldecken nebst Schulterdecken gelblichzimmtbraun; kleine und mittlere untere Flügeldecken zitrongelb; Schwanzfedern dunkel malachitgrün, unterseits heller gelblichgrün; Kehlfleck dicht unterm Schnabel hochorangegelb; ganze Unterseite hell grüngelb; Schenkel, Bauch und untere Schwanzdecken grasgrün, malachitgrün scheinend; Schnabel weißlichhorngrau, Oberschnabel mit schwärzlicher Spitze; Auge dunkelbraun; Füße fleischfarbengrau, Krallen dunkler, horngrau. Etwa Sperlingsgröße

Digitized by Google

(Länge $18_{,9}$ cm; Flügel $10-11_{,8}$ cm; Schwanz $5_{,7}-6_{,5}$ cm). Jugendkleid in Farbe und Größe nicht abweichend. Heimat: Mittelamerika und die nördlichen Gegenden Südamerikas; am häufigsten soll er in Neugranada und Panama sein; in Brasilien dürfte er dagegen nicht vorkommen. Dr. A. v. Frantzius berichtet, daß er ihn auf Kostarika nur in der heißesten Gegend, vornehmlich am Golf von Nikoya, gefunden. „In der Hochebene, wohin sie vielfach zum Verkauf gebracht werden, sterben sie immer bald. Sie lassen sich leicht zähmen und lernen auch ein wenig sprechen".

Die Beobachtung in der Gefangenschaft hat gezeigt, daß sie keineswegs so sehr weichlich sind, sondern unser Klima recht gut ertragen; zahm werden sie sämmtlich, wie in der Uebersicht angegeben, ob sie aber alle so sprachbegabt sein werden, wie der, von welchem Herr Ph. Hallbauer berichtet, ist noch nicht festgestellt. Ein Pärchen, welches dessen Bruder, ein Schiffsarzt, bei der Rückkehr von Westindien mitgebracht, lernte, nachdem es sich etwa in Jahresfrist ausgemustert und ein schönes glattes Gefieder bekommen, von einer Amazone, neben deren Käfig es sich befand, sprechen, d. h., nur der eine, wahrscheinlich das Männchen. „Es begann mit leisem Nachahmen des Rufs ‚Kickerick', welcher sich nach und nach in ‚Kickericki' vervollkommnete. Bald lernte er dann auch das Wort ‚Papa' und beides hörte sich, von dem feinen Stimmchen ausgesprochen, sehr drollig an. Merkwürdig ist es, daß der kleine Sprachkünstler beim Rufen seines ‚Kickericki' auf der Sitzstange herumhüpft und mit den Flügeln schlägt, wodurch der komische Eindruck wesentlich erhöht wird". Die Reisenden haben übrigens mehrfach angegeben, daß der Tovisittich in der Heimat garnicht selten sprechen lernen soll. Wir dürfen daher wol erwarten, daß sich auch bei uns künftig mehrere zeigen werden, wenn die Liebhaber nämlich mit jüngeren

Digitized by Google

Vögeln sich die Mühe geben, sie zu unterrichten. Zwei Vogelpfleger, Frau Veronika Greiner und Herr Ministerialsekretär Schmalz, Beide in Wien, haben sich bis jetzt glücklicher Zuchtergebnisse mit dem Tovisittich erfreut. Trotzdem findet man ihn nicht oft in den Vogelstuben, weil sein anhaltend gellendes Geschrei doch zu lästig wird. Preis 15 bis 24 M. für das Pärchen.

Der Tuipara-Schmalschnabelsittich

[Psittacus tuipara, *Gml.*].

Tuiparasittich, orangeflügeliger Schmalschnabelsittich, Goldflügelsittich, Orangeflügelsittich. — Tuipara or Golden-winged Parrakeet. — Perruche tuipara. — Tuipara Parkiet.

Eigentlich hübscher, doch düstrer als der vorige gefärbt, hat er wol mehr um seiner Seltenheit als Schönheit und sonstigen Eigenthümlichkeiten willen im Handel einen höhern Preis als fast alle übrigen. Er ist schon vom alten Markgraf (1648) beschrieben und von Gmelin wissenschaftlich benannt. Trotzdem hat auch er wiederum für die Ornithologen Anlaß zu mancherlei Irrthümern geboten, welche wol zum größten Theil in der Veränderlichkeit seiner Zeichnung begründet liegen. Er erscheint dunkelgrasgrün, an der Unterseite kaum heller, schwach gelblicholivengrün; schmaler Stirnrand lebhaft orangeroth (fehlt jedoch zuweilen); Vorderkopf malachitgrün; Hinterkopf meerbläulich verwaschen; Zügel und Wangen schwach röthlicholivengrün; Kehlfleck unterm Schnabel hellorangeroth (fehlt gleichfalls zuweilen); Nacken und Mantel dunkelolivengrün; erste Schwingen an der Außenfahne dunkelgrün, fein röthlichgelb gesäumt, am Grunde blauschwarz, Innenfahne grauschwarz, Spitze grün, die übrigen Schwingen grün, alle Schwingen unterseits grünlichmeerblau; größte Deckfedern und Eckflügel orangeroth; Schwanzfedern dunkelolivengrün, unterseits bläulichgrün, Innenfahne beiderseits röthlichgelbgrün; Schnabel bräunlichhornweiß; Auge dunkelbraun; breite nackte Haut bläulichweiß; Füße und Krallen bräunlichhornweiß. Stark Finkengröße (Länge 19,6—20 cm; Flügel

Digitized by Google

$10_{/8}$—$11_{/8}$ cm; Schwanz $5_{/7}$—$6_{/8}$ cm). Heimat: Brasilien und Guiana. Die Reisenden Schomburgk, Natterer, Wallace u. A. beobachteten ihn in großen Schwärmen besonders in der Nähe der Küsten und in den Wäldern an den Flüssen. Er ernähre sich von den Blüten haidekrautartiger Bäume, niste in Astlöchern, das Gelege bestehe in 2—4 Eiern. Damit sind die Angaben über sein Freileben erschöpft.

Buffon, der ihn übrigens in drei verschiedenen Arten schildert, erzählt mancherlei wunderliche Dinge von ihm, doch sagt er auch, man könne diesen Sittich leicht erziehen, derselbe lerne sehr gut sprechen, habe eine Stimme wie der Hanswurst bei den Puppenspielern und plaudre ohne Aufhören. Obwol diese Art doch eine weite Verbreitung hat und in der Heimat noch in großen Schwärmen vorkommt, so gelangt sie auffallenderweise nur selten und in wenigen Köpfen zu uns. Ich erhielt drei Tuiparasittiche vom Händler Linz in Hamburg und kann berichten, daß dieselben sich viel mehr scheu und zurückhaltend zeigten, als Angehörige der vorher beschriebnen verwandten Art. Ein gellendes unangenehmes Geschrei ließen sie nur höchst selten erschallen. Sie haben weder bei mir, noch bei Herrn Karl Forster, der sie gleichfalls besaß, genistet, und auch nicht sprechen gelernt, doch wird die Abrichtung dazu zweifellos gelingen, wenn wir diesen Sittich erst zahlreicher und in jüngeren Vögeln bekommen. Preis noch 60 bis 75 M. für das Par.

Der Tirika-Schmalschnabelsittich

[Psittacus tirica, *Gml.*].

Blumenaufsittich, Tirikasittich, blos Tirika, blos Grassittich, blauflügeliger Schmalschnabelsittich. — All-green Parrakeet. — Perruche tirica. — Tirica Parkiet.

Der Tirikasittich war gleichfalls den alten Schriftstellern bekannt, denn er ist schon von Brisson (1760) beschrieben und

Digitized by Google

dann von Gmelin (1788) benannt. Die älteren Autoren geben freilich nichts Näheres über ihn an. Er erscheint an der Stirn hellgrasgrün; an der ganzen übrigen Oberseite dunkelgrasgrün; erste Schwingen längs der Schaftmitte dunkelblau, an der Innenfahne breit grauschwarz, die nächsten Schwingen an der Innenfahne abnehmend weniger grauschwarz, die übrigen einfarbig grün, alle unterseits düstergrün; Deckfedern der ersten Schwingen dunkelblau; Flügelrand gelbgrün; kleine unterseitige Flügeldecken grünlichgelb; die äußeren Schwanzfedern an der Innenfahne gelbgrün, alle unterseits schwärzlichgrün, Wangen und ganze Unterseite hell grasgrün; Schnabel röthlichfleischfarben, Spitze fast weiß; Wachshaut grauweiß; Auge braun; Füße bräunlichfleischfarben. Jugendkleid graulichgrün; Flügel fast rein grün; Flügeldeckfedern bräunlichgrün. Drosselgröße (Länge 26 cm; Flügel $10{,}_7 - 12{,}_4$ cm; Schwanz 10—$12{,}_6$ cm).

Seine Heimat erstreckt sich vom östlichen Brasilien bis Guiana. Die Reisenden Natterer, Prinz v. Wied, Schomburgk, Burmeister, Karl Euler und dann Karl Petermann haben über sein Freileben berichtet: Im Küstenwaldgebiet Brasiliens ist er gemein, aber er kommt in ganz Brasilien vor, und wo der Wald an Pflanzungen grenzt, sieht man nicht selten überaus vielköpfige Schwärme von verschiedenen Arten Keilschwanzsittichen und unter ihnen diese Schmalschnäbel. Jede Art hält sich in der Schar gesondert für sich. In dem gewaltigen Lärm, welchen alle zusammen verursachen, hört man die schrillen Rufe der Tirikasittiche noch besonders heraus. Des Schadens wegen, welchen sie am Mais und allerlei anderen Nutzgewächsen verursachen, verfolgte man sie früher eifrig mit Schußwaffen; auch sollen manche recht wohlschmeckend sein, doch sind sie als Wildbret im allgemeinen nicht sehr geschätzt. In neuerer Zeit bilden diese Vögel einen bedeutsamen Handelsgegenstand. Sie werden daher in mancherlei Weise gefangen. Bis vor kurzem und hier und da auch wol noch jetzt zeigten sie sich so harmlos, daß man in der Seite 352 angegebnen Weise einen ganzen

Digitized by Google

Schwarm überlisten konnte. Wo sie seitdem vorsichtiger geworden, fängt man sie an der Tränke in Schlagnetzen u. drgl.

Die erste großartige Einführung nach Deutschland geschah durch Herrn Wilhelm Schlüter, welcher mehrere hundert Pärchen an die Naturalienhandlung von H. Schlüter in Halle schickte, die dann meistens durch die Vogelhandlung von K. Gudera, damals in Leipzig, in den Handel gebracht wurden. Seitdem sind diese Schmalschnäbel alljährlich in mehr oder minder großer Anzahl nach Europa gelangt. Leider werden sie von der Heimat aus gewöhnlich unzweckmäßig verpflegt, nur mit zerstoßnem Mais und in Wasser aufgeweichtem Brot, welcher erstre in den Schmutz geworfen und welches letztre nicht selten sauer geworden, gefüttert; wenn sie trotzdem nach der anstrengenden Reise von der Kolonie Blumenau bis nach Rio de Janeiro und dann nach der Ueberfahrt bis Hamburg oder London lebend ankommen, so ist das doch ein Beweis dafür, daß sie zu den ausdauerndsten unter allen Papageien gehören. Dies ist in der That richtig, denn man hat sie bei uns auch bereits mehrfach im ungeheizten Raum überwintert.

Trotzdem der Tirikasittich aber in seiner Heimat als Käfigvogel geschätzt sein und vielfach zum Sprechen abgerichtet werden soll und obwol er sich so lebenskräftig zeigt, daß er in den zoologischen Gärten ein Jahrzehnt hindurch und darüber gut ausdauert, hat er sich bei uns doch keiner besondern Beliebtheit zu erfreuen, weil er eben zeitweise ein arger Schreier ist und weil er sich andrerseits der Züchtung bis jetzt noch nicht zugänglich erwiesen hat. Nach meiner Ueberzeugung aber würde es besonders vortheilhaft sein, wenn man mit ihm Züchtungsversuche — die zweifellos glücken müssen — unternehmen, dann die jungen Sittiche zähmen und zum Sprechen abrichten wollte. Mit dem fortschreitenden Unterricht würden sie das arge Geschrei sicherlich unterlassen und man könnte so die bis-

Digitized by Google

her ziemlich werthlose Vogelart in eine sehr werthvolle verwandeln. Der Preis, welcher 12—15 M. für das Par beträgt, geht nicht selten auf 10 M. und sogar auf 8 M. herunter, während der durchaus zahme und etwas sprechende Tirikasittich doch wol 30—45 M. werth sein würde.

Der Schmalschnabelsittich mit hochgelber Flügelbinde

[Psittacus xanthópterus, *Spx.*].

Gelbflügeliger Schmalschnabelsittich, Gelbflügelsittich, Goldflügelsittich, Kanarienvogelsittich, Kanarienflügelsittich, gelbflügeliger Grassittich. – Orange-winged Parrakeet, Canary-winged Parrakeet. — Perruche xanthoptère. — Oranjevleugel Parkiet.

Von Spix (1824) beschrieben und benannt, gehört diese Art also zu den erst in neuerer Zeit bekannt gewordenen. Sie ist am ganzen Körper grasgrün, oberseits dunkler, unterseits kaum heller; Schwingen an der Außenfahne bläulich, an der Innenfahne schwärzlichgrau, alle unterseits bläulichgrün; Eckflügel und die großen oberen Deckfedern hochgelb (eine breite gelbe Binde über den Flügel bildend); Schwanzfedern an der Innenfahne olivengrünlichgelb, unterseits an beiden Fahnen bläulichgrün; Schnabel bräunlichgrauweiß; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichhorngrau. Nahezu Drosselgröße (Länge 25 cm; Flügel $11_{,8}$ — $12_{,6}$ cm; Schwanz $9_{,6}$ — 10 cm). Heimat: wahrscheinlich ganz Brasilien; besonders häufig soll er im Gebiet des Amazonenstroms und in Bolivia sein, Bartlett fand ihn auch in Peru. Ueber sein Freileben ist nichts weiter bekannt, als daß er in der Lebensweise mit den verwandten Arten übereinstimme; Burmeister sah in der Umgebung von Neu-Freiburg täglich kleine Flüge.

Auch dieser Schmalschnabel wird in der Heimat vielfach gehalten und zeigt in der Gefangenschaft ganz dasselbe komische Wesen, welches ich bei den vorigen geschildert, aber er zeichnet sich vor ihnen durch besondre Liebenswürdigkeit aus und ich füge daher die Schilderung eines der hervorragendsten Kenner

Digitized by Google

und liebevollsten Pfleger fremdländischer Stubenvögel, des Herrn Dr. Luchs, Badearzt in Warmbrunn, hier an: „Mein gelbflügeliger Sittich ist ein ungemein zahmer, sanfter und liebenswürdiger Vogel. Er wurde gegen mich täglich zutraulicher und dreister, während er Fremden gegenüber schüchtern blieb. Setzte ich mich zum Frühstück, so begann er sogleich von seinem offenstehenden Käfig aus, eine umständliche Kletterreise an der ihm nahen Fenstergardine hinauf, über zwei Vogelkäfige hinweg, an der Gardine der andern Seite hinab, auf das daran stoßende Sofa, von dort wieder an der Tischdecke hinauf, um endlich nach der entgegengesetzten Seite zu mir heranzutrippeln und von Milch, eingeweichtem Zwieback, Zucker und dergleichen zu schmausen; wenn ich ihn nicht sogleich beachtete, zwickte er mich anfangs leiser, dann aber stärker in die Hand, abwechselnd mich anblickend, ob ich ihn nicht bald befriedigen werde. Hatte er sich genug gelabt, so ging es auf demselben Wege mit allen Hindernissen wieder zurück. Mancherlei drollige Liebenswürdigkeiten könnte ich von meinem trauten Schmalschnabel erzählen; in denselben würde sich freilich nichts zu Gunsten der psychischen Begabung der Papageien ergeben, überhaupt nichts, was nicht schon in höherm Grade bei vielen anderen Arten beobachtet worden; ich wünsche nur mit Nachdruck hervorzuheben, daß diese Art durchaus nicht zu den unbegabten, geistig niedrig stehenden gehört. Mein kleiner Gelbflügel sagte recht deutlich ‚Da, da Paperle!‘ Sein Geschrei war keineswegs arg und lästig, auch ließ er es nicht oft erschallen. Jedesmal, wenn ich zur Stube hereinkam, begrüßte er mich mit einem Ruf und ebenso wenn ich ihn mit ‚Paperle‘ anredete. Hatte er sich zur Nachtruhe zurechtgesetzt, so gab er mir, wenn ich herantrat und mit ihm sprach, durch leises Wispern und zuletzt mit einem nochmaligen Schrei Antwort.“ Die Züchtung dieser Art ist bis jetzt noch nicht geglückt. Ihrer

Digitized by Google

Seltenheit wegen steht der Preis ziemlich hoch, obwol der Vogel doch keineswegs zu den schönsten Sittichen gehört, sondern vielmehr recht schlicht gefärbt erscheint. Das Pärchen kostet meistens 60 M. und geht selten herunter bis auf 24 M.

Der Schmalschnabelsittich mit gelber und weißer Flügelbinde

[Psittacus virescens, *Gml.*].

Weißflügeliger Schmalschnabelsittich, Weißschwingensittich, Weißflügelsittich oder nur Weißflügel. — Yellow- and white-winged Parrakeet. — Perruche Chiriri, Perruche à ailes blanches. — Chiriri Parkiet.

Alle diese Schmalschnäbel erscheinen einander außerordentlich ähnlich und die Merkmale, an denen sie sich unterscheiden lassen, treten immer nur wenig auffallend hervor. Die Angehörigen der Gruppe mit gelbem Fleck an der Oberkehle kann man allerdings mit den anderen nicht leicht verwechseln, unter sich aber sind die einzelnen Arten doch fast völlig übereinstimmend; noch mehr ist dies bei den Arten der zweiten Gruppe der Fall, deren Kennzeichen nur in der verschiednen Flügelzeichnung sich ergeben. So ist der Weißflügelsittich neben dem Gelbflügelsittich nur daran zu erkennen, daß man im ausgebreiteten Flügel eine gelbe und eine weiße Binde zugleich erblickt. Der erstre wurde von Brisson (1760) beschrieben und von Gmelin (1788) wissenschaftlich benannt; er gehört also zu den seit älterer Zeit her bekannten Arten. Buffon macht schon Angaben über das Freileben und sagt sogar bereits, daß dieser kleine Sittich gut sprechen lerne.

Der Schmalschnabelsittich mit gelber und weißer Flügelbinde ist dunkelgrasgrün; Rücken olivengrünlich verwaschen; die ersten fünf Schwingen grün, längs der Schaftmitte bläulich, Innenfahne schwärzlich gesäumt; die vier letzten Schwingen erster Ordnung und die Schwingen zweiter Ordnung bis auf die drei letzten weiß,

Digitized by Google

auch an den Schäften; die größten oberen Flügeldecken schwefelgelb, mit weißen Innenfahnen; die nächsten Deckfedern ganz weiß; Eckflügel gelb; Schwanzfedern grün, Innenfahne gelblich; ganze untre Körperseite wenig heller als die obre, gelblichgrün; Schnabel weißlichhorngrau; Wachshaut weiß; Auge braun; Füße gelblichhorngrau. Größe nahezu die des vorigen (Länge 22,5 cm; Flügel 11,3 — 12 cm; Schwanz 8,2 cm).

Die Heimat erstreckt sich von Paraguay bis zum nördlichen Brasilien, und am Amazonenstrom soll er nicht selten sein. Azara berichtet, daß er in kleinen Flügen lebe, in Baumlöchern niste, das Gelege bestehe in 3—4 Eiern. Wallace sah ihn auf der Insel Mexikana an der Mündung des Amazonenflusses in Schwärmen von mehreren Hunderten. Trotzdem ist diese Art nachweislich erst seit dem Jahre 1862 lebend bei uns eingeführt worden und zählt bis jetzt zu den seltenen Erscheinungen im Vogelhandel. Dr. Finsch' Angabe, daß sie zu den Papageien gehöre, welche nicht sprachbegabt sind, ist wenigstens in einem Fall bereits widerlegt worden, denn Herr Kaufmann Hinz in Königsberg theilt mit, daß ein Weißflügel bei ihm deutlich ‚Papa' und ‚Polly' nachsprechen gelernt habe. Preis der Seltenheit wegen hoch, etwa 60 M. für das Pärchen.

* * *

Unter den farbenprächtigsten aller Papageien überhaupt stehen die **Plattschweifsittiche** [Platycercus, *Vgrs.*] hoch obenan. Erst in neuerer Zeit, etwa seit fünfzehn Jahren, werden sie in zahlreichen Arten und in bedeutender Kopfzahl nach Europa eingeführt. Hier fanden sie von Anfang an die bereitwilligste Aufnahme und man sieht sie theils in den Vogelstuben unter kleinen Schmuck- und Singvögeln, theils parweise in einzelnen Käfigen oder gesellschaftsweise in großen Volieren. Außer ihrer Schönheit und Anmuth bieten viele noch die Annehmlichkeit einer mehr oder minder leichten Züchtbarkeit und es liegt nicht fern, anzunehmen, daß sich alle Arten mit der Zeit als der Züchtung zugänglich erweisen werden. Zugleich

Digitized by Google

ergeben sie jedoch auch manche Uebelstände, mit denen die Liebhaberei schwer zu kämpfen hat; so z. B. die meistens nur zu hohen Preise und noch schlimmer die Hinfälligkeit, welche diese Vögel in manchmal förmlich räthselhafter Weise zeigen.

Ihre besonderen Merkmale bestehen in folgendem: Schnabel kurz, kräftig, fast immer höher als lang, abgerundet und mit stumpfem Zahnausschnitt, mit kurzer, meist stark zurückgebogner Spitze und sehr breiter Dillenkante; Nasenlöcher länglichrund, freiliegend in einer schmalen, vorn mit Härchen umgebnen Wachshaut; Zügel und Augenkreis befiedert; Flügel spitz und lang; Schwanz breit, stark abgestuft, jede Feder breit, an der Spitze zugerundet; Füße mittelstark; Zunge dick, fleischig, glatt, vorn abgestumpft, bei manchen am vordern Rand mit schwachen Einkerbungen; Gefieder weich, selten etwas hart, ohne Puderdaunen. Drossel- bis Krähengröße. Von den übrigen Langschwänzen oder Sittichen unterscheiden sie sich zunächst vornehmlich dadurch, daß sie lebhafter und beweglicher sind (nur manche der größten erscheinen schwerfällig), ferner daß sie hurtiger und geschickter auf dem Boden umherlaufen und gewandter fliegen, wenn auch nicht besser klettern. Im Gegensatz zu den Edelsittichen, Keilschwänzen, Dickschnabel- und Schmalschnabelsittichen sind sie viel mehr Erdvögel und suchen ihre hauptsächlich in Gräsersämereien bestehende Nahrung ziemlich rasch laufend auf dem Boden. Ihre Heimat erstreckt sich über Timor, Buru, Ceram, die östlichen Molukken, Neuguinea, Australien, Vandiemensland, die neuen Hebriden, Neukaledonien, Neuseeland, die Norfolk-, Aucklands- und einige Gruppen der Südseeinseln, Fidschi-, Freundschafts- und Gesellschaftsinseln; eine Art ist auch auf den Macquarie-Inseln, dem südlichsten Punkt, auf welchem überhaupt Papageien vorkommen, heimisch. Bis jetzt ist ihr Freileben im ganzen erst wenig erforscht, das Nest soll, wie bei anderen Papageien, in Baumhöhlungen, besonders den Astlöchern der Eukalypten, stehen und 4—8, ja bis 12 Eier enthalten und noch dazu sollen sie alljährlich mehrere Bruten hintereinander machen. Nach der Nistzeit schlagen sie sich gewöhnlich, jede Art besonders, selten mehrere vereinigt, zu großen Schwärmen zusammen, welche nahrungsuchend umherstreichen. Außer den Gräsersämereien sollen sie auch mancherlei Früchte, Blütensaft und Kerbthiere verzehren. Als Dämmerungsvögel sitzen sie tagsüber ziemlich ruhig da, sind aber frühmorgens und abends ungemein lebendig.

Digitized by Google

Manche Plattschweifsittiche sollen an Getreide u. a. Nutzgewächsen erheblichen Schaden verursachen und deshalb, sowie auch ihres wohlschmeckenden Wildbrets halber eifrig verfolgt werden; viel zahlreicher fängt man sie jedoch neuerdings an Quellen u. a. mit großen Netzen, um sie nach Europa auszuführen.

In der Gefangenschaft zeigen sie zunächst den bereits erwähnten Uebelstand, daß viele unmittelbar nach der Einführung überaus hinfällig sind und durch die geringste Veranlassung zugrunde gehen. Dies liegt indessen vor allem darin, daß auch sie (wie Seite 11 inbetreff der großen Papageien angegeben) bereits von den Aufkäufern und dann bei der Einführung bis zur Ankunft in Europa nur zu schlimm behandelt werden. Gelangen sie gesund und lebenskräftig zu uns, werden sie wie Seite 25 ff. vorgeschrieben eingewöhnt und verständnißvoll verpflegt, so gehören sie zu den lebenskräftigsten aller Stubenvögel. Ihre Liebhaber seien dringend darauf aufmerksam gemacht, daß sie jeden schroffen Uebergang sowol in der Fütterung als auch in allem übrigen durchaus zu vermeiden haben.

Man verabreiche den soeben angekauften Plattschweifsittichen anfangs also nur das Futter, welches man vorher vom Verkäufer erfragt hat. Dasselbe bestehe lediglich in Sämereien. Man wird in den Versandtkäfigen der frisch eingeführten Vögel meistens nur Kanariensamen oder nur Hanfsamen finden und selbst wenn man zu dem einen dieser Samen den andern ohne weitres hinzufügt, so kann das schon die Ursache zu einem Verlust werden. Erst nach wochenlanger Haltung und nachdem man sich von der vollen Gesundheit des Sittichs überzeugt hat, setze man in kleinen, allmälig zu vergrößernden Gaben die Sämereien hinzu, welche man als zuträglich erachtet, und zwar ist es gut, wenn man auch diese Papageien gleich den Edelsittichen und Keilschwänzen an recht mannigfaltiges Samenfutter gewöhnt. Vornehmlich gefährlich kann für die Plattschweife übrigens die Darreichung von Grünkraut werden; beim frisch angekommenen Vogel genügt eine Kleinigkeit, um ihn sogleich krank zu machen und selbst beim längst eingewöhnten, ja gezüchteten, wirkt es manchmal verderblich. Dennoch scheint das Grünkraut für sie Bedürfniß zu sein, denn sie fallen mit unglaublicher Begierde darüber her. Ich habe meine Plattschweifsittiche durch anfangs ganz geringe und dann allmälig vergrößerte Gabe von Doldenrieſche, Resedakraut oder Vogelmiere stets so gewöhnt, daß sie nachher soviel davon

Digitized by Google

erhalten durften, als sie fressen wollten. Alles andre Grünkraut, namentlich aber Salat, lasse man durchaus fort. Unbedingt zuträglich sind ihnen frische Baumreiser, besonders von Weiden. Als sonstige Zugaben biete man ihnen — ich muß es aber immer wiederholen, nur in ganz allmäliger Gewöhnung — Löffelbiskuit oder Eierbrot, frische oder getrocknete Ameisenpuppen, letztere auch wol im Morrübengemisch, doch eigentlich nur dann, wenn sie hecken wollen, schließlich auch etwas Obst, guten Apfel, süße Birne, Kirsche oder Weintraube und namentlich Vogelbeeren, doch mit Ausnahme der letzteren nur sehr wenig. Am allerzuträglichsten erachte ich auch für die Plattschweifsittiche, wie für alle Papageien überhaupt, die Getreide- und Gräsersamen in frischen Aehren, ‚in Milch stehend' oder auch ganz reif, am besten Hafer, Hirse, Kanariensamen; fortlassen wolle man aber dabei frischen Hanf. Bei solcher Vorsicht ergeben sich die Plattschweifsittiche als außerordentlich lebenskräftig, denn fast alle, selbst die zartesten Arten, haben sich dann für lange Zeit erhalten und sogar im ungeheizten Raum überwintern lassen.

An geistiger Begabung scheinen sie sämmtlich nicht besonders hoch zu stehen, wenigstens bleiben sie entschieden hinter den meisten Edelsittichen und Keilschwänzen zurück, dagegen haben sie auch nicht das schrille Geschrei derselben, während sie jedoch ebenfalls in ihrem Kreischen recht lästig werden können. Neuerdings hat man sodann bei mehreren Arten Sprachbegabung festgestellt — und dieselben müssen daher hier mitgezählt werden. Aber wenn die Plattschweife auch in allen Arten zum Sprechenlernen sich als fähig erweisen sollten, so wird doch keine einzige hervorragend sprachbegabt sein, sondern alle ohne Ausnahme werden es nur zum Nachplappern weniger Worte bringen. Immerhin ist es interessant, daß diese überaus farbenprächtigen Schmuck- und zugleich ergibigen Zuchtvögel auch sprechen lernen können und für die Züchter sowol, als auch für die Liebhaber liegt nun doch fragelos ein besondrer Anreiz darin, allerlei Plattschweifsittiche eifrig zu züchten und die erlangten Jungen dann als Sprecher auszubilden. Viele Arten kommen noch unverfärbt, also als offenbar junge Vögel in den Handel und alle diese werden sich zum Sprachunterricht ebenso gut eignen wie gezüchtete. Hier kann ich selbstverständlich nur die Arten schildern, aus denen bisher schon Sprecher festgestellt worden.

Digitized by Google

Der bunte Plattschweifsittich

[Psittacus eximius, *Shw.*].

Buntsittich, gemeiner Buntsittich, Rosella, Omnikolor, grünbürzeliger Plattschweifsittich, wunderlicherweise Allfarbsittich oder blos Allfarb. — Rose Hill Parrakeet, Rosella, Rosella Parrot. — Perruche omnicolore. — Groenstuit of Rose-Hill of Rosille Parkiet.

Der im Vogelhandel allbekannte und gemeine Buntsittich, meistens Rosella genannt, einer der farbenreichsten unter allen Papageien überhaupt, welcher sich bisher eigentlich nichts weniger als geistig hochbegabt gezeigt und trotz seiner grellen Farbenpracht nicht besonders beliebt war, hat sich neuerdings auch als sprachfähig gezeigt, und dadurch wird er zweifellos zu ungleich größrer Bedeutung, wenigstens für die Liebhaber sprechender Vögel, gelangen.

Bereits von Philipps und White (1789—90) entdeckt, ist er von Shaw (1812) beschrieben und wissenschaftlich benannt. Levaillant (1805) gab schon eine Abbildung von einem lebenden Buntsittich, welcher sich im Besitz der Madame Bonaparte befand. Die älteren Schriftsteller hielten ihn übrigens immer für das Weibchen des Pennantsittich. Er erscheint an der Stirn und dem ganzen Kopf nebst Gegend über und unter dem Auge scharlachroth; im Nacken eine breite orangegelbe Binde; Mantel und Oberrücken schwarz, jede Feder gelbgrün gesäumt; Bürzel und obere Schwanzdecken gelblichgrün; Schwingen schwarzbraun, an der Außenfahne dunkelblau, die letzten an der Außenfahne breit hellgrün gerandet; ober- und unterseitige Deckfedern nebst Flügelrand lilablau; am Unterarm ein großer schwarzer Fleck; die beiden mittelsten Schwanzfedern dunkelolivengrün, die übrigen Schwanzfedern an der Grundhälfte grün; äußerste seitliche Schwanzfedern grünlichblau mit weißer Spitze; Kehle und Brust scharlachroth; Bartfleck vom Unterschnabel beginnend, an der untern Kopfseite bis zum Ohr weiß; Unterbrust hochgelb; Brustseiten gelb, jede Feder mit schwärzlichem Mittelfleck; Bauchmitte und Hinterleib bläulichgrün; untere Schwanzdecken roth; Schnabel weißlichgelbgrau, Oberschnabel am Grunde

Digitized by Google

wenig dunkler horngrau; Auge dunkelbraun; Füße graubraun, Krallen schwärzlich. Weibchen übereinstimmend, doch der gelbe Nackenfleck kleiner; untre Bauchmitte und Hinterleib gelbgrün, nicht blaugrün. (Nach Angabe von Bargheer ist das Männchen reiner und kräftiger gefärbt; der hellgrüne Fleck rings um die Augen ist beim Weibchen größer und seitlich verlängert; letzterm fehlt der schwefelgelbe Fleck im Nacken, der durch die grünliche Färbung des Oberrückens ersetzt ist; das Weibchen ist auch schlanker und mehr rundköpfig, das Männchen starkleibig und dickköpfig). Jugendkleid fahler und düstrer; jede Feder nicht gelblich, sondern graugrün gesäumt; am Hinterkopf ein großer grauer, im Nacken ein gelber Fleck. Unter Krähengröße (Länge 35,5 cm; Flügel 14,8 — 17,2 cm; mittelste Schwanzfedern 16,4 — 17,9 cm; äußerste Schwanzfedern 8 — 8,9 cm).

Als seine Heimat ist Vandiemensland, Neusüdwales und Südaustralien festgestellt. Die Lebensweise ist von den Reisenden Caley, Gould, Rietmann u. A. nur soweit erforscht, als ich in der Uebersicht der Plattschweifsittiche im allgemeinen angegeben. Nach den Mittheilungen der Genannten kommt er nur in bestimmten abgegrenzten Strichen vor, am Hunter und auf Vandiemensland ist er sehr zahlreich. Er bevorzuge offene sandige Grasebenen mit Gebüsch und einzelnen großen Bäumen. Hier sehe man verschiedene bunte Sittiche, außer der Rosella auch noch Pennant- und Königssittiche, gemeinsam, doch meistens nur in kleinen Flügen an und auf den Wegen umherlaufen und, aufgescheucht, auf die Umzäunungen der Grundstücke fliegen; sie seien so wenig scheu, daß man sie fast mit einem Stock herunterschlagen könne. Die Nahrung der Buntsittiche bestehe hauptsächlich in Sämereien, doch auch in Insekten. Ihre Rufe seien nicht schrill und gellend, sondern angenehm pfeifend. Die Brutzeit falle in die Monate Oktober bis Januar und das Gelege bilde eine reichliche Anzahl von Eiern, bis zu elf, gewöhnlich aber fünf bis sechs Stück. Das Nest befinde sich in einer Baumhöhlung, welche manchmal sehr tief in den Stamm hinabführe, von dem geschickt kletternden Sittich aber

Digitized by Google

trotzdem benutzt werden könne. Da die Schwärme der Prachtsittiche in den reifenden Mais u. a. Nutzgewächse einfallen, und Schaden anrichten, da sie als Wildbret zugleich sehr schmackhaft sind, so wurden sie schon längst viel verfolgt und aus den bewohnten Gegenden sollen sie überall verdrängt sein. Neuerdings aber sind sie, wie ja die meisten Papageien überhaupt, zu einem bedeutsamen Handelsgegenstand geworden, und man fängt sie daher vornehmlich in großen Netzen lebend. Dies geschieht besonders, wenn sie zu Schwärmen vereinigt ihre Wanderflüge unternehmen. Dann erscheinen sie plötzlich mehr oder minder zahlreich in Gegenden, in denen sie sonst nicht vorhanden sind und je nach der Ergibigkeit des Fangs werden sie in größerer oder geringerer Kopfzahl nach Europa ausgeführt.

Im Gegensatz zu den verhältnißmäßig geringen Angaben über das Freileben dieser doch in ihrer Heimat recht gemeinen Art liegen erfreulicherweise eingehende Mittheilungen über das Gefangenleben vor. Alles was ich in der einleitenden Uebersicht (S. 364) in dieser Beziehung gesagt, gilt für den gemeinen Buntsittich hauptsächlich. Mit besonderm Nachdruck sei noch darauf hingewiesen, daß deselbe unser Klima im Freien vortrefflich erträgt und schon in vielen Fällen — zuerst bei Herrn Photograph Otto Wigand in Zeitz — gezeigt hat, daß er ohne Gefahr sogar in unserm Klima im Freien überwintert werden kann. Wigand hat ihn auch zuerst (i. J. 1871) gezüchtet.

Der Reisende Gould hebt hervor, daß die Rosella trotz ihrer sehr bunten Farben nicht imstande sei, ein dauerndes Interesse zu erregen, sie werde immer bald langweilig, und ich fürchte, daß auch ihre Züchtbarkeit ihr kaum besondern Werth verleihen wird; aber auch sie hat begeisterte Liebhaber gefunden und ich führe in folgendem die Schilderung eines solchen, des Herrn Musikmeister A. Bargheer in Basel an: „Ein Par Buntsittiche mögen

Digitized by Google

im Käfig still und langweilig erscheinen, schon weil sie zu scheu und furchtsam sind, um sich viel zu bewegen. Im größern Flugraum dagegen zeigen sie sich ungemein lebhaft und so anziehend und unterhaltend, daß man ihrem Treiben mit Vergnügen zusehen mag. Ihr Flug ist leicht und gewandt, ihre Bewegungen am Boden sind schnell und geschickt, obwol sie durch das Einwärts- und Uebereinandersetzen der Füße wie alle Papageien unbeholfen aussehen. Sie klettern auch hurtig, doch fliegen sie lieber und unternehmen oft anhaltende Flugübungen. Vor Grünkraut muß man sie, wenigstens in der ersten Zeit, sorgsam behüten; dagegen gab ich Weiden-, Erlen-, Buchen- und Obstbaumzweige, später Aehren von allen Getreidearten und Gräsern, zuletzt auch Vogelmiere und Salat (letztrer ist für die Plattschweifsittiche immer bedenklich). Im Herbst erhielten sie Ebereschen- und im Winter trockene Wachholderberen; alle anderen verschmähten sie; frische Sonnenblumenkerne nahmen sie sehr gern. Das Hauptfutter bestand natürlich in Sämereien: Kanariensamen, Hirse, Hanf, Hafer und Mais. Die Stimme des Buntsittichs ist wohltönend flötend. Das Männchen läßt einen kurzen, aber ziemlich mannigfaltigen Gesang, das Weibchen nur einen leisen sanften Lockton und hellen lauten Warnungsruf, welche beiden letzteren übrigens dem Männchen gleichfalls eigen sind, erschallen. Das letztre führt auch in aufrechter Haltung mit emporgesträubten Nacken- und Kopffedern und fächerartig ausgebreitetem Schwanz und unter ruckweisem Emporschnellen des Oberkörpers einen ungestümen Liebestanz aus, begleitet von hellen feurigen Tönen. Der erwachsene Buntsittich ist mit seinesgleichen u. a. Vögeln unverträglich." Herr Bargheer hat dann von zwei Pärchen alljährlich mehrere Bruten von je drei bis fünf Jungen gezüchtet, und zwar begannen die Sittiche immer in unseren Frühlingsmonaten zu nisten.

Digitized by Google

Gebe ich nun auch mit Freuden zu, daß der Buntsittich bei aufmerksamer und liebevoller Behandlung ein angenehmer Stubengenosse sein kann, so würde mich dies doch keineswegs dazu berechtigen, ihn hier mitzuzählen; aber bei Herrn Postsekretär Holtz in Leipzig hörte ich selber eine Rosella die Worte ‚Papa', ‚Mama', ‚Ella' u. a. plappern und in ihr sonderbares natürliches Geplauder verweben; auch sind über sprechende Buntsittiche schon mehrere Angaben, die ich jedoch nicht mehr anzuführen vermag, gemacht worden. Hierdurch gewinnt auch diese Art nun natürlich einen um so höhern Werth, als man die Aussicht hat, die gezüchteten jungen farbenprächtigen Vögel zugleich zu Sprechern auszubilden. Der Preis für den rohen Buntsittich beträgt etwa 20 bis 30 M., doch werden alle Plattschweifsittiche fast nur pärchenweise gekauft und das Par von diesem preist 45 bis 60 M., manchmal auch noch niedriger, bis 30 M. Zur Abrichtung würde man am vortheilhaftesten die freilich meistens erbärmlich aussehenden schwanzlosen, auch sonst entfederten und beschmutzten frisch eingeführten jungen Vögel noch im grauen unschönen Gefieder entnehmen.

Der blaßköpfige Plattschweifsittich

[Psittacus pallidiceps, *Vgrs.*].

Blaßköpfiger Buntsittich, blaßköpfige Rosella, blaue Rosella, Blaßkopf, Blaßkopfsittich. — Pale-headed Parrakeet, Mealy Rosella, Blue Rosella. — Perruche palliceps, Perruche à tête pâle, Perruche à tête blanchâtre, Perruche bleue et jaune. — Blauwe Rose-Hill Parkiet.

Gould sagt, daß dieser Sittich sich nicht allein in der Gefangenschaft vortrefflich erhalten lasse, sondern auch sehr zutraulich und sogar gelehrig sich zeige — und da er mit dem vorhergegangnen überaus nahe verwandt ist, so muß ich ihn hier unter den Sprechern mitzählen. Er wurde von Vigors (1825) beschrieben und wissenschaftlich benannt und in Lear's Werk

Digitized by Google

abgebildet. Das alte Männchen ist in folgender Weise gefärbt: Oberkopf, Gegend ums Auge nnd Ohr blaß strohgelb, hier und da eine einzelne Feder roth; Hinterkopf und breites Nackenband dunkler gelb, jede Feder schwärzlich gesäumt; Bartfleck vom Unterschnabel bis zur Kehle weiß; an jeder Wange ein blauer Fleck; Schultern und Mantelfedern schwarz, breit zitrongelb gesäumt; Bürzel und obere Schwanzdecken hellgrünlichblau, jede Feder schwärzlich gerandet; Schwingen schwärzlichblau, Außenfahne dunkelblau, am Ende fahlblau gerandet, Innenfahne schwarzbraun, die letzten Schwingen ganz schwarzbraun, nur an der Außenfahne fahlgrün gesäumt, Schwingen unterseits schwärzlichbraun, silberglänzend; Deckfedern der ersten Schwingen dunkelindigoblau; alle übrigen Deckfedern lilablau; Flügelrand und unterseitige Flügeldecken blau; die kleinsten Deckfedern längs des Unterarms braunschwarz, einen Schulterfleck bildend; die beiden mittelsten Schwanzfedern an der Spitze weiß, dann an der Außenfahne bläulich, im übrigen fahlgrün, die beiden nächsten Schwanzfedern gleichfalls mit weißer Spitze, Außenfahne meergrün, Innenfahne braunschwarz, auch die übrigen weiß gespitzt, an der Endhälfte hellblau, Grundhälfte zunehmend braunschwarz; Oberbrust fahl grünlichgelb, blau angehaucht; Unterbrust, Bauch und Hinterleib dunkler grünlichblau; an der ganzen Unterseite jede Feder fein schwärzlich quergestreift; untere Schwanzdecken roth; Schnabel weißlichhorngrau, am Grunde dunkler; Auge dunkelbraun; Füße dunkelgraubraun. Beim Weibchen soll der blaue Wangenfleck fehlen oder nur schwach hervortreten, der Kopf mit dunkelgelben, grauen und röthlichen Federchen bespritzt erscheinen. Im Jugendkleid ist der Kopf bräunlichroth, verfärbt sich dann grünlich- und zuletzt weißlichgelb. Größe bemerkbar geringer als die des vorigen (Länge $30_{,5}$ cm; Flügel $14_{,4}$—$14_{,9}$ cm; mittelste Schwanzfedern $13_{,6}$—$17_{,7}$ cm; äußerste Schwanzfedern $7_{,2}$—9 cm). Seine Heimat soll ein großer Theil Australiens, vornehmlich der Osten, sein. Ueber seine Lebensweise liegen bis jetzt garkeine Mittheilungen vor, doch dürfte er in derselben, sowie in jeder andern Hinsicht mit der vorigen, wie schon gesagt nah verwandten Art durchaus übereinstimmen. Nicht ganz so zahlreich wie jene lebend eingeführt, gehört er doch gleichfalls zu den gemeinsten Vögeln des Handels. Gezüchtet dürfte er zuerst von der Frau Prin-

Digitized by Google

zessin von Croy auf Schloß Roeulx in Belgien sein und dann ist dies noch vielfach geschehen. Die Jungen werden ungemein zahm, und man sollte sie wie die des vorigen zum Sprechen abzurichten versuchen. Preis 45 bis 60 M.

Der purpurrothe glänzende Plattschweifsittich

[Psittacus splendens, *Pl.*].

Purpursittich, glänzender Purpursittich. Glanzsittich, Fidschisittich, rother Pompadoursittich, purpurrother Plattschweifsittich. — Shining Parrakeet or Parrot, Fidji Parrakeet. — Perruche pourpre de Fidji, Perruche pourpre brillante. — Purperroode Fidji-Parkiet.

Wenn, wie Seite 362 gesagt, die Plattschweifsittiche überhaupt zu den farbenreichsten oder doch buntesten aller Papageien gehören, so zeichnen sich diese und die nächstfolgende Art noch dadurch aus, daß ihre Farben in besonders prächtigem Glanz förmlich erstrahlen. Dieser Schönheit und ihrer Seltenheit wegen zugleich haben sie außerordentlich hohe Preise und daher sind sie eigentlich der allgemeinen Liebhaberei nicht zugänglich; man findet sie nur bei den wohlhabendsten Vogelfreunden und als absonderliche Schmuck- und Schaustücke in den größten zoologischen Gärten.

Der Fidschisittich, wie er meistens genannt wird, ist an Ober- und Hinterkopf, Kopf- und Halsseiten purpurscharlachroth; Hinterhals mit breitem blauen Bande; ganze übrige Oberseite, Flügeldeckfedern, Bürzel und obere Schwanzdecken dunkelgrasgrün; erste Schwingen blau, Innenfahne schwarz gerandet, zweite Schwingen am Grunde der Außenfahne blau, am Ende grünblau, die letzten grün, alle an der Innenfahne schwarz gerandet, unterseits ganz schwarz; unterseitige Flügeldecken meerblau; Schwanzfedern blau, am Grunde der Außenfahne grün gerandet, die beiden mittelsten grün mit blauem Enddrittel; ganze Unterseite purpurscharlachroth; Schnabel bläulichschwarz, Spitze gelblich; Auge hellorangeroth; Füße schwarzbraun, Krallen schwarz. Krähengröße (Länge 43—45 cm; Flügel $18_{/7}$—23 cm; mittelste Schwanzfedern $18_{/5}$—$22_{/4}$ cm; äußerste

Digitized by Google

Schwanzfedern 11,8—13,4 cm). Heimat: die Fidschiinseln und zwar nur die kleine Viti-Gruppe, wo er auf einzelnen Inseln vorkommt.

Erst in neuerer Zeit, von Peale (1848), entdeckt, ist er dann von Layard und Gräffe beobachtet worden. Die Glanzsittiche fallen in den Mangrovewäldern nicht allein durch ihre Farben, sondern auch und zwar weniger angenehm, durch ihr lautes wie kaiau schallendes Geschrei auf. Ihren Aufenthalt bildet vornehmlich der Wald, sie haben einen schweren Flug, nisten in hohlen Bäumen, ernähren sich von Beren u. a. Früchten und Sämereien und bringen stellenweise an Mais u. drgl. Nutzgewächsen empfindlichen Schaden hervor. Während solcher Plünderung verhalten sie sich, durch Verfolgungen scheu und vorsichtig geworden, lautlos. Bei nahender Gefahr erhebt einer oder der andre einen warnenden Ruf und die ganze Schar fliegt schleunigst dem Walde zu, um sich in den dichten Kronen der höchsten Bäume zu verbergen. Wenn die Sittiche auch dort behelligt werden, eilen sie mit lautem Kreischen davon. Thut man aber, als wolle man vorübergehen, so lassen sie sich wol täuschen, sodaß man sich in Schußnähe heranschleichen kann. Nach Layard werden sie auf den Fidschiinseln seit undenklichen Zeiten in der Gefangenschaft gehalten und zwar für den Zweck, ihre Federn zu gewinnen und zum Schmuck zu benutzen. Aus den Nestern geraubt (eine solche Brut enthielt drei Junge), werden sie recht zahm, lassen sich unschwer zum freien Umherfliegen gewöhnen und kehren abends regelmäßig in den Käfig zurück.

Seit dem Jahr 1864 ist dieser Sittich mehrfach, jedoch immer nur einzeln oder höchstens parweise, bei uns lebend eingeführt worden; zur genannten Zeit gelangte er zuerst in den zoologischen Garten von London, dann in den Amsterdamer, Berliner, Hamburger u. a. Auch auf den Ausstellungen ist er hier und da erschienen; ferner befand er sich in den

Digitized by Google

Sammlungen der Herren Wiener, Rittner-Bos, Blaauw, Scheuba u. A. Die obengenannten Reisenden hatten schon berichtet, daß er sprachbegabt sei und ein prachtvoller Glanzsittich, welchen Fräulein Chr. Hagenbeck auf die „Ornis"-Ausstellung in Berlin (1880) brachte, ergab sich nicht allein als ungemein zahm, sondern auch als recht guter Sprecher. Rittner-Bos schildert diese Art als im Käfig plump und unbeholfen. „Angenehme Eigenschaften habe ich, ihr prachtvoll gefärbtes Gefieder ausgenommen, nicht an ihnen entdecken können, doch glaube ich, daß alle diese großen Sittiche freifliegend in einer geräumigen Vogelstube ein ganz andres Wesen entfalten würden". Bei Herrn Scheuba wurde ein Purpursittich ungemein zahm, sodaß er freiwillig auf die Hand kam; er legte im Lauf der Zeit mehrere Eier. Der Preis steht sehr hoch und beträgt 100 bis 200 M. für den frisch eingeführten, für den sprechenden Vogel 250 M. und sogar bis 600 M.

Der braunrothe, glänzende Plattschweifsittich

[Psittacus tabuënsis, *Gml.*].

Braunrother Plattschweifsittich, braunrother Pompadoursittich. — Marron Shining Parrot, Tabuan Parrakeet. — Perruche marron de Fidji, Perruche marron brillante, Perruche tabuane. — Bruinroode Parkiet.

Neben dem vorigen ist dieser an der dunkelpurpurbraunrothen Färbung und dem mehr oder minder ausgedehnten tiefbraunen bis schwarzen Fleck an der Oberkehle sogleich zu erkennen; andere angegebene Merkzeichen, besonders ein breites blaues Nackenband und der purpurn scheinende Bürzel, sind nicht zutreffend. Er ist an Kopf und Hals dunkel purpurbraunroth, jede Feder am Grunde grauschwarz, in der Mitte mit schmalem grünen Querstrich; Stirn, Gegend um den Schnabel und die Oberkehle fast bräunlichschwarz; schmales Band im Nacken blau; Hinterhals, Rücken, Schultern, Deckfedern, Bürzel und obere Schwanzdecken

Digitized by Google

dunkel gras-, fast smaragdgrün, am Bürzel mit purpurrothem Schein; erste Schwingen blau, an der Innenfahne schwärzlich, zweite Schwingen mattblau, an der Außenfahne grünlich, alle unterseits mattschwarz; Deckfedern und Eckflügel blau; unterseitige Flügeldecken grün, am Grunde schwarz; Schwanzfedern blau, Innenfahne breit schwärzlich gerandet, Außenfahne am Grunde grünlich, die beiden mittelsten Federn fast reingrün, alle Schwanzfedern unterseits matt schwarz; Schnabel schwarz mit hellerer Spitze; Auge orange- bis feuerroth; Füße und Krallen schwarz. Größe ein wenig bedeutender als die des vorigen (Länge 47—48,5 cm; Flügel 24,5—24,7 cm; mittelste Schwanzfedern 20,8—23,9 cm; äußerste Schwanzfedern 14,8 cm). Als seine Heimat sind gleichfalls die Fidschiinseln bekannt, wo er auch wie der Verwandte nur in bestimmten Oertlichkeiten zu finden sein soll. Gräffe sagt, er komme nur auf Eua vor, doch ist er auch auf Wanua Levu u. a. gefunden; genau festgestellt ist seine Verbreitung noch nicht. In der Lebensweise soll er dem purpurrothen Glanzsittich durchaus gleichen und alles inbetreff desselben Gesagte gilt also auch von diesem. Peale beobachtete ihn in den überschwemmten Niederungen auf Mangrovegebüsch, wo sich die Vögel am heißen Tage im Dickicht verborgen hielten und nur morgens und abends ihr wie vangha klingendes Geschrei erschallen ließen; im übrigen verhalten sie sich still. Im unregelmäßigen wellenförmigen Fluge breiten sie den Schwanz fächerförmig aus. Diese Art wurde bereits von Latham (1781) nach einem lebenden Vogel im Besitz der Frau King beschrieben und von Gmelin (1788) wissenschaftlich benannt. Er gelangte in den zoologischen Garten von London zuerst i. J. 1873 und wurde dort, wie auch im Hamburger Garten und gleicherweise von Herrn Karl Hagenbeck, welcher beide, den purpurrothen und den braunrothen glänzenden Plattschweifsittich, nebeneinander gehabt, mit Entschiedenheit als abweichend erkannt und zwar nicht allein in der Färbung, sondern auch im Lockruf und Geschrei. Die Aehnlichkeit ist indessen doch so groß, daß alles über den erstern

Digitized by Google

Mitgetheilte auch auf diesen zu beziehen ist und selbstverständlich ist er ebenfalls sprachbegabt. Die Preise sind gleich, allenfalls wird dieser noch etwas theurer als jener bezahlt.

Der schwarzmaskirte Plattschweifsittich

[Psittacus larvatus, *Rss.**)].

Maskensittich. — Masked Parrakeet. — Perruche à masque noire, Perroquet masqué, Coracopse noir. — Masker Parkiet.

Der stattlichste unter den Plattschweifsittichen ist leider fast noch seltner als die beiden vorigen und daher auch einer der kostbarsten von allen.

Er erscheint an Stirn, Vorderkopf, Gegend ums Auge und den Unterschnabel schwarz (das Gesicht wie mit einer Maske bedeckt); die ganze Oberseite ist dunkelgrasgrün; erste Schwingen blau, an der Innenfahne schwärzlich, zweite Schwingen grün, Innenfahne schwarz gerandet, alle Schwingen unterseits schwarz; alle oberen Flügeldecken und Eckflügel blau; größte unterseitige Flügeldecken schwarz; Schwanzfedern an der Innenfahne schwarz gerandet, unterseits ganz schwarz; Kehle, Seiten, Schenkel und untere Schwanzdecken grün; Vorderhals und Brust hochgelb; Vorderbauch dunkler gelb; Unterbauch orangegelb; Schnabel schwarz; Auge orangeroth; Füße und Krallen schwarz. Stark Krähengröße (Länge 46—48 cm; Flügel $21_{/5}$—$23_{/4}$ cm; mittelste Schwanzfedern $21_{/3}$—$23_{/4}$; äußerste Schwanzfedern $12_{/4}$—$14_{/6}$ cm).

Auch als seine Heimat sind die Fidschiinseln nachgewiesen (sodaß auf denselben also diese drei größten und schönsten aller Plattschweifsittiche zu finden sind) und auch er soll nur auf einigen dieser Inseln vorkommen. Gräffe berichtet, daß er Maskensittiche mit den rothen Glanzsittichen gemeinsam im Mangrovegebüsch der Sümpfe an den Flußufern gesehen, wo sie die sonst so thierarme Gegend angenehm belebten. Obwol

*) Da der Langflügelpapagei mit rother Maske die Bezeichnung Psittacus personatus, *Shw.* mit älterm Recht trägt, so mußte ich, um es zu vermeiden, daß zwei Vögel innerhalb einer Familie gleiche Namen haben, die Bezeichnung dieses Plattschweifsittichs (Platycercus personatus, *Gr.*) mit einer neuen vertauschen.

Digitized by Google

der Reisende aber Bälge und ebenso Eier an das Museum Godeffroy nach Hamburg gesandt, hat er weder über das Nisten, noch über die Lebensweise im allgemeinen näheres angegeben, und leider ist dies auch nicht von andrer Seite geschehen. Im Jahre 1848 hat G. R. Gray nach einem lebenden Vogel in einer Menagerie die Beschreibung gegeben, aber bis zu einem Bericht von Peale, der die Heimat zuerst festgestellt, waren die Ornithologen, so z. B. Schlegel, inbetreff dieser Art immer noch in Irrthümern befangen, indem sie dieselbe für das Weibchen oder Jugendkleid eines der beiden Glanzsittiche hielten. Leider liegen bis jetzt auch noch keine näheren Angaben über ihr Gefangenleben vor. Die zoologischen Gärten haben sie noch seltner aufzuweisen als die vorigen und so enthalten sie auch nur die allerbedeutendsten Privatsammlungen; die Herren Wiener, Scheuba und Baron Cornely auf Schloß Beaujardin bei Tours haben kurz berichtet, daß sie je einen Maskensittich besitzen. Im Vogelhaus des letztern erhielt er sich bei 7 bis 8 Grad C. vortrefflich. Ich habe ihn im Lauf der Zeit mehrmals in der Handelsmenagerie von Karl Hagenbeck und der Großhandlung von Fräulein Hagenbeck gesehen; in der letztern hörte ich einen laut und deutlich sprechen und dann erscheint solch' Vogel allerdings werthvoller als viele anderen. Preis 120 bis 180 M. für den frisch eingeführten.

Der rothstirnige neuseeländische Plattschweifsittich

[Psittacus Novae-Zeelandiae, *Sprrm.*].

Rothstirniger Neuseeländer-Sittich, rothstirniger Plattschweifsittich, Lauffittich, Ziegensittich, Kladderadatschsittich. — New-Zealand Parrakeet. — Perruche à front pourpre, Perruche de la Nouvelle Zélande. — Roodvoorhoofd New-Zealand Parkiet.

Der letzte Plattschweifsittich, welcher als Sprecher inbetracht kommt, zeigt sich sowol in der äußern Erscheinung, als

Digitized by Google

auch im ganzen Wesen abweichend von allen anderen. Er gehört zunächst zu den am schlichtesten gefärbten Papageien und fällt nur dadurch auf, daß von dem tiefen Grün des ganzen Körpers die kräftig rothe Zeichnung am Kopf sich angenehm abhebt; dann aber ist er (und gleicherweise sind es seine nächsten Verwandten) beweglicher, lebhafter und auch wol anmuthiger als fast alle übrigen Plattschweifsittiche.

Er erscheint an der Oberseite dunkelgrasgrün, an der Unterseite schwach heller gelblichgrün; Stirn, Vorderkopf, Zügel, ein schmaler Streif ober- und unterhalb des Auges und ein großer Fleck an der Ohrgegend scharlachroth (Augenbrauenstreif zuweilen grün); Schwingen schwarzbraun bis schwarz, Außenfahne mehr oder minder blau; Schwingen unterseits schwärzlichgrau, zuweilen mit gelblichweißer Querbinde; Deckfedern und Eckflügel blau; Bürzel an beiden Seiten roth, in der Mitte grün; Schwanzfedern dunkelgrün, an der Außenfahne bläulich, Innenfahne schwärzlich gesäumt; Schwanzfedern unterseits grünlich bis grauschwarz; Schnabel bleiblau, Spitze und Unterschnabel schwärzlich; Auge orangegelb; Füße schwärzlichbraungrau, Krallen schwarz. Jugendkleid ebenso, doch das Grün düstrer, das Roth zart und weniger umfangreich; Zügel und Augengegend fahl gelbgrün; Unterseite heller gelblichgrün; Schnabel heller blaugrau; Auge schwarz; Füße fast weiß. Von Drossel- bis zu Dohlengröße schwankend (Länge 24—34 cm; Flügel 11—14,6 cm; mittelste Schwanzfedern 11—17,6 cm; äußerste Schwanzfedern 5,4—9,6 cm). Seine Heimat erstreckt sich über Neuseeland, die Chatham-Insel, Aucklands-Inseln, Norfolk, Neukaledonien und Macquarie-Inseln, bis zum 55. Gr. südl. Br.; Dr. Finsch weist darauf hin, daß die Gegenden, welche er bewohnt Dänemark und Ostpreußen, etwa in der Höhe von Königsberg, entsprechen.

Bereits von Sparrmann (1787) beschrieben und wissenschaftlich benannt, hat er bis zur neuesten Zeit Anlaß zu vielen Verwechselungen gegeben, indem man nämlich hauptsächlich nach der verschiednen Größe und dann auch nach anderen geringen Abweichungen zahlreiche Arten aufstellte; alle solche

Digitized by Google

Abänderungen dürften indessen, wie von Finsch nachgewiesen, nur in der weiten Ausdehnung seiner Heimat begründet liegen und allenfalls als Lokalrassen anzusehen sein. Der genannte Gelehrte hat sie nach gründlichen Studien sämmtlich zu einer Art zusammengeworfen; und hier liegt erstrecht keine Veranlassung dazu vor, die letztre noch zu zersplittern.

Ueber die Lebensweise in der Freiheit sind bisher nur geringe Nachrichten vorhanden. In den Vorhölzern sehe man kleine Flüge bis zu zwölf Köpfen und wenn sie von den Fruchtbäumen oder vom Boden, auf dem sie flink und geschickt herumlaufen, aufgescheucht werden, so huschen sie im Zickzackflug den nächsten Hecken oder Bäumen zu, um hier unter lebhaftem Geplauder die Entfernung des Störenden abzuwarten. Ihr Lockton klingt wie twenty-eight und durch Nachahmung desselben lassen sie sich leicht herbeirufen. Im November und Dezember theilen sich die Schwärme in Pärchen. Das Nest steht in einer Baumhöhlung und das Gelege bilden etwa 5 Eier. Als ihre hauptsächlichste Nahrung dürfen die Früchte der neuseeländischen Theemyrthe gelten; aber auch in anderen Beren, Sämereien und zugleich in Insekten besteht dieselbe.

Der Reisende H. T. Potts berichtet, daß dieser Sittich auf Neuseeland bereits als beliebter Käfigvogel gelte und daß er im Nachsprechen von Worten sich gelehrig zeige. Für die Liebhaberei bei uns ergibt er beachtenswerthe Vorzüge, indem er in seiner schlichten Färbung doch hübsch und anmuthig erscheint, zugleich anspruchslos und ausdauernd ist, vor allem aber als unschwer züchtbar sich gezeigt hat. Zuerst bei Herrn Fiedler, dann in meiner Vogelstube, darauf auch bei zahlreichen anderen Züchtern hat er mit Erfolg genistet, je drei bis fünf Junge in mehreren Bruten hintereinander aufgebracht und sich als so fruchtbar ergeben, daß Herr de Laurier in Angoulême ihn für den ertragreichsten aller Papageien, welche

Digitized by Google

in der Gefangenschaft nisten, erklärt, denn ein Pärchen erzog bei ihm nicht weniger als 38 Junge in einem Jahr.

Des eigenthümlichen Meckerns wegen, welches das Weibchen hören läßt, benannte ich ihn anfangs Ziegensittich und dieser Name ist wunderlicherweise sogar in sog. wissenschaftliche Lehrbücher übergegangen. Nach dem seltsamen Ruf des Männchens hieß man ihn auch Kladderadatsch-Sittich. Er wird nicht oft in den Handel gebracht, dann aber gewöhnlich in erheblicher Anzahl. Gegenwärtig, im Herbst 1882, ist er nebst den verwandten Arten von Herrn A. H. Jamrach in London sehr zahlreich eingeführt. In unseren Vogelstuben ist er recht beliebt, dagegen ist seine Sprachbegabung bei uns leider noch nicht erforscht worden. Hoffentlich wird man demnächst die zahlreich gezüchteten oder auch eingeführten jungen Neuseeländer-Sittiche vornehmlich für diesen Zweck benutzen. Der Preis steht ziemlich hoch, 60—75 M. für das Pärchen und nur gelegentlich geht er bis auf 45 M. herunter. Der einzelne Sprecher wird sicherlich zwischen 60—100 M. preisen.

* * *

Das Geschlecht **Wellensittich** [Melopsittacus, *Gld.*], wörtlich also Singsittich, ist von vornherein dadurch von allen übrigen hierher gehörenden Papageien zu unterscheiden, daß die einzige dasselbe bildende Art beiweitem kleiner als alle anderen ist und nur etwa Sperlingsgröße hat. Ihre besonderen Kennzeichen sind folgende: Schnabel abgerundet, mit dünner, verlängerter, ausgebuchteter und mit zwei feinen Zahnausschnitten ausgestatteter Spitze des Oberschnabels; Nasenlöcher klein und rund, in breiter, wulstig aufgetriebener Wachshaut; Zügel- und Augenkreis befiedert; Flügel lang und spitz; Schwanz lang, keilförmig, die beiden mittelsten Federn weit hervorragend; Füße schlank und schwach; Zunge kurz, fleischig, vorn stumpf; Gefieder weich. Da es nur eine Art gibt, so werde ich alle übrigen Eigenthümlichkeiten bei dieser selbst schildern.

Digitized by Google

Der Wellensittich

[Psittacus undulatus, *Shw.*].

Wellenstreifiger Sittich, Wellenpapagei, Kanariensittich, Muschelsittich, Undulatus (früher Pepitapapagei; fälschlich auch Andulatus, Angulatus oder gar Andalusier); Dr. Finsch benannte ihn wellenstreifiger Singsittich. — Undulated Grass Parrakeet, Zebra Grass Parrakeet, Zebra Parrakeet, Shell or Scallop Parrot, Grass Parrakeet. — Perruche ondulée. — Grasparkiet.

In den in der Einleitung zu diesem Werk erwähnten Berührungspunkten zwischen Mensch und Thier im allgemeinen und dem erstern mit dem sprechenden Vogel im besondern liegt ja offenbar eine Fülle von Ueberraschungen für den Liebhaber und jeden Gebildeten überhaupt; kaum aber kann eine andre derselben auf einen weiten Kreis der Betheiligten so außerordentlich eingewirkt haben, wie die, welche der sprechende Wellensittich auf der „Ornis"-Ausstellung in Berlin i. J. 1880 hervorgerufen.

Die Nachricht vom sprachbegabten Kanarienvogel, welche schon lange vorher in die Oeffentlichkeit gedrungen, war nur zu vielfach auf Unglauben gestoßen, trotzdem sie von einer Seite ausgegangen, an deren Glaubwürdigkeit durchaus nicht gezweifelt werden durfte; man meinte dennoch, es sei garnicht anders möglich, als daß ein Irrthum vorliege. Hier nun aber stand der doch offenbar von Natur aus nicht höher begabte Wellensittich als Sprecher den Zweiflern leibhaftig vor Augen und die Tausende von Besuchern der Ausstellung konnten sich davon überzeugen, daß sie keiner Täuschung ausgesetzt seien.

Bekanntlich gehört der Wellensittich auf dem Vogelmarkt und in der Liebhaberei zu den neueren Erscheinungen. Erst von Shaw (1789—1813) beschrieben und wissenschaftlich benannt, wurde er von Wagler (1831) als Seltenheit im Museum der Linnean Society in London erwähnt; Gould gab die erste Schilderung seines Freilebens und dieser berühmte Naturforscher

Digitized by Google

brachte auch das erste lebende Pärchen Wellensittiche i. J. 1840 nach Europa mit. In dem kurzen Zeitraum aber von etwas über vier Jahrzehnten hat sich dieser kleinste der lebend eingeführten Papageien derartig bei uns verbreitet, daß er vom Palast bis zur Hütte allüberall zu finden und gleich dem goldgelben Hausfreund eingebürgert ist. Alljährlich in vielen Tausend Köpfen eingeführt, wird er zeitweise noch zahlreicher bei uns gezüchtet.

Als ein hübsch gefärbter Vogel in angenehm gelbgrünem, oberseits dunkel gewelltem Gefieder mit blauen Flecken an Wangen, Bart und Kehle, etwa von Sperlingsgröße, aber ungleich schlanker, zierlicher, spitzflügelig und mit langem, gestuftem Schwanz steht er vor uns und seine komisch-würdevolle Haltung gibt ihm ein allerliebstes Aussehen, während er immer lebhaft und beweglich kopfnickend hinundher läuft und so hübsch plaudert, daß man ihn um deswillen sogar Singsittich geheißen hat.

Er ist in folgender Weise gefärbt: Altes Männchen: Stirn und Oberkopf rein strohgelb; schmaler Stirnstreif, breiter Zügel und untre Wangengegend heller schwefelgelb; an der Wangenmitte einige verlängerte Federchen blau (blaue Flecke bildend); langer und breiter Bart gelb und in demselben gleichfalls jederseits einige aber dunkler blaue Flecke; Hinterkopf etwa von der Kopfmitte an, Kopfseiten, Hinterhals, Nacken, Schultern und der größte Theil der Flügeldecken lebhaft grünlichgelb, regelmäßig schwarz quergewellt (jede Feder mit vier feinen schwarzen Querlinien, an den Schulter- und Flügeldecken nur zwei, aber breitere und halbkreisförmige Linien); Hinterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken grasgrün, die letzteren mehr bläulichgrün; die ersten Schwingen und deren Deckfedern düstergrün, Außenfahne schmal gelb gesäumt, Innenfahne schwärzlich und an der Mitte mit breiten gelblichen Flecken (welche unterseits eine helle, vorn schmale, nach hinten zu breiter werdende Querbinde über den ganzen Flügel bilden), die zweiten Schwingen an der Außenfahne grün, fein gelb gerandet, am Grunde und in der Mitte gelb (der aufgeklappte Flügel zeigt also oberseits eine

Digitized by Google

gelbgrüne, unterseits eine gelblichweiße Querbinde), alle Schwingen unterseits dunkel aschgrau, die letzten Schwingen und deren Deckfedern, sowie die längsten Schulterdecken braunschwarz mit gelben Endsäumen; die beiden mittelsten und längsten Schwanzfedern dunkelblau, die übrigen mehr grünblau mit breitem gelben Mittelfleck über beide Fahnen und breitem schwarzen Saum am Grunde der Innenfahne (der Schwanz hat an der Außen- und Innenfahne zwei breite schräg laufende schwärzlichgrüne und eine gleiche spitzwinkelige schwefelgelbe Binde); ganze Unterseite vom Schnabelgrund an gelblichgrasgrün; Schnabel grünlichhorngrau; Wachshaut dunkelblau, mehr oder minder glänzend; Auge perlweiß bis blaßgelb mit großer schwarzer Iris, breiter Augenrand bläulich; Füße bläulichhornfarben (bei den hier gezüchteten weiß), Krallen schwärzlich. — Weibchen: übereinstimmend, allein die blauen Wangen- und Bartflecke ein wenig kleiner; Hauptkennzeichen aber: die Wachshaut ist grünlich-, gelblich-, bis bräunlichgrau. — Jugendkleid: an Stirn, Oberkopf und Brustseiten ebenfalls, aber fahl dunkel quergewellt; die gesammte Färbung fahler, das Gelb und Grün matter; Schnabel beim Nestverlassen schwarz (färbt sich von der zweiten Woche an allmälig heller grüngrau); Wachshaut fleischfarben bis bläulichweiß. Länge 21—26 cm; Breite der ausgespannten Flügel 26 cm; Flügel 9—$9_{,6}$ cm; mittelste Schwanzfedern 8—$9_{,3}$ cm; äußerste Schwanzfedern $3_{,3}$ cm.

Die Heimat dürfte sich über das ganze Festland von Australien erstrecken und zwar ist dieser Sittich nicht allein weit verbreitet, sondern auch stellenweise sehr zahlreich. Seine Lebensweise wird mit der Seite 363 geschilderten der Plattschweifsittiche zweifellos übereinstimmen. Gould hebt besonders die Regelmäßigkeit hervor, welche diese Vögel in allen ihren Verrichtungen zeigen; die Schwärme fliegen zur bestimmten Zeit des Morgens ab, um Futter zu suchen; kehren ebenso heim, eilen gleicherweise früh und abends zur Tränke; am heißen Tage sitzen sie regungslos in den dichten Kronen der Bäume. Auch während der Nistzeit leben sie gesellig und in den natürlichen Höhlungen der Mallee- und Gummibäume wohnen viele Pärchen nebeneinander und ebenso brüten ihrer zuweilen zwei

Digitized by Google

oder mehrere beisammen. Das Gehege soll in drei bis vier Eiern bestehen. Ob nur eine Brut oder wie in der Gefangenschaft mehrere hintereinander gemacht werden, ist nicht gesagt, doch läßt sich mit Bestimmtheit das letzre annehmen. Nach beendeter Nistzeit schlagen sie sich schwarmweise zu zwanzig bis hundert Köpfen zusammen und diese sammeln sich dann wol plötzlich zu ungeheuren Schwärmen an, welche in trockenen Jahren mehr oder minder weite Wanderungen unternehmen und dann, von der Dürre aus ihren Nistbezirken vertrieben, in wasserreichen Landstrichen wol plötzlich erscheinen. Unter ihnen sieht man manchmal auch kleinere Scharen von Schönsittichen, Plattschweifsittichen u. a. in verschiedenen Arten. Wo sie unverfolgt sind, erscheinen sie ungemein harmlos, sodaß der Jäger sie unschwer in großer Anzahl erlegen kann. Alle ihre Bewegungen sind gewandt und hurtig; der Flug ist reißend schnell; ebenso klettern oder vielmehr schlüpfen sie geschickt im Gezweige und gleicherweise laufen sie auf dem Erdboden umher. Ihre Nahrung besteht vornehmlich in Gräser-Sämereien. In den Getreidefeldern, welche sie auch aufsuchen, sollen sie nur geringen Schaden verursachen. Dagegen gewähren sie eine bedeutende Ausbeute, denn sie werden nicht selten in ganzen Schwärmen vermittelst großer Netze eingefangen, für den Zweck der Ausfuhr nach Europa. Einen Hauptplatz solchen Fangs von Wellensittichen und zugleich von verschiedenen Plattschweifsittichen sollen der Alexandrina- und Wellington-See, beide vom Murray durchströmt, in ihren Umgebungen bieten, wo sich alljährlich zahlreiche Vogelsteller einfinden, um allerlei schöne Papageien, hauptsächlich aber Wellensittiche, massenhaft zu fangen.

Wenn die Aufkäufer an Ort und Stelle erklärlicherweise auch nur eine äußerst geringe Summe, etwa 25, 30, 40 bis höchstens 50 Cent für den Kopf zahlen, so läßt sich doch denken,

Digitized by Google

daß bei der großen Anzahl für dortige Verhältnisse beträchtliche Summen herauskommen. Man kann die Anzahl der alljährlich lebend nach Europa eingeführten Wellensittiche auf etwa 2 000 bis 12 000 Köpfe und noch weit darüber schätzen.

Als Stubenvogel hat der Wellensittich eine außerordentlich hohe Bedeutung vor allem dadurch gewonnen, daß er sich der Züchtung in solchem Maße zugänglich, zeigt wie außer dem Kanarienvogel bis jetzt kein andrer. Man züchtet ihn zum Vergnügen und für den Ertrag in gleich eifriger Weise, denn die Liebhaberei für ihn verbreitet sich immer weiter und die gezüchteten jungen Wellensittiche sind zeitweise sehr vortheilhaft abzusetzen. Wenn freilich in den Frühlings- und Frühsommermonaten viele Tausend Pärchen zugleich auf den großen australischen Schiffen anlangen, so fallen die Preise bis auf 8 M., selbst 5 M. für das Pärchen und noch darunter, doch halten sie sich so niedrig immer nicht lange, sondern nach wenigen Monaten heben sie sich meistens schon wieder auf die Durchschnittshöhe von 10 M., 15 M. und selbst 20 M. für gute Heckvögel. In meinem kleinen Buch „Der Wellensittich" sind Rathschläge für Einkauf, Verpflegung, Züchtung und Verwerthung der Wellensittiche ausführlich gegeben. Im übrigen sei hier noch bemerkt, daß die Fütterung ganz mit der Seite 364 für die Plattschweifsittiche vorgeschriebnen übereinstimmt. Den einzelnen Vogel versorgt man am zuträglichsten nur mit Kanariensamen, ungeschälter Hirse und rohem Hafer, nebst Zugabe von etwas Grünkraut und Getreide- und Gräserähren.

Während der Kanarienvogel für seine volle Einbürgerung bei uns eines verhältnißmäßig langen Zeitraums bedurfte — wir vermögen freilich nicht mit Bestimmtheit festzustellen, wann die Verwandlung von dem grüngrauen Kleide des Wildlings zum hellgelben des Kulturvogels stattgefunden und ob

Digitized by Google

dazu wirklich mehrere Jahrhunderte erforderlich gewesen — so zeigt sich der Wellensittich den Einflüssen der Züchtung in ungleich höherm Maße zugänglich. Kein halbes Jahrhundert hat es gedauert, um ihn nicht allein in verschiedenen Farbenspielarten, sondern auch als Sprecher vor uns erscheinen zu lassen. Wir züchteten außer der ursprünglichen Art zunächst eine gelbgrüne, ferner eine reingelbe und bald auch eine weiße Spielart, die beiden letzteren mit rothen Augen, und dann sogar eine blaue Varietät. Als für die Einwirkungen der menschlichen Züchtung so bald empfänglich wie er, hat sich wol noch niemals ein andrer Vogel ergeben.

Gehen wir nun auf den Vorzug des Wellensittichs näher ein, in welchem sein Werth für die Leser dieses Werks im besondern begründet liegt, betrachten wir ihn also in seinen Leistungen als Sprecher!

Von vornherein dürfte man eigentlich garnicht so sehr darüber staunen, daß der Wellensittich als solcher sich erwiesen, denn er zählt ja zur Familie der Papageien, mithin zu den Vögeln, die, wie in diesem Buch genugsam erörtert worden, in vielfacher Hinsicht hoch über anderen stehen. Bedenken wir nun aber, daß der Wellensittich, wenn auch noch keineswegs zu den allerkleinsten Papageien gehörend, doch einer der winzigsten unter den lebend eingeführten ist und daß er sowol im Aeußern, als auch in seinem allerliebst komischen Wesen, seinen hurtigen Bewegungen u. s. w. doch garnicht den Eindruck eines außerordentlich hochbegabten Vogels macht, so werden wir billigerweise über seine noch dazu recht bedeutende Sprachbegabung uns wundern dürfen.

Zuerst und zwar i. J. 1877 berichtete Fräulein Eugenie Maier in Stuttgart über einen solchen Sprecher. Der noch ganz junge und unverfärbte Wellensittich eignete sich zuerst aus dem Gesange eines Sonnenvogels einige schöne Töne an. „Er

Digitized by Google

wurde sehr zahm und kam auf einen Ruf mir sogleich auf die Schulter oder Hand geflogen. Dann lernte er von einem Pärchen Zebrafinken deren Trompetentöne und vergaß den Ruf des Sonnenvogels. Ich schaffte die Zebrafinken daher fort, sodaß ‚Misse', wie ich ihn nannte, mit keinem andern Vogel in Berührung kam und bald unterließ er auch das Trompeten. Wie groß war aber meine Verwundrung und Freude, als er mich eines Tags mit den Worten ‚Liebe kleine Misse, komm, komm' überraschte, die er anfangs schüchtern aussprach, bald jedoch laut und deutlich. Mit denselben hatte ich ihn morgens immer begrüßt, ganz ohne die Absicht, sie ihn sprechen zu lehren. Nicht lange, so begann er auch noch: ‚O, Du liebe kleine Misse, lieb' klein' Herz, komm', gib mir 'nen Kuß'. Allerliebst ist es anzusehen und anzuhören, wenn er mit meinem Finger spielt, denselben küßt, besingt, zu ätzen sucht; er fliegt fort, kehrt zurück und wiederholt dieses Spiel unzähligemal, wobei er fortwährend die erwähnten Worte plaudert."

Einen zweiten redenden Wellensittich schilderte Herr Wilhelm Bauer in Tübingen: „Wenn man ruft Hansele komm, so fliegt er sogleich herbei, setzt sich auf die Schulter oder einen Finger und beginnt zu plaudern. Am deutlichsten sagt er: ‚Hansele, wo bist Du, bist Du?' und dann antwortet er selber: ‚Da bin ich', dann fragt er weiter ‚bist Du lieb?' und sehr hübsch, ‚bist e' lieb's Zuckerle' oder auch ‚Zuckerhansele' und ‚schönes Bubele' oder ‚Bule'. Wenn man ihm etwas vorsingt, so singt er mit, gleichfalls lacht er und hustet er mit, besonders gern will er ‚Kussele' haben, er legt sein Schnäbelchen auf die Lippen und schmatzt eifrig mit. Dabei sieht er beständig nach den Augen, ob dieselben auch freundlich blicken. Wenn er geküßt sein will, so mahnt er ‚komm', e' Kussele' oder ‚Bussele'. Selbstverständlich ist er daran ge-

Digitized by Google

wöhnt, daß man sich viel mit ihm unterhält, lacht und spricht; andernfalls spielt er auch selber mit einem Garnknäul oder einem Stückchen Semmel. Wird er des Morgens nicht bald aus dem Käfig freigelassen, so weint und jammert er in wirklichen Klagetönen. Auch abends bei Licht spricht er, und wird er müde, so singt und wiegt er sich immer leiser pfeifend in den Schlaf. Seine Naturlaute scheint er ganz abgelegt zu haben." Beiläufig sei erzählt, daß dieser Wellensittich es war, welchen Herr Bauer zur Vogelausstellung nach Berlin geschickt, der hier mit einer silbernen Medaille prämirt und dann für 150 M. verkauft wurde.

Wiederum eine derartige Schilderung liegt seitens des Herrn K. v. Scheidt in Koblenz vor. Der betreffende Wellensittich befand sich beim Schneidermeister Schmitz in der Werkstätte mit einem Kanarienvogel zusammen und überraschte die Arbeiter, welche sich viel mit ihm beschäftigten, eines Tags mit den leise gesprochenen Worten ‚Jakob, gehst Du her, Dickkopf, Spitzbube!' Die Leute trauten ihren Ohren nicht, Einer bestätigte, ein andrer bestritt, daß der Vogel gesprochen, dann aber hörten sie ihn bald ganz laut und vernehmlich reden. Ferner lernte er mit der Zunge schnalzen, langgezogen flöten, sodann küßte er, nahm seinem Herrn und dessen Tochter Futter aus dem Mund, wußte seine Umgebung ganz genau zu unterscheiden und folgte dem Fräulein auf den Ruf. Das natürliche Kreischen der Wellensittiche ließ er niemals mehr erschallen, sondern nur ein durchaus nicht unangenehmes Zwitschern.

Herr Dr. Lazarus erzählt von seinem Wellensittich ‚Mignon', welcher ungemein zahm geworden und beim freien Umherfliegen im Zimmer auf den Ruf folgte und auf die Hand kam, daß er seinen Namen überaus deutlich und mit sanftem Ton aussprechen lernte. Der Vogel war unendlich liebenswürdig.

Digitized by Google

Den letzten Bericht von einem sprechenden Wellensittich, welcher bis jetzt vorliegt, hat Herr A. Brandt in Frauenburg gegeben: „Ein aus dem Nest genommenes, noch kaum befiedertes Wellensittich-Männchen wurde schon nach einigen Tagen auffallend zahm und da der Besitzer sehr viel Zeit übrig hatte, sich mit ihm zu beschäftigen, so lernte es bald einige, im Lauf von 1½ Jahren aber etwa fünfzig Worte und ganze Sätze deutlich aussprechen. Der Vogel ist so gelehrig, daß er täglich noch Neues dazu annimmt.“ Da der Genannte alle Liebhaber einladet, seinen Wellensittich anzusehen und zu hören, so können wir an der außerordentlichen Begabung dieses kleinen Sprechers doch keinenfalls zweifeln. Allerdings dürfte derselbe bis dahin noch von keinem andern seiner Art erreicht sein.

Nach den angeführten Beispielen sehen wir nun aber den Wellensittich auch für die Zukunft noch in einer viel weitern, ungleich höhern Bedeutung vor uns, denn unter allen sprechenden Papageien überhaupt ist er doch von vornherein einer der anspruchslosesten, lieblichsten und zugleich am leichtesten zugänglichen.

Digitized by Google

Register.

A.

Abrichtung 15. 49. 58 ff.
Abzehrung 85.
Alecto Cockatoo 233.
Alexanderpapagei 300.
Alexanderpapageien s. Alexandersittiche.
Alexanderparkiet, Groote 305; — A., Java 309; A., Kleene 300; A., Latham's 312.
Alexander Parrakeet, Great 305.
Alexandrine Parrakeet, Black-billed 313; A. P., Great 305; A. P., Long-tailed 315; A. P., Mauritius 304; A. P., Ring-necked 300; A. P., Rose-breasted 312.
Alexandersittich 305. 309; A., großer 44. 305; A., kleiner 300; A., langschwänziger 315; A., mit rosenrother Brust, schwarzschnäbeliger 313; A., rosenbrüstiger, Latham's 312; A., rosenbrüstiger, mit schwarzem Schnabel 313; A., rosenbrüstiger, von Java 300; A., von Java 309. — Alexandersittiche 278. 299; A., rosenbrüstige 309.
Allfarb 366; Allfarblori 269; Allfarbsittich 366.
Allgemeines 1.
Alter 66.
Amazon, Blue-faced 148; A., Blue-fronted 132; A., Double-fronted 135; A., Imperial 150; A., Single Yellow-headed 141.
Amazon Parrot 132; A. P., Active 162; A. P., August 150; A. P., Blue-cheeked 172; A. P., Blue-faced 149; A. P., Bodinus' 153; A. P., Bouquet's 148; A. P., Diademed 170; A. P., Dufresne's 171; A. P., Festive 152; A. P., Finsch' 168; A. P., Golden-naped 144; A. P., Green-cheeked 167; A. P., Guatemalan 146; A. P., Guilding's 150; A. P., Hagenbeck's 140; A. P., Levaillant's 135; A. P., Mealy 143; A. P., Mercenary 147; A. P., Natterer's 145; A. P., Orange-winged 134; A. P., Panaman 139; A. P., Prêtre's 162; A. P., Red-fronted 155; A. P., Red-masked 163; A. P., Red-tailed 165; A. P., Red-throated 158; A. P., Sallé's 154; A. P., Vinaceous 166; A. P., White-browed 159; A. P., White-fronted 156; A. P., Yellow-bellied 151; A. P., Yellow-cheeked 169; A. P., Yellow-fronted 137; A. P., Yellow-lored 161; A. P., Yellow-shouldered 141.
Amazone 132; A., blaubärtige 152; A., Blaukappen- 168; A., blaustirnige 132; A., blau- und gelbköpfige 132; A., Blauwangen- 172; A., Bodinus' 153; A., Brillen- 159; A., Diadem- 169. 170; A., St. Domingo- 154; A., Dufresne's 131. 171; A., Gelbflügel- 141; A., gelbköpfige große 64. 131. 135; A., gelbköpfige kleine 131; A., Gelbnacken- 144; A., gelbnackige 131. 144; A., Gelbscheitel- 137; A., Gelbwangen- 169; A., gelbwangige 169; A., Gelbzügel- 161; A., gemeine 129. 131. 132. 134; A., gewöhnliche 132; A., Goldbauch- 151; A., Goldmasken- 171; A., Goldnacken- 144; A., Granada- 171; A., grüne 145; A., Grünwangen- 167. 168; A., Guatemala- 127. 146; A., Guilding's 150; A., Hagenbeck's 129; A., Herbst- 169; A., Jamaika- 158; A., Kaiser- 150; A., Königs- 150; A., Kuba- 156; A., Kuba-, rothbalsige 156; A., mit gelbem Daumenrand 147; A., mit lilafarbnem Scheitel 170; A., Müller- 63. 131. 143; A., Natterer's 145; A., Portorico- 155; A., Portorico-, rothstirnige 155; A., Portorico-, weißstirnige 154; A., Pracht- 162; A., Rothbug- 63. 131. 132; A., Rothmasken- 163; A., rothmaskirte 163; A., rothrückige 131. 152;

A., Rothschwanz- 165; A., rothschwänzige 129. 165; A., Rothspiegel- 162; A., Rothstirn- 153; A., rothstirnige 131; A., Sallé's 131. 154; A., scharlachstirnige 167; A., Soldaten- 147; A., Surinam- 131. 137; A., Taubenhals- 131. 166; A., St. Vinzent- 150; A., Venezuela- 129. 131. 132. 134; A., weinrothe 131. 166; A., weißköpfige 158; A., weißköpfige mit rothem Bauchfleck 131. 156; A., weißköpfige ohne rothen Bauchfleck 131. 158; A., Weißstirn- 150; A., weißstirnige 131. 150.

Amazone à bec couleur de sang 166; A. à ventre jaune 151.

Amazone Papegaai, Blauwkeel 152; A. P., Blauwmasker 149; A. P., Blauwwang 173; A. P., Bodinus' 153; A. P., Bouquet's 148; A. P., Bruinstaart 150; A. P., Cuba 156; A. P., Dufresne's 171; A. P., Finsch' 168; A. P., Geelbuik 151; A. P., Geeloor 161; A. P., Geelwang 169; A. P., Gewone 132; A. P., Goudnek 144; A. P., Groenboeg 134; A. P., Groenwang 167; A. P., Guatemala 146; A. P., Guilding's 150; A. P., Hagenbeck's 140; A. P., Havana 156; A. P., Kroonen 170; A. P., Müller 143; A. P., Natterer's 145; A. P., Panama 139; A. P., Prêtre's 162; A. P., Roodbek 166; A. P. Roodmasker 163; A. P., Roodstaart 165; A. P., Roodvleugel 162; A. P., Roodvoorhoofd 155; A. P., Sallé's 154; A. P., Witkop 158; A. P., Witvoorhoofd 159.

Amazonen = Amazonenpapageien.

Amazonenpapagei 132. 134; **A., brapunderter** 63. 131. **143**; **A., blaukehliger** 131. **152**; **A., blaumaskirter** 149; **A., blauscheitel-** 146; **A., blauwangiger** 172; **A., Bodinus'** 153; **A., Bouquet's** 148; **A., braunschwänziger** 150; **A., Diadem-** 170; **A., Dufresne's** 171; **A., Finsch'** 168; **A., gelbbäuchiger** 151; **A., gelbflügeliger** 141; **A., gelbköpfiger, großer** 64. 131. **135**; **A., gelbnackiger** 131. **144**; **A., gelbscheiteliger** 131. **137**; **A., gelbschulteriger** 131. **141**; **A., gelbwangiger** 169; **A., Goldnacken-** 144; **A., graunackiger** 148; **A., Guatemala-** 127. **146**; **A., Gnilding's** 150; **A., Hagenbeck's** 129. 140; **A., Jamaika-** 158; **A., Levaillant's** 135; **A., mit gelbem Daumenrand** 147; **A., mit grünem Flügelbug** 129. 131. 132. **134**; **A., mit milchweißer Stirn** 143; **A., mit rothem Flügelbug** 63. 129. 131. **132**; **A., mit rothen Flügeldecken** 162; **A., Natterer's** 145; **A., Panama-** 139; **A., Prêtre's** 162; **A., Rothbug-** 132; **A., rothmaskirter** **163**; **A., rothrückiger** 152; **A., rothschwänziger** 129. **165**; **A., rothstirniger** 131. **155**; **A., Sallé's** 154; **A., scharlachstirniger** 167; **A., weinrother** 131. **166**; **A., weißköpfiger** 143; **A., weißköpfiger mit rothem Bauchfleck** 131. **156**; **A., weißköpfiger ohne rothen Bauchfleck** 131. **158**; **A., weißstirniger** 131. **159**; **A., weißstirniger mit gelbem Zügel- und Kopfstreif** 161; **A., weißstirniger, mit schmalem rothen Augenring** 160. — **Amazonenpapageien** 6. 14. 29. 44. 48. 65. 66. 101. 126. 127. 199. 200. 278.

Amakan 289.

Andalusier 381.

Andulatus 381.

Anfälle, epileptische 88.

Angulatus 381.

Anstrich mit Lack 34; A. mit farblosem Lack 34.

Ara à collier d'or 292; A. à front châtain 289; A. à joues rouges 291; A. à lunettes 295; A. à ventre rouge 289; A. aux ailes vertes 285; A. bleu 287; A. bleu de Lear 280; A. bleu de Spix 281; A. bleuâtre 280; A. caninde 288; A. chloroptère 285; A. d'Illiger 291; A. grisbleu 280; A. hyacinthine 279; A. macao 283; A. Maximilien 293; A. militaire 281; A. noble 293; A. pavouane 293; A. rouge 283; A. rouge de Lafresnaye 281; A. tricolore 286; A. vert 289; A. vert, Petit 293.

Ara, Blauwe, Lear's 280; A, Blauwe, Spix' 281; A., Blauwgeele 287; A., Blauwneus 293; A., Caninde 288; A., Driekleur 286; A., Geelvleugel, Groote 283; A., Goudkraagen 292; A., Groenblauwe 280; A., Groenvleugel, Groote 285; A., Groene Roodvoorhoofd 281; A., Illiger's 291; A., Maximilian's 279; A., Roodbuik 289; A., Roodhand 289; A., Roode, Lafresnaye's 281.

Ara Kakketoe 233.

Arakanga 283.

Arara, Blau- 280. **A., Blau-, kleiner** 281; **A., blauer gelbbrüstiger 287**; **A., blauer, gemeiner** 287; **A., blauer, großer** 279; **A., blauer, Lear's** 280; **A., blauer, Spix'** 281; **A., Blaustirn-** 293; **A., blaustiriger** 293; **A., Caninde-** 288; **A., Dreifarben-** 286; **A., dreifarbiger** 286; **A., dunkelrother 285**; **A., gelb und blauer, großer** 287; **A., gelb und blauer, kleiner** 288; **A., gelbflügeliger, großer** 283; **A., gelbnackiger** 286; **A., Goldnacken-** 292; **A., grüner, großer** 281; **A., grüner, kleiner 293**; **A., Grünflügel-** 285; **A., grünflügeliger großer** 285; **Arara, Hahn's 294**; **A., hell-**

Digitized by Google

rother 283; A., Hyazinth- 279; A., Hyazinth-, kleiner 280; **A., hyazinthblauer 279**; A., Illiger's 291; **A., meerblauer 280**; A., meerblauer, kleiner, 281; A., militärischer 281; A., **mit gelbem Halsband 292**; **A., mit gelben unterseitigen Flügeldecken 294**; **A., mit rothem Handgelenk 289**; A., rothbäuchiger 289; A., Rothbug- 281. 289; A., rother, Vaïllant's 281; **A., rothrückiger 291**; A., Rothsteiß- 289; **A., rothstirniger 281**; 291; A., scharlachrother 283; A., Soldaten- 281; A., Zwerg- 289. — Araras 4. 6. 7. 10. 29. 44. 196. 276. 297.

Arara noir à trompe 293.

Ararakakadu 233; **A., schwarzer 233.** — Ararakakatus 67. 44. 196. 232. — Ararakakatu, schwarzer 233.

Araraunа 287; Araraуna 287.

Arzneimittel, Uebersicht, nebst Angaben der Mischungsverhältnisse und Gaben 98.

Atrophie 87.

Augenkrankheiten: Anschwellungen der Augen-Bindehäute 89; Entzündungen der Bindehäute 89; Entzündungen der Hornhaut 89; Entzündungen, innere 89; Geschwülste an den Bindehäuten 90; Verhärtungen an den Bindehäuten 90; Vereiterung 89; Warzen an den Augenlidern 89.

Ausschlag-Erscheinungen 95.

Austernschale geglühte 48.

B.

Baardparkiet 313.

Baden 70; Badenäpfe 33; Badewasser 49.

Bakterien 82.

Balggeschwüre 92.

Bandwürmer 84.

Banksien à tête rouge 277; B. australe 209.

Bartkakadu 229; Bartsittich 312. 314.

Begabung, Merkmale derselben 51; B., verschiedenartige 49. 61.

Blähsucht 80.

Blaßkopf 370; Blaßkopfsittich 370.

Blauarara 280; B., kleiner 281. — Blaubart 152; Blaukappen-Amazone 168; Blaukopf 148. 150. 177; Blaukrone 154. — Blauscheitel-Amazonenpapagei 146; B.-Edelpapagei 190. — Blaustirnarara 293; B.-Sittich 330. — Blauwangen-Amazone 172.

Blauwkeel Amazone Papegaai 152; Blauwkop Edelpapegaai 190; Blauwkop Langvleugel Papegaai 177; Blauwmasker Amazone Papegaai 149; Blauwnek Loeri 259; Blauwneus Ara 293; Blauwoog Kakketoe 209; Blauwoor Loeri 273; Blauwstaart Loeri 249; Blauwwang Amazone Papegaai 173.

Blumenaufsittich 356.

Blutgeschwüre 93; Blutvergiftung 13. 83. 118.

Boden (Käfig-) 30.

Bolborrhynchus, *Bp.* 6. 344.

Bolivia Parkiet 324; Bolivia Parrakeet 324. — Bolsiriasittich 324.

Borstenkopfpapagei 7.

Bräune 78.

Brand, schwarzer 81. — Brandwunden 91.

Brauuwangensittich 340.

Breitschwanzlori, blaubrüstiger 257; **B., blaugestrichelter 256**; **B., blauschulteriger 254**; **B., blauschwänziger 242. 249**; B., grünschwänziger 247; **B., Louisiade- 247**; **B., mit gelbem Mantelfleck 242. 251**; **B., mit schwarzem Halsfleck 248**; **B., schwarzkäppiger 242. 245.** 253; **B., violettnackiger 259**; **B., weißbürzeliger 260.** — Breitschwanzloris 6. 46. 238. 243.

Brillenamazone 159; B.-Kakadu 209; B.-Sittich 295.

Bronchienentzündung 79.

Brotogérys, *Vgrs.* 6. 351.

Bruinstaart Amazone-Papegaai 150; Bruinwang Parkiet 340.

Bügel 34. 36. 38.

Bürzeldrüse 85.

Buntsittich 366; B., blaßkörpiger 370; B., gemeiner 366.

C.

Cacatois à crête jaune 206; C. à cul rouge 216; C. à front rouge 215; C. à huppe blanche, Grand 208; C. à huppe jaune, Grand 206; C. à huppe jaune, Petit 203; C. à huppe orangée 205; C. à huppe rouge 210; C. à huppe tricolore 212; C. à lunettes 209; C. à lunettes rouges 215; C. à tête brune 230; C. à yeux bleus 209; C. à yeux nus 224; C. Alecto 233; C. Banksien 229; C. blanc à huppe jaune, Grand 206; C. blanc à huppe jaune, Petit 203; C. corbeau 231; C. de Banks 229; C. de Buffon 205; C. de Ducorps 217; C. de Goffin 216; C. de Leadbeater 212; C. de Solander 230; C. des Philippines 216; C. Ganga 227; C. nasique 222; C. nasique, Grand 223; C. ophthalmique 209; C. rosalbin 219; C.-rose 219; C. Triton 207.

Cactus Conure 340.

Caïque, Hawk-headed 179.

Callipsittacus, *Lss.* 6. 196. 235.

Callopsitte 235.

Digitized by Google

Calyptorrhynchus, *Vgrs.* et *Hrsf.* 6. 196. 226.
Calyptorrhynque de Baudin 230.
Caninde Ara 288. — Caninde-Arara 288. — Caninde Macaw 288.
Carolina Conure 320; Carolina Parkiet 320; Carolina Parrakeet 320.
Catita 296.
Ceram-Edelpapagei 187; Ceram Edelpapegaai 187. — Ceram Loeri 251; Ceram-Lori 251; Ceram Lory 251; Ceram Parrot 187.
Cheroy 296.
Chiriri Parkiet 361.
Cholera 82.
Choroy 296.
Chrysotis, *Swns.* 6. 127; Chr. Nicholsi, *Lwrnc.* 149.
Coccateel 235; Coccatiel 235; Cockatile 235.
Cochinchina Parrakeet 312.
Cockatoo, Alecto 233; C., Banksian 229; C., Bare-eyed 224; C., Baudin's 230; C. Black, Great 233; C., Black, White-tailed 230; C., Black, Yellow-eared 231; C., Blood-stained 215; C., Blue-eyed 209; C., Buffon's 205; C., Citron-crested 205; C., Digging 223; C., Ducorps' 217; C., Funereal 231; C., Ganga 227; C., Ganggang 227; C., Goffin's 216; C., Java 203; C., Leach's 230; C., Leadbeater's 212; C., Nasecus 222; C., Palm, Great 233; C., Red-crested 210; C., Red-vented 216; C., Roseate 219; C., Rose-crested 210, 219; C., Rosy 219; C., Slender-billed 222; C., Slender-billed, Western 223; C., Small 203; C., Solander's 230; C., Sulphur-crested, Greater 206; C., Sulphur-crested, Lesser 203; C., Triton 207; C., White-crested, Greater 208; C., White, Great 206; C., White, Long-billed 222; C., White, Red-faced 215; C., Yellow-crested, Great 206.
Cockatoo Parrakeet 235.
Comoren Papegaai 126; Comoren Parrot 126.
Conure, Blue-crowned 330; C., Brown-throated 340; C., Cactus 340; C., Carolina 320; C., Cuban 326; C., Golden-crowned 336; C., Green 324; C., Patagonian 327; C., Red-masked 317; C., St. Thomas 340; C., Yellow 333; C., Yellow-cheeked 340; C., Yellow-headed 334.
Conurus, *Khl.* 6. 318.
Coracopse noir 376.
Coracopsis, *Wgl.* 102.
Coryllis, *Fnsch.* 7.
Cuba Amazone Papegaai 156; Cuba Parkiet 326.
Curassow Parrakeet 340.

D.

‚Dampfschiffvögel' 107.
Darmentzündung 80. 81; Darmkatarrh 78. 80. 81.
Dasyptilus, *Wgl.* 7.
Diadem-Amazone 169. 170; **Diadem-Amazonenpapagei 170;** Diademlori 257.
Diarrhoe 81.
Dickbekparkiet, Monniks 345; D., Zwartvlek 349.
Dickschnabelsittich, graukörpiger 345; D., mit gelbem Gesicht 351; **D., Mönchs- 345;** D., schwarzfleckiger 349; D., schwarzgefleckter 349. — Dickschnabelsittiche 6. 45. 344.
Diphtheritis 78.
Doblenpapagei 125.
Domicella, *Wgl.* 6. 238. 243.
Domingo-Amazone, St. 154.
Drahtgeflecht 29. 32; Drahtgitter 30. 32.
Drehkrankheit 80.
Dreifarben-Arara 286.
Driekleur Ara 286; Driekleur Kakketoe 212.
Dürrsucht 85.
Durchfall 81.
Dwerg Edelpapegaai 193.

E.

Eclectus, *Wgl.* 6. 181. — Eclectus, rouge, Grand 186. — Eclectus, Blue-crowned 190; E., Grand 186; E., Great-billed 189; E., Linnean 184; E., Red-sided 184; E., Westerman's 188.
Edelpapagei, Blauscheitel- 190; **E., blauscheiteliger 190; E., Ceram- 187;** E. Grün- 184; E., grüner, großer 184; E., grüner, mittlerer 187; E., Grünschulter- 190; **E., grünschulteriger 190; E., Halmahera- 186;** E., Kardinal- 187; E., Kornelia's 188; E., Linné's 184; E., Mittel- 187; **E., Müller's 191;** E., Müller's, rothschnäbeliger 192; E., Müller's, weißschnäbeliger 192; **E., Neuguinea- 183, 184;** E., Roth- 186; E., rother, großer 186; E., rother, mittlerer 187; E., Schwarzschulter- 189; **E., schwarzschulteriger 189; E., Westerman's 188; E., Zwerg- 193.** — Edelpapageien 6. 44. 181.
Edelpapegaai, Blauwkop 190; E., Ceram 187; E., Dwerg 193; E., Groenschouder 190; E., Groote groene 184; E., Groote roode 186; E., Halmahera 186; E., Linné's 184; E., Müller's 191; E., New-Guinea 184; E., Westerman's 188; E., Zwartschouder 189.
Edelparkiet, Halsband 300; E., Hodg-

Digitized by Google

son's 308; E., Langstaart 315; E., Luzian's 314; E., Mauritius 304; E., Roodmasker 317; E., Tytler's 317; E., Zwartbek 313; E., Zwartkeel 312.
Edelsittich, blaubürzeliger 309; E., Halsband- 300; E., Halsband-, breitschwänziger 304; E., Halsband-, von Mauritius 304; E., Hoch- 305; E., Hodgson's 308; E., javanischer 309; E., Latham's 312; E., Prinz Luzian's 314; E., Reiter- 304; E., Ritter- 304; E., rosenbrüstiger, Latham's 312; E., rothbäckiger 317; E., rothnackiger 315; E., rothschnäbeliger, mit rother Brust 309; E., rothschulteriger 305; E., rothschulteriger, mit rosenrothem Halsband 305; E., rothschulteriger, ohne rothes Halsband 307; E., roth- und schwarzschnäbeliger, mit rother Brust 312; E., schwarzschnäbeliger, mit rother Brust 313; E., von den Nikobaren, rothschnäbeliger 317; E., von den Nikobaren, schwarzschnäbeliger 317. — Edelsittiche 6. 45. 296.
Eierstock-Erkrankungen 86.
Eingeweidewürmer 84.
Einkauf 16. 18.
Elerbantiasis 95.
Empfang 16. 25. — Empfangskäfig 28.
Enicognathe à bec mince 295.
Epilepsie 88.
Erbrechen 85.
Erdsittiche 7.
Ernährung 20. **39.**
Erzlori 245.
Eulenpapagei 7.
Euphema, *Vgl.* 7.

F.

Fächerpapagei 179.
Falkenkakadu 235.
Federlinge 96. — Federstaub 73. — Federstümpfe, Entfernen der alten 71. — Federwechsel 72.
Felsensittich 327.
Fett (als Nahrungsmittel); F., pflanzliches 43; F., thierisches 43. — Fettdrüse 85; Fettleber 87; Fettsucht 87.
Fidji Parkiet, Purperroode 372; Fidji Parrakeet 372. — Fidschisittich 372.
Fleischnahrung s. Fett.
Frauenlori 242. 249; F., schwarzstirniger 245.
Frucht s. Obst.
Fütterung; F., allgemein gebräuchliche 40; F., in der Heimat 39; F., zweckmäßigste 41; F., für große Papageien 41; F., für mittelgroße Papageien 44; F., für Pinselzüngler oder Loris 45; F., unpassende 67.
Fuß, Vernachlässigung 74. — Fußkrankheiten: Abfressen, Ausreißen und Benagen der Zehen 95; Eiterungen, Entzündungen, Geschwüre, gelbe geschwürige Knoten, Verhärtungen (Hühneraugen, Knollen) 94; Fußkrätze (Elerbantiasis, Kalkbeine) 95. — Fußkette 38. — Fußring 38.
Futtergefäße 32. 33; F., Anbringen derselben am Ständer 35.
Futtermittel, Beschaffenheit aller 46.

G.

Ganga Cockatoo 227; Gangakakadu 227; Ganga Kakketoe 227. — Ganggang Cockatoo 227.
Gebirgslori 269; G., blauer 269.
Geelbuik Amazone Papegaai 151. — Geelkuif Kakketoe, Groote 206; G. K., Kleene 208; G. K., Reuss 206. — Geelkop Papegaai, Dubbele 135; G. P., Kleene 141. — Geelvlek Papegaai 137; Geelvleugel Ara, Groote 283; Geeloor Amazone Papegaai 161; Geelwang Amazone Papegaai 169; Geelwang Parkiet 340.
Gefiederkrankheiten 95; Gefiederpflege 69.
Gehirnkrankheiten 88.
Gelbflügel 359; Gelbflügel-Amazone 141; Gelbflügelsittich 359. — Gelbbaubenkakadu, großer 206; G., kleiner 208. — Gelbkopf, doppelter 135; G., großer 135; G., kleiner 131. 141. — Gelbmantellori 251. — Gelbnacken 144; G.-Amazone 144. — Gelbohrkakadu 231; Gelbscheitel-Amazone 137. — Gelbsucht 86. — Gelbwangen-Amazone 169; G.-Kakadu 208. — Gelbzügel-Amazone 161.
Gelenkentzündung, eiternde 90; G., gichtische 90.
Geschwüre: Balg- und Blutgeschwüre 93.
Gesundheitskennzeichen 17; Gesundheitspflege 66.
Gicht 90.
Glanzsittich 372; G., braunrother 374; G., purpurrother 372.
Goldaugensittich 324; Goldbauch-Amazone 151; Goldflügelsittich 355. 359; Goldkinnsittich 355. — Goldmasken-Amazone 171; G.-Sittich 340. — Goldnacken 144; G.-Amazone 144; G.-Amazonenpapagei 144; G.-Arara 292. — Goldstirne 336; Goldstirnsittich 336. — Goldwangenkakadu 205.
Goudkraagen Ara 292; Goudnek Amazone Papegaai 144.

Digitized by Google

Granada-Amazone 171.
Grandilori 186.
Grasparkiet 381. — Grasperikit 353. — Grassittich 353. 356; G., gelbgrüner 340; G., gelbflügeliger 359. — Grass Parrakeet 381; G. P., Crested 235; G. P., Undulated 381; G. P., Zebra 381.
Graupapagei 10. 11. 12. 13. 19. 20. 48. 53. 59. 63. 64. 65. 66. 103. 130. 199. 200. 278; G., rothschwänziger 103. — **Graupapageien** 101. 102; G., ‚grauäugige' 107; G., ‚schwarzäugige' 107.
Gregarinen 78.
Groenboeg Amazone Papegaai 134; Groenschouder Edelpapegaai 190; Groenstaart Loeri 248; Groenstuit Parkiet 366; Groenvleugel Ara, Groote 285. — Groenwang Amazone Papegaai 167; Groenwang Parkiet 340.
Großschnabelpapagei 189.
Ground Parrakeet, Crested 235.
Grünedelpapagei 184; Grünflügelarara 285. — Grünkraut 43. 45. — Grünpapageien 132; Grünschulter-Edelpapagei 190; Grünschwanzlori 248; Grünwangen-Amazone 167. 168.
Guatemala-Amazone 127. 146; **Guatemala-Amazonenpapagei** 127. **146.** — Guatemala Amazone Papegaai 146.
Guianasittich 324.

H.

Halbmondsittich 336.
Half-moon Parrakeet 336.
Halmahera-Edelpapagei 186. — Halmahera Edelpapegaai 186. — Halmahera Parrot 186.
Halsband Edelpapagei 300. — **Halsband-Edelsittich 300**; H.-E., breitschwänziger 304; H.-E. von Mauritius 304. — Halsbandsittich 300. — Halsentzündung 67. 77.
Havana Amazone Papegaai 156. — Havanasittich 326.
Halve-maan Parkiet 336.
Havikkop Langvleugel Papegaai 179.
Helmkakadu 227; H., rothköpfiger 227.
Henicognathus, *Gr.* 6. 294.
Herbst-Amazone 169; H.-Papagei 169.
Herzkrankheiten: Herzbeutel-Entzündung 87.
Hochedelsittich 305.
Hollen-Langflügelpapagei 179.
Hungertyphus 83.
Hyazinth Arara 279; H., kleiner 280. — Hyazinthsittich 334. — Hyacinthine Macaw 279.

J.

Inkakakadu 200. 209. **212.**
Jaco 103.
Jako 103; J., Timneh- 120.
Jamaika-Amazone 158; J.-Amazonenpapagei 158.
Java Alexanderparkiet 309; Java Cockatoo 203.
Jendaya 334. — Jendaya Parkiet 334. — Jendayasittich 334.
Jew Parrakeet 309.
Joey 235.

K.

Käfige 20; K., Empfangs- 28; K., kegelförmige 33; K., mit Lackanstrich 34; K., runde 33; K., thurmförmige 33; K., Versandt- 23. 24; K., von Messingblech 33. 34; K., von Messingdraht 33. 34; K., von verzinktem Eisendraht 33. 34; K., von verzinntem Eisendraht 33. 34; K., Wohn- 29 (mit Abbildung S. 30); K., Wohn-, für die großen Papageien 29; K., Wohn-, für die kleineren und kleinsten Papageien 32; K., zylinderförmige 33.
Kahlwerden 96.
Kaiser-Amazone 150.
Kaka 262; Kakalori 262; Kakanestor 262. 263. — Ka-Ka, Mountain 263; Kaka Papegaai 262; Ka-Ka Parrot 262.
Kakadille 235.
Kakadu, Arara- 233; **K., Arara-, schwarzer 233**; K., Banks' 229; K., Bart- 229; K., blauängiger 209; K., Brillen- 209; **K., Dukorps' 217**; K., dunkelgelb gehäubter, kleiner **205**; K., Falken- 235; K., Ganga- 227; K., gelbbäckiger, kleiner 203; **K., gelbgehäubter, Buffon's 205**; **K., gelbgehäubter, großer 206**; K., gelbgehäubter, kleiner 203; K., gelbhäubiger, großer 206; K., gelbhäubiger, kleiner 203; K., Gelbhauben-, großer 206; K., Gelbhauben-, kleiner 203; K., Gelbohr- 231; K., Gelbwangen- 203; K., gelbwangiger 203. **K., Goffin's 216**; K., Goldwangen- 205; **K., hellgelb gehäubter, kleiner 203.** 205; K., Helm- 227; K., Helm-, rothköpfiger 227; **K., Inka-** 200. 209. **212**; **K., Keilschwanz-** 5. 6. 45. 196. **235**; **K., langschnäbeliger 222**; K., langschnäbeliger, großer 223. — **K., Langschwanz-, Banks'** 226. **229**; **K., L., Baudin's 230**; **K., L., gelbohriger** 226. **231**; **K., L., großschnabeliger** 230; **K., L., rothköpfiger** 226. **227**; K., L., Solander's 226. 230. — K., Leadbeater- 209; K., Leadbeater's 200. 209. 212; K., mit blauem Augenkreis 209; **K., mit rosenrothem Stirn- und Zügelstreif 215**; K., Molukken- 200. 210; **K., nackäugiger 224**; K., Nackt-

augen- 200. 224. — K., Nasen- 222; K., N-, großer 223; K., N-, kleiner 222; K., N-, von Westaustralien 223. — K., Nymphen- 235; K., orangehäubiger, kleiner 205; **K., Philippinen-** 216. — K., Raben- 229; K., N-, braunkörpiger 230; K., N-, schwarzer 231. — K., Rosa- 219. 265; K., rosafarbner 219; K., Rosen- 219; **K., rosenrother 219.** 265; **K., rothgehäubter 200. 210**; K., rothhäubiger 210; K., Rothbauben- 210; K., Rothsteiß- 216; K., Rothflügel- 215; K., rothzügeliger 215; K., Salomon- 209; K., Salon- 205; K., schwarzer 229; K., schwarzer rothhäubiger, kleiner 227; K., Triton- 207; **K., weißer, großer, mit gelber hängender Haube 209**; K., weißer großer, mit weißer Haube 208; K., weißgehäubter 208; **K., weißgehäubter, großer 208**; K., weißhäubiger 208; K., Weißhauben- 208; K., Weißohr- 230; K., Wühl- 223; K., Wühler- 223. — **Kakadus** 4. 6. 29. 66. 196; **K., Arara-** 6. 7. 44. 196. 232; **K., eigentliche** 6. 44. 196. 202; **K., Kreiselschwanz-** 6. 45. 196. 235; **K., Langschnabel-** 203; **K., Langschwanz-** 6. 44. 196. 197. 226; K., Nasen- 203; K., Zwerg- 7. 196.

Kakatilje 235.

Kakatu, Arara-, schwarzer 233; K., Buffon's 205; K., Ducorps' 217; K., gelbwangiger, mit gelber Haube 203; K., Goffin's 216; K., großschnäbeliger, mit gelber Haube 207; K., Keilschwanz-, neuholländischer 235; K., langschnäbeliger 222; K., langschnäbeliger, großer 223. — K., Langschwanz-, Banks' 229; K., L., Bandin's 230; K., L., gelböhriger 231; K., L., großschnäbeliger 230; K., L., rothgehäubter 227; K., L., Solander's 230. — K., Leadbeater's 212; K., mit gelber hängender Haube 209; K., orangegehäubter 205; K., rosafarbener 219; K., rothgehäubter 210; K., rothsteiliger 216; K., rothzügeliger 215; K., weißer großer, mit gelber Haube 206; K., weißgehäubter 208.

Kakketoe, Ara 233; K., Banks' 229; K., Bandin's 231; K., Blauwoog 209; K., Buffon's 205; K., Driekleur 212; K., Ducorps' 217; K., Ganga 227; K., Geelkuif, Groote 206; K., Geelkuif, Kleene 203; K., Geelkuif, Reus 206; K., Goffin's 216; K., Leadbeater's 212; K., Naaktoog 224; K., Neus 222; K., Neus, Groote 223; K., Oranjekuif 205; K., Raaf 231; K., Roodkuif 210; K., Roodstaart 216; K., Roodteugel 215; K., Rosé 219; K., Solander's 230; K., Triton 207; K., Wigstaart 235; K., Witkuif 208.

Kaktus-Perikit 340; Kaktussittich 340. 342. 343.

Kalf 47; K., thierischer 47; K., von alten Wänden 48. — Kalkschiß 81.

Kanarienflügelsittich 379; Kanariensittich 381; Kanarienvogelsittich 359.

Karuzenlori 259.

Karolinasittich 320; Karolinensittich 320.

Kardinal-Edelpapagei 187.

Katarrh, Darm- 78. 80. 81; K. der Luftröhre 77; K., der Mundhöhle 77; K., der Nasenhöhle 77; K., der Rachenhöhle 77; K., Magen- 80.

Katharinasittich 349.

Kea 263; Kealori 263; Keanestor 263. 266. — Kea Papegaai 263; Kea Parrot 263.

Kehlkopfentzündung 77. — Kehlkopfswurm s. Luftröhrenwurm.

Keilschwänze = Keilschwanzsittiche.

Keilschwanzkakadu 5. 6. 45. 196. **235.** — Keilschwanzkakatu, neuholländischer 235.

Keilschwanzlori, blaubäuchiger 240. 269; **K., blauohriger** 273. — **Keilschwanzlorie** 6. 46. 238. 267.

Keilschwanzsittich, blaustirniger 330; K., gelbwangiger 340; K., grüner, mit rothen unteren Flügeldecken 324; **K., grünwangiger 340.** 342. 343; **K., hyazinthrother 334**; **K., mit blauer Stirn 330**; **K., mit gelbem Gesicht 340.** 341. 342; **K., mit ockerbräunlichem Gesicht 340.** 341. 342. 343. K., mit spangrünem Oberkopf 340; K., mit weißer Brustbinde 327; **K., nordamerikanischer 320**; **K., orangegelber 333**; **K., orangestirniger 336**; K., patagonischer 327; **K., Pavua- 324**; K., von Karolina 320; **K., von Kuba 326**; **K., von Patagonien 327.** — **Keilschwanzsittiche** 6. 45. 318.

Kessi-Kessi 333; Kessisittich 333.

King 105; King-bird 105.

Kladderadatschsittich 377.

Klappe, herabfallende 33.

Kletterstangen (am Ständer) 35; Klettervorrichtung 36.

Knochenbrüche 91.

Knöpfchen, gelbe 78.

Kochinchinasittich 312.

Königsamazone 150; Königsvogel 105.

Korella 235.

Komoren-Schwarzpapagei 126; K.-Vaza 126; K.-Vazapapagei 126.

Krämpfe 88. 131.

Kragen-Langflügelpapagei 179; Kragenpapagei 179.

Krankheiten 75. — Krankheitskennzeichen 75.

Kreide 48.

Digitized by Google

Krik 162.
Kroonen Amazone Papegaai 170.
Kroup 78.
Kuba-Amazone 156; K.-A., rothbalsige 156. — Kubasittich 326.
Kugelspaltpilze 78.
Kurika 135.
Kurzflügelpapagei, bereifter 143; K., blaukiniger 152; K., blaumaskirter 149; K., blauscheiteliger 146; K.-Bouquet's 148; K., braunschwänziger 150; K., Dufresne's 171; K., Finsch' 168; K., gelbbäuchiger 151; K., gelbflügeliger 141; K., gelbnackiger 144; K., gelbscheiteliger 137; K., gelbwangiger 169; K., gelbzügeliger 161; K., grünwangiger 167; K., Guilding's 150; K., Levaillant's 135; K., lilascheiteliger 170; K., mit gelbem Daumenrand 147; K., mit grünem Flügelbug 134; K., mit rothem Flügelbug 132; K., mit rothen Schwingendecken 162; K., Natterer's 145; K., Prêtre's 162; K., rothbäuchiger 156; K., rothmaskirter 163; K., rothschnäbeliger 165; K., rothschwänziger 165; K., rothstirniger 155; K., Salle's 154; K., weißköpfiger 158; K., weißzügeliger 159. — Kurzflügelpapageien 132.

L.

Lady Lory 249.
Lähmung 90.
Langbek Parkiet 295.
Langflügel = Langflügelpapageien.
Langflügelpapagei, blauköpfiger 177; L., Hollen- 179; L., Kragen- 179; L., orangebäuchiger 175; L., schwarzgehörnter 177. — Langflügelpapageien 6. 45. 173.
Langschnabel = Langschnabelsittich. — Langschnabelkakadus 203. — **Langschnabelsittich** 6. 45. 294. **295**; L., rothstirniger 295.
Langschwanzkakadu, Banks' 226. 229; L., Baudin's 230; **L., gelbohriger** 226. **231**; L., großschnäbeliger 230; **L., rothköpfiger** 226. **227**; L., Solander's 226. 230. — Langschwanzkakadus 6. 44. 196. 197. 226.
Langschwanzkakatu, Banks' 229; L., Baudin's 230; L., gelböhriger 231; L., großschnäbeliger 230; L., rothgehäubter 227; L., Solander's 230.
Langschwanzsittich 315.
Langstaart Edelparkiet 315.
Langvleugel Papegaai, Blauwkop 177; L. P., Havikkop 177; L. P., Senegal 175.
Lauffittich 377.
Leadbeater-Kakadu = Kakadu, Leadbeater's.
Leberkrankheiten 86.
Leckerbissen 42. 45.
Legenoth 86.
Licmetis, Vgl. 203.
Loeri, Blauw en roode 257; L., Blauwgestreepte 256; L., Blauwnek 259; L., Blauwoor 273; L., Blauwstaart 249; L., Ceram 251; L., Groenstaart 248; L., Louisiade 247; L., Purperzwartkop 245; L., Roode 254; L., Swainson's 269; L., Witstuit 260.
Lori, Allfarb- 269; L., blaubrüstiger 249. 257; L., blaugestrichelter 256; L., blaustirniger 257. — **L., Breitschwanz-, blaubrüstiger 257**; L., B.-, blaugestrichelter 256; **L., B.-, blauschulteriger 254**; **L., B.-, blauschwänziger** 242. **249**; L., B.-, grünschwänziger 247; L., B.-, Louisiade- 247; **L., B.-, mit gelbem Mantelfleck 252. 251**; L., B.-, mit schwarzem Halsfleck 248; **L., B.-, schwarzkäppiger** 242. **245.** 253; L., B.-, **violettnackiger 259**; **L., B.-, weißbürzeliger 260.** — L., Ceram- 251; L., Diadem- 257; L., Ers- 245; L., Frauen- 242. 249; L., Frauen-, schwarzstirniger 245; L., Gebirgs- 269; L., Gebirgs-, blauer 269; L., Gelbmantel- 251; L., gestreifter 256; L., grünschwänziger 248; L., Grünschwanz- 248; L., Kaka- 262; L., Kapuzen- 259; L., Key- 263; **L., Keilschwanz-, blaubäuchiger** 240. 269; **L., B.-, blauohriger** 273. — L., Louisiade- 247; L., mit gelbem Mantelfleck 242. 251; L., mit gelbem Rückenfleck 251; L., rother 254; L., Rothnacken- 247. 249; L., scharlachrother 254; L., Schmuck- 242. 273; L., Schwalben- 242; L., Schwarzkappen- 245; L., schwarzköpfiger 242. 245. 253; L., schwarzstirniger 245; L., Strichel- 256. — **L., Stumpfschwanz-, braunbrüstiger** 262. 263; **L., St.-, olivengrüner** 263. 265. — L., violettköpfiger 245; L., von den blauen Bergen 240. 269; L., Weißbürzel- 260.
Lori à collier 245; L. à nuque violette 259; L. à scapulaire bleue 249; L. d'Amboine 187; L. rouge 254.
Lori Perruche à flancs rouges 184.
Lorikeet, Blue-bellied 269; L., Ornamental 273; L., Ornamented 273; L., Swainson's 269.
Loris 7. 32. 45. 238; L., Breitschwanz- 6. 46. 238. 243; L., eigentliche 238. 243; L., Keilschwanz- 6. 46. 238. 267; L., Spitzschwanz- 238. 267; L., Stumpfschwanz- 6. 46. 238. 262.
Lory, Black-bonnet 245; L., Blue-breasted 187. 257; L., Blue-diademed 257; L., Blue-headed 245; L., Blue Mountain 269; L., Blue-streaked

Digitized by Google

256; L., Blue-tailed 249; L., Ceram 251; L., Chattering 251; L., Crimson 187. 251; L., Green-tailed 248; L., Lady 249; L., Linnean 184; L., Louisiade 247; L., Moluccan 254; L., Ornamental 273; L., Purple-capped 245; L., Red 254; L., Red-sided green 184; L., Violet-necked 259; L., White-rumped 260.
Louisiade-Breitschwanzlori 247; Louisiade-Lori 247. — Louisiade Loeri 247; Louisiade Lory 247.
Luft, Nacht- 67; L., naßkalte 67. 68; L., verdorbne 67. 68; L., Zug- 67.
Luftröhrenwurm (Syngamus trachealis s. Strongylus Syngamus) 77.
Lungenentzündung 67. 77. 79; L., katarrhalische 77.
Luzianſittich 314.

M.

Macaw, Blue and buff 287; M., Blue and yellow 287; M., Blue, Lear's 280; M., Blue, Spix' 281; M., Brown-fronted 289; M., Canindé 288; M., Glaucous 280; M., Golden-collared 292; M., Green 281. 289; M., Green-winged 285; M., Hyacinthine 279; M., Illiger's 291; M., Military 281; M., Noble 283; M., Red and blue 283; M., Red and yellow 285; M., Red-bellied 289; M., Red-cheeked 281; M., Red, Lafresnaye's 281; M., Red-vented 289; M., Small 289; M., Tricolored 286.
Madna Bhola Parrakeet 315.
Mäuſeſittich 345.
Magenentzündung 80. 81; Magenkatarrh 80; Magenverletzung 80.
Maitaka 177; M.-Papagei 179. — Maitaka Parrot 177.
Makao 283.
Malakkaſittich 315.
Marakana 291.
Mascarenus, *Less.* 6. — Maskarenenpapagei 6.
Maskenſittich 376. — Masker Parkiet 376.
Mauritius Alexandrine Parrakeet 304; Mauritius Edelparkiet 304.
Mauſer 72.
Melopsittacus, *Gld.* 6. 380.
Meunier 143.
Microglosse noir à trompe 233.
Microglossus, *Gffr.* 6. 196. 232.
Mikrokokken 82.
Milzkrankheiten 86; Milzbrand 87.
Mittel-Edelpapagei 187.
Mönch 345; Mönchs- Dickſchnabelſittich 345; M.-Papagei 345; M.-Sittich 345.
Mohrenkopf 174. 175; M.-Papagei 175. — Mohrenpapagei 121.
Molenaar 191.
Molukken-Kakadu 200. 210.
Monniks Dickbekparkiet 345.
Mountain Ka-Ka 263.
Müller 143; M.-Amazone 63. 131; M.-Papagei 143.
Muisparkiet 345.
Mundfäule, gelbe 78.
Muſchelſittich 381.

N.

Naaktoog Kakketoe 224.
Nachtluft 67.
Nacktaugen-Kakadu 209. 224.
Nahrungsmittel, menſchliche 43.
Nasecus Cocketoo 222.
Naſenkakadu 222; N., großer 223; N., kleiner 222; N. von Weſtauſtralien 223. — Naſenkakadus 203.
Nasiterna, *Wgl.* 6. 196. — Nasiterne 222; N., Grand 223.
Nebel 67.
Neſtor = Neſtorpapageien. — Nestor, *Wgl.* 6. 238. 262. — Nestor de la Nouvelle Zélande 262; N. olivâtre 263. — Neſtor, Kaka- 262. 263; N., Kea- 263. 266. — Neſtorpapageien 6. 46. 238. 262.
Neuholländer-Papagei 134.
Neuguinea-Edelpapagei 183. 184.
Neuſeeländer-Sittich, rothſtiriger 377.
Neus Kakketoe 222; N. K., Groote 223.
New-Guinea Edelpapegaai 184; N.-G. Parrot 184.
New-Zealand Parkiet, Roodvoorhoofd 377; New-Zealand Parrakeet 377.
Nymfe 235; Nymfenkakadu 235; Nymfenſittich 5. 235. — Nymphique 235.

O.

Obſt 41. 44.
Omnikolor 366.
Orangeflügelſittich 355.
Oranjekuif Kakketoe 205; Oranjevleugel Parkiet 355.

P.

Palaeornis, *Vgrs.* 6. 296.
Palm Cockatoo, Great 233.
Panama-Amazonenpapagei 139. — Panama Amazone Papegaai 139.
Papagei, Alexander- 300; P., Doblen- 125; P., Fächer- 179; P., gelbnackiger 144; P., Grau- 103; P., Grau-, rothſchwänziger 103; P., grauer 103; P., grauer braunſchwänziger 120; P., grauer rothſchwänziger 103; P.,

Großſchnabel- 189; P., Herbſt- 169; P., Kragen- 179; P., Mönchs- 345; P., Mohren- 121; P., Mohrenkopf- 175; P., Müller- 143; P., Neuholländer- 134; P., Paradis- 156; P., Perita- 381; P., Portoriko-, blauköpfiger 177; P., rothſchwänziger 103; P., Rüſſel-, ſchwarzer 233; P., rußbrauner 125. — P., Schwarz- 125; P., Sch.-, großer 121; P., Sch.-, kleiner 125; P., Sch.-, Komoren- 126. — **P., ſchwarzer, großer 121; P., ſchwarzer, kleiner 125; P., ſchwarzer, von den Komoren** 125. 126. P., Schwarzohr- 177; P., Sonnen- 141; P., Surinam- 137; P., Timneh- 120. — P., Vaza-, großer 121; P., V.-, kleiner 125; P., V.-, Komoren- 126. — P., Weißſchnabel- 191; P., Wellen- 381.

Papageichen 7.

Papageien, Amazonen- 6. 14. 29. 44. 48. 65. 66. 101. 126. 127; P., Borſtenkopf- 7; **P., die ſprechenden 101; P., Edel-** 6. 44. 181; **P., eigentliche** 6. 8. 44. 102; P., Eulen- 7; P., Fledermaus- 6; **P., Grau-** 101. 102; P., Grün- 132; P., Kurzflügel- 132; P., Langflügel- 6. 45. 113; P., Maskarenen- 6; P., Nektor- 6. 238. 262; P., Pinſelzungen- 7. 8. 35. 39. 238; P., Portoriko- 154; P., Schwarz- 101. 102. 121; P., Streifen- 7; P., Zwerg- 7.

Papegaai, Amazone-, Blauwkeel 152; P. A., Blauwmasker 149; P., A., Blauwwang 173; P., A., Bodinus' 153; P., A., Bouquet's 148; P., A., Bruinstaart 150; P., A., Cuba 156; P., A., Dufresne's 171; P., A., Finsch' 168; P., A., Geelbuik 151; P., A., Geeloor 161; P., A., Geelwang 169; P., A., Gewone 132; P., A., Groenboeg 132; P., A., Groenwang 167; P., A., Goudnek 144; P., A., Guatemala 146; P., A., Guilding's 150; P., A., Hagenbeck's 140; P., A., Havana 156; P., A., Kroonen 170; P., A., Muller 143; P., A., Natterer's 145; P., A., Panama 139; P., A., Prêtre's 162; P., A., Roodbek 166; P., A., Roodmasker 163; P., A., Roodstaart 165; P., A., Roodvleugel 162; P., A., Roodvoorhoofd 155; P., A., Sallé's 154; P., A., Witkop 158; P., A., Witvoorhoofd 159. — P., Barkly's 125; P., Comoren 126. — P., Edel-, Blauwkop 190; P., E., Ceram 187; P., E., Dwerg 193; P., E., Groenschouder 190; P., E., Groote groene 184; P., E., Groote roode 186; P., E., Halmahera 186; P., E., Linné's 184; P., E., Müller's 191; P., E., New-Guinea 184; P., E., Westerman's 188; P., E., Zwartschouder 189. — P., Geelkop-, Dubbele 135; P., Geelkop, Kleene 141; P., Geelvlek 137; P., Geelvoorhoofd 137; P., Grauwe 103; P., Grijze 103; P., Kaka 262; P., Kea 263. — P., Langvleugel-, Blauwkop 177; P., L., Havikkop 179; P., L., Senegal 175. — P., Timneh 120. — P., Vaza, Groote 121; P. V., Kleene 125.

Paradiſspapagei 156; P.- Parkit 273.

Parkiet, Alexander-, Groote 305; P., A., Java 309; P., A., Kleene 300; P., A., Latham's 312. — P., Baard- 313; P., Blauwvoorhoofd 330; P., Bolivia 324; P., Bruinroode 374; P., Bruinwang 340; P., Chiriri 361. — P., Dickbek-, Monniks 345; P., D., Zwartvlek 349. — P., Carolina 320; P., Cuba 326. — P., Edel-, Halsband 300; P., E., Hodgson's 308; P., E., Langstaart 315; P., E., Luzian's 314; P., E., Mauritius 304; P., E., Roodmasker 317; P., E., Tytler's 317; P., E., Zwartbek 313; P., E., Zwartkeel 312. — P., Fidji, Purperroode 372. — P., Geelwang 340; P., Gras- 381; P., Groenstuit 366; P., Groenwang 340; P., Halvemaan 336; P., Jendaya 334; P., Langbek 295; P., Masker 376; P., Muis 345; P., New-Zealand, Roodvoorhoofd 377; P., Oranjegeele 333; P., Oranjevleugel 359; P., Oranjevoorhoofd 336; P., Patagonien 327. — P., Rose-Hill 366; P., Rose-Hill, Blauwe 370. — P., Rosille 366; P., Smous- 313; P., Tirica 356; P., Tovi 353; P., Tuipara 355, P., Zon 320.

Parrakeet Alexander, Great 305. — P.,Alexandrine-, Black-billed 313; P., A., Great 305; P., A., Javan 309; P., A., Long-tailed 315; P., A., Mauritius 304; P., A., Ring-necked 300; P., A., Rose-breasted 312. — P., All-green 356; P., Black-spotted 349; P., Blue-fronted 330; P., Bolivia 324; P., Canary-winged 359; P., Carolina 320; P., Cockatoo 235; P., Cochinchina 312; P., Curassow 340; P., Fidji 372; P., Golden-winged 355. — P., Grass- 381; P., G., Crested 235; P., G., Undulated 381; P., G., Zebra 381. — P., Grey-breasted 345; P., Ground-, Crested 235; P., Halve-moon 336; P., Hodgson's 308; P., Javan 309; P., Jew 309; P., Luzian's 314; P., Maccawle 340; P., Madna Bhola 315; P., Malaccan 315; P., Masked 376; P., New-Zealand 377; P., Orange-winged 359; P., Pale-headed 370; P., Quaker 345; P., Red-cheeked 317; P., Ring-necked 300; P., Rose-Hill 366; P., Rose-ringed 300; P., Shining 372; P., Shining,

Digitized by Google

Marron 374; P., Slight-billed 295; P., Solstitian 333; P., Tabuan 374; P., Tytler's 317; P., Tovi 333; P., Tuipara 335; P., Yellow- and white-winged 361; P., Yellow-headed 334; P., Zebra 381.
Parrot, Amazon- 132; P., A., Active 162; P., A., August 150; P., A., Blue-cheeked 172; P., A., Blue-faced 149; P., A., Blue-fronted 132; P., A., Bodinus' 153; P., A., Bouquet's 148; Diademed 170; P., A., Dufresne's 171; P., A., Festive 152; P., A., Finsch' 168; P., A., Golden-naped 144; P., A., Green-cheeked 167; P., A., Guatemalan 146; P., A., Guilding's 150; P., A., Hagenbeck's 140; P., A., Levaillant's 135; P., A., Mealy 143; P., A., Mercenary 147; P., A., Natterer's 145; P., A., Orange-winged 134; P., A., Panaman 139; P., A., Prêtre's 162; P., A., Red-fronted 155; P., A., Red-masked 163; P., A., Red-tailed 165; P., A., Red-throated 158; P., A., Sallé's 154; P., A., Vinaceous 166; P., A., White-browed 159; P., A., White-fronted 156; P., A., Yellow-bellied 151; P., A., Yellow-cheeked 169; P., A., Yellow-fronted 137; P., A., Yellow-lored 161; P., A., Yellow-shouldered 141. — P., Black-shouldered 189; P., Blue-headed 177. 193; P., Blue Mountain 269; P., Blue-rumped 193; P., Ceram 187; P., Coast Grey 193; P., Comoren 126; P., Green-shouldered 190; P., Grey 193; P., Halmahera 186; P., Hawk-headed 179; P., Hooded 179; P., Ka-Ka 262; P., Kea 263; P., Maitaka 177; P., Müller's 191; P., New-Guinea 184; P., Noble 293; P., Notable 263; P., Praslin 125; P., Red-vented 177; P., Rosella 366; P., Scallop 381; P., Senegal 175; P., Shell 381; P., Shining 372; P., Shining, Marron 374; P., Spectacle 159; P., Timneh 120; P., Varied-winged 190. — P., Vaza, Barkly's 125; P., V., Greater 121; P., V., Lesser 125; P., V., Smaller 125. — P., Westerman's 168.
Patagonien Parkiet 327. — Patagonier-sittich 327.
Pavua - Keilschwanzsittich 324. — Pavuasittich 324. — Pavuane 325.
Perikit, Gras- 353; P., Kaktus- 340. — Perikiten 319.
Pepitapapagei 381.
Perroquet à cravatte 179; P. à épaulettes noires 189; P. à épaulettes vertes 190; P. à joues rouges 159; P. à tête bleue 177. 193; P. à tête jaune 135; P. à tête noire 175; P. aux ailes chamarées 190. — P. Amazone à ailes oranges 134; P. A. à calotte bleu 132; P. A. à collier d'or 144; P. A. à couleur de vin 166; P. A. à diadème 170; P. A. à dos rouge 152; P. A. à épaulettes jaunes 141; P. A. à face bleue 149; P. A. à front blanc 159; P. A. à front bleu 132; P. A. à front d'écarlate 167; P. A. à front jaune 137; P. A. à front rouge 155; P. A. à gorge rouge 158; P. A. à joues bleues 173; P. A. à joues jaunes 169; P. A. à joues vertes 167; P. A. à masque rouge 163; P. A. à oreilles jaunes 161; P. A. à queue rouge 165; P. A. à tête blanche 156; P. A. à ventre jaune 151; P. A. active 162; P. A. couronne 170; P. A. de Bodinus' 153; P. A. de Bouquet 148; P. A. de Cuba 156; P. A. de Dufresne 171; P. A. de Finsch 168; P. A. de Guatemale 146; P. A. de Guilding 150; P. A. de Hagenbeck 140; P. A. de Levaillant 135; P. A. de Natterer 145; P. A. de Panama 139; P. A. de Prêtre 162; P. A. de Sallé 154; P. A. de St. Domingo 154; P. A. de la Martinique 158; P. A. impériale 150; P. A. de mercénaire 147; P. A. ochroptère 141; P. A. poudrée 143. — P. cendré 193; P. couronné bleu 190; P. de Barkly 125; P. de Cayenne 137; P. de Ceram 187; P. de Halmahera 186; P. de Linné 184; P. de Malacca, Petit 193; P. de Müller 191; P. de St. Domingo 155; P. de Westerman 188; P. de la Nouvelle Guinée 184; P. des Comores 126; P. du Sénégal 175; P. gris 193; P. Ka-Ka 262; P. Lord du Brésil 132; P. maillé 179; P. masqué 376; P. rouge, Grand 186; P. Tavoua 152; P. timneh 120; P. Vaza 121; P. vert, Grand 184.
Perruche à ailes blanches 361; P. à bavette rose 312; P. à bouche d'or 269; P. à collier rose 300; P. à front bleu 330; P. à front jaune 336; P. à front pourpre 377; P. à gorge brune 340; P. à joues brunes 340; P. à joues jaunes 340; P. à joues oranges 340; P. à joues roses 315; P. à joues verts 340; P. à masque noire 376; P. à moustaches 312; P. à poitrine rose 309; P. à taches noires 349; P. à tête blanchâtre 370; P. à tête d'écarlate 317; P. à tête d'or 334; P. à tête jaune 320; P. à tête pâle 370; P. à ventre orange 340. — P. Alexandre à bec noir 313; P. A. à collier de l'Inde 300; P. A. à collier du Sénégal 300; P.

Digitized by Google

A. queue longue 315; P. A. de Java 309; P. A. de l'isle de Maurice 304; P. A. Grande 305. — P. bleue et jaune 370; P. bouton bleu 330; P. bouton d'or 336; P. cactus 340; P. callopsitte 235; P. Chiriri 361; P. couronné 336; P. d'Alexandre, Grande 305; P. de Bolive 324; P. de Cuba 326; P. de Hodgson 308; P. de Luzian 314; P. de Malais 315; P. de Pondicherry 312; P. de Tytler 317; P. de la Caroline 320; P. de la Nouvelle-Zélande 377; P. de la Patagonie 327; P. jaune 333; P. jendaya 334. — P. Lori à calotte noire 245; P. L. à cul blanc 260; P. L. à queue verte 248; P. L. de Céram 251; P. L. de Louisiade 247; P. L. de Swainson 269; P. L. des Dames 249; P. L. ornée 273; P. L. rouge 254; P. L. striée bleue 256; P. L. violette et rouge 257. — P. marron de Fidji 374; P. marron brillante 374; P. moine 345; P. omnicolore 366; P. ondulée 381; P. palliceps 370; P. patagone 337; P. pourpre brillante 372; P. pourpre de Fidji 372; P. soleil 333; P. souris 345; P. tabuane 374; P. tirica 356; P. tovi 353; P. tuipara 355; P. xanthoptère 359.
Verrüschen 319.
Pezoporus, *Ill.* 7.
Pfaumenkopf 269; Pfaumenkopfsittich 269, 299.
Philippinen-Kakadu 216.
Pinselzüngler = Pinselzungen-Papageien. — Pinselzungen-Papageien 7, 8, 39, 45, 238.
Pionias, *Wgl.* 6, 173.
Pips 77, 85.
Plattschweifsittich, blaßköpfiger 370; P., braunrother 374; P., bunter 366; P., glänzender, braunrother 374; P., glänzender, purpurrother 372; P., grünbürzeliger 366; P., neuseeländischer, rothstirniger 377; P., purpurrother 372; P., rothstirniger 377; P., schwarzmaskirter 376. — Plattschweifsittiche 6, 45, 362.
Platycercus, *Vgrs.* 6, 362; P., personatus, *Gr.* 376.
Plectólophus, *Vgrs.* 6, 196, 202.
Pompadoursittich, braunrother 374; P., rother 372.
Portoriko-Amazone 155; P.-A., rothstirnige 155; P.-A., weißstirnige 154. — Portoriko-Papagei, blauköpfiger 177. — Portoriko-Papageien 154.
Pracht-Amazone 162.
Praslin Parrot 125.
Preise 65.
Psittacella, *Schlg.* 7.
Psittacula, *Khl.* 7.
Psittacus, *L.* 6, 102; P. accipitrinus, *L.* 179; P. aeruginosus *L.* 340; P. aestivus, *Lth.* 129, 132; P. affinis, *Wlc.* 190; P. agilis, *L.* 162; P. albifrons *Sprrm.* 159; Alexandri, *L.* 309; P. amazonicus, *L.* 129, 134; P. apophoenicus, Rchn. 160; P. araraúna, *L.* 287; P. atérrimus, *Gml.* 233; P. atricapillus, *Wgl.* 245; P. augustus, *Vgrs.* 150; P. aureus, *Gml.* 336; P. auricollis, *Css.* 292; P. aurifrons, *Lss.* 351; P. auripalliatus, *Lss.* 144; P. autumnalis, *L.* 169; P. Banksi, *Lth.* 229; P. Barklyi, *Nct.* 125; P. Baudini, *Vgrs.* 230; P. Bodini, *Fnsch.* 153; P. Bouqueti, *Bchst.* 148; P. brasiliensis, *L.* 163; P. Buffoni, *Fnsch.* 205; P. cactorum, *Pr. Wd.* 340; P. caninde, *Wgl.* 288; P. canipalliatus, *Cb.* 148; P. cardinalis, *Bdd.* 187; P. carolinensis, *L.* 320; P. Cathropae, *Blth.* 309; P. chlorocercus, *Gld.* 248; P. chloróp-terus, *Gr.* 285; P. citrino-cristatus, *Frs.* 205; P. coccineus, *Lth.* 257; P. coccinifrons, *Snc.* 167; P. coeligenus, *Lwrnc.* 172; P. collarius, *L.* 158; P. comorensis, *Ptrs.* 125; P. Corneliae, *Bp.* 188; P. cyanops, *Vll.* 149; P. diadematus, *Shw.* 170; P. Ducorpsi, *Hmbr. et Jacq.* 217; P. Dufresnei, *(Lvll.) Khl.* 171; P. eques, *Bdd.* 304; P. erithacus, *L.* 103; P. erythrúrus, *Khl.* 129, 165; P. euops, *Wgl.* 326; P. eupatrius, *L.* 305; P. eximius, *Shw.* 366; P. farinosus. *Bdd.* 143; P. festivus, *L.* 152; P. Finschi, *Scl.* 168; P. funéreus, *Shw.* 231; P. fuscatus, *Blth.* 260; P. galeatus. *Lth.* 227; P. galeritus, *Lth.* 206; P. garrulus, *L.* 251; P. glaucus, *Vll.* 280; P. Goffini, *Fnsch.* 216; P. grandis, *Gml.* 186; P. grandis, *Rss.* 186; P. guatemalensis, *(Hrtl.)* 146; P. Guildingi, *Vgrs.* 150; P. gymnopis. *Scl.* 224; P. haemorrhous. *Spx.* 330; P. Hagenbecki, *Rss.* 129, 140; P. Hahni, *Snc.* 294; P. Hodgsoni, *Fnsch.* 208; P. hyacinthinus, *Lth.* 279; P. hypoenóchrous, *Gr.* 241; P. incertus, *Shw.* 193; P. intermedius. *Bp.* 187; P. intermedius. *Rss.* 187; P. jendaya, *Gml.* 334; P. lactifrons, *Lwrnc.* 143; P. Lafresnayei, *Fnsch.* 281; P. larvatus. *Rss.* 376; P. Lathami, *Fnsch.* 312; P. Leadbeateri, *Vgrs.* 212; P. Leari, *Bp.* 280; P. leptorrhynchus, *Ang.* 295;

P leucocéphalus, *L.* 156; P. leucólophus. *Lss.* 208; P. Levaillanti. *Gr.* 135; **P. lineolatus,** *Brd.* 349; P. Linnéi, *Rss.* 184; P. Linnéi, *Wgl.* 184; P. longicaudatus, *Bdd.* 315; P. lori, *L.* 249; **P. luconensis,** *L.* 190; **P. Luziani,** *Vrrx.* 314; P. macao, *L.* 283; **P. macavuana,** *Fnsch.* 289; P. maracana, *Vll.* 291; P. megalorrhynchus, *Bdd.* 189; **P. melanorrhynchus,** *Wgl.* 313; P. menstruus, *L.* 177; **P. mercenarius,** *Tschd.* 147; P. meridionalis, *Gml.* 262; P. militaris, *L.* 281; P. moluccensis, *Gml.* 210; P. mónachus, *Bdd.* 345; P. Müllerі, *Tmm.* 191; P. nascia, *Tmm.* 222; P. Natterері, *Fnsch.* 145; P. Nicholsi, *Lvrnc.* 149; **P. nicobaricus,** *Gld.* 317; P. niger, *L.* 125; P. nobilis, *L.* 293; P. notabilis. *Gld.* 263; P. Novae-Hollandiae, *Gml.* 235; P. Novae-Zeelandiae, *Sprrm.* 377; P. ochrocéphalus, *Gml.* 137; P. ochrópterus, *Gml.* 171; P. ophthalmicus, *Scl.* 209; P. ornatus, *L.* 273; **P. pachyrrhynchus,** *Swns.* 294; P. pallidiceps, *Vgrs,* 370; **P. panamensis,** *Cb.* 139; **P. pastinator,** *Gld.* 223; P. patagonus, *Vll.* 327; P. pavua, *Bdd.* 324; P. pertinax, *L.* 340; **P. Philippinarum,** *Gml.* 216; P. polychlorus, *Scpl.* 184. 186; **P. Prêtrei,** *Tmm.* 162; **P. reticulatus,** *Mll. et Schlg.* 256; **P. riciniatus,** *Bchst.* 259; P. roseicapillus, *Vll.* 219; P. ruber, *Gml.* 254; P. Sallei, *Scl.* 154; P. sanguineus, *Gld.* 215; P. senegalus, *L.* 175; P. severus, *L.* 289; **P. Solandri,** *Tmm.* 230; P. solstitialis, *L.* 333; **P. Spixi,** *Wgl.* 281; P. splendens, *Pl.* 372; **P. stellatus,** *Wgl.* 230; P. sulfúreus, *Gml.* 203; P. Swainsoni, *Jard. et Slb.* 269; P. tabuënsis, *Gml.* 374 · **P. timneh,** *Frs.* 120; P. tirica, *Gml.* 356; P. torquatus, *Bdd.* 300; P. tovi, *Gml.* 353; **P. tricolor,** *Bchst.* 286; **P. Triton,** *Tmm.* 207; P. tuipara, *Gml.* 355; **P. Tytleri,** *Hume* 317; P. undulatus, *Shw.* 381; P. vaza, *Shw.* 121; P. vináceus, *Pr. Wd.* 166; P. virescens, *Gml.* 361; P. vittatus, *Bdd.* 155; **P. Wardi,** *Nwtn.* 307; P. Westermani, *Bp.* 188; **P. Westermani.** *Rss.* 188; **P. xantholórus,** *Gr.* 161; **P. xanthops,** *Spx.* 151; P. xanthópterus, *Spx.* 359.
Pforospermineen 78.
Purperzwartkop Loeri 245.
Purpursittich 372; P., glänzender 372.

Q.

Quäker 345; Quäkersittich 345. — Quaker Parrakeet 345.

R.

Raaf Kakketoe 231.
Rabenkakadu 229; R., braunköpfiger 230; R., schwarzer 231.
Rachenentzündung 77.
Reis, malayisch gesottener 46.
Reiter-Edelsittich 304.
Rheumatismus 90.
Ring 34. 35.
Ritter-Edelsittich 304.
Roodbek Amazone Papegaai 166; Roodbuik Ara 280; Roodhand Ara 289; Roodkuif Kakketoe 210; Roodmasker Amazone Papegaai 163; Roodmasker Edelparkiet 317; Roodstaart Amazone Papegaai 165; Roodstaart Kakketoe 216; Roodteugel Kakketoe 215.
Rosakakadu 219. 265.
Rose-Hill Parkiet 366; Rose-Hill Parkiet, Blauwe 370. — Rose-Hill Parrakeet 366. — Rosille Parkiet 366.
Rosella 366; R., blaßköpfige 370; R., blaue 370.
Rosella 366; R., Blue 370; R., Mealy 370. — Rosella Parrot 366.
Rosenbrustsittich 309; Rosenkakadu 219; Rosenkopfsittich 299; Roseuringsittich 312.
Rothachsel 193. — Rothbugamazone 63. 131. 132; R.-Amazonenpapagei 132; R.-Arara 281. 289. — Rothedelpapagei 186; Rothbauben-Kakadu 210; Rothmasken-Amazone 163; Rothnacken-Lori 247. 249; Rothschwanz-Amazone 165; Rothspiegel-Amazone 162. — Rothsteiß-Arara 289; R.-Kakadu 216. — Rothstirn-Amazone 153; Rothwangensittich 317; Rothzügel-Kakadu 215.
Roth 78.
Rüsselpapagei, schwarzer 233.
Ruhr 82.

S.

Salomon-Kakadu 209.
Salonkakadu 203.
Sand 48.
Scallop Parrot 381.
Schaukel 32.
Schlagfluß 88.
Schleimhaut-Entzündung, diphtheritisch-kroupeuse 78.
Schmalschnabelsittich, blaufügeliger

Digitized by Google

356; S., gelbflügeliger 359; S., mit gelben Unterflügeldecken 353; **S., mit gelber und weißer Flügelbinde 361; S., mit hochgelber Flügelbinde 359;** S. orangeflügeliger 355; **S., Tirika- 356; S., Tovi- 353; S., Tuipara- 355;** S., weißflügeliger 361. — Schmalschnabelsittiche 6, 29, 45, 351.
Schmuckvögel 242, 273.
Schnabelkrankheiten: Mißbildungen und Wucherungen 93.
Schnörgel 78.
Schnupfen 67, 77.
Schnurrbartsittich 312.
Schönsittiche 7.
Schublade für den Käfig 30, 33; Sch. für den Ständer 35.
Schwalbenlori 242.
Schwarzkappenlori 245; Schwarzkopflori = S., schwarzkäppiger; Schwarzohrpapagei 177. — Schwarzpapagei 125; S., großer 121; S., kleiner 125; S., Komoren- 126. — **Schwarzpapageien** 101, 102, 121. — Schwarzschnabelsittich 313; Schwarzschulter-Edelpapagei 189.
Selbstrupfen 43, 74, 96.
Segelschiffvögel 14, 107.
Senegal Langvleugel Papegaai 175; Senegal Parrot 175.
Sepia 47; Septenschale 47.
Sepsis 83, 118.
Shell Parrot 381.
Singsittich 380; S. wellenstreifiger 381.
Sittace, *Wgl.*, 6, 276.
Sittich, Allfarb- 366; S., Bart- 312, 314; S., Blaßkopf- 370; S., Blaustirn- 330; S., blaustirniger 330; S., Blumenan- 356; S., Bolivia- 324; S., braungesichtiger 340, 341, 342, 343; S., Braunwangen- 340; S., Brillen- 295. — S., Bunt- 366; S., B.-, blaßköpfiger 370; S., B.-, gemeiner 366. — S., Felsen- 327; S., Fidschi- 372; S., Gelbflügel- 359; S., gelbwangiger 340. — S., Glanz- 372; S., G.-, braunrother 374; S., G.-, purpurrother 372. — S., Goldangen- 324; S., Goldflügel- 355, 359; S., Goldkinn- 353; S., Goldmasken- 340; S., Goldstirn- 336; S., Guiana- 324; S., Halbmond- 336; S., Halsband- 300; S., Havana- 326; S., Hyazinth- 334; S., hyazinthrother 334; S., Jendaya- 334; S., Kaktus- 340; S., Kanarien- 381; S., Kanarienflügel- 359; S., Kanarienvogel- 359; S., Karolina- 320; S., Karolinen- 320; S., Katharina- 349; S., Kessi- 333; S., Kladderadatsch- 377; S., Kochinchina- 312; S., Kuba- 326. — **S., Langschnabel- 6, 45, 294, 295;** S., L., rothstirniger 295. — S., Langschwanz- 315; S., Lauf- 377; S., Luzian- 314; S., Mäuse- 345; S., Malakka- 315; S., Masken- 376; S., Mönchs- 345; S., Muichel- 381; S., Neuseeländer-, rothstirniger 377; S., Nymfen- 235; S., Orangeflügel- 355; S., orangestiriger 336; S., Patagonier- 327; S., Pavua- 324; S., Pflaumenkopf- 269, 299. — S., Pompadour-, braunrother 374; S., P.-, rother 372. — S., Purpur- 372; S., P.-, glänzender 372. — S., Quäker- 345; S., rosenbrüstiger von Java 309; S., Rosenbrust- 309; S., Rosenkopf- 269; S., Rosenring- 312; S., Rothwangen- 317; S., Schnurrbart- 312; S., Schwarzschnabel- 313; S., Sonnen- 333; S., Sonnenwende- 333; S., St. Thomas- 340; S., Tauben- 299; S., Tirika- 356; S., Tovi- 353; S., Tuipara- 355; S., von den Nikobaren, rothschnäbeliger 317; S., von den Nikobaren, schwarzschnäbeliger 317; S., Weißflügel- 361; S., Weißschwingen- 361; **S., Wellen- 5, 6, 7, 29, 45, 381;** S., wellenstreifiger 381; S., Ziegen- 377.
Sittiche, Alexander- 278, 299; S., A.-, rosenbrüstige 309; **S., Dickschnabel- 6, 45,** 344; S., Edel- 6, 45, 296; S., Erd- 7; S., Keilschwanz- 6, 45, 318; **S., Plattschweif- 6, 45, 362;** S., Schmalschnabel- 6, 29, 45, 351; S., Schön- 7.
Sitzstangen 31, 33, 34; S. oberhalb des Bügels 37; S. oberhalb des Käfigs 32; S., oberste am Ständer 35.
Smousparkiet 313.
Sockel 31, 33.
Soldatenamazone 147; S.-Arara 281.
Sonnenpapagei 141; Sonnensittich 333; Sonnenwendesittich 333.
Spectacle Parrot 159.
Spitzschwanz-Loris 238, 262.
Spulwürmer 84.
Ständer 34; S., einfachster 35; S. mit Bügel oder Ring 35 (mit Abbildung S. 36); S. mit Goldfischglocke 36; S. mit Schmuckkäfig 36.
Streifenpapageien 7.
Strichellori 256.
Stringops, *Gr.* 7.
Stumpfschwanzlori, braunbrüstiger 262. 263; **St., olivengrüner 263.** 266. — **Stumpfschwanzloris** 6, 46, 238, 262.
Surinam-Amazone 131, 137; S.-Papagei 137.

T.

Tabaksrauch 67.
Tagelöhner 147.
Taubenhals-Amazone 131, 166; Taubensittich 299.

Digitized by Google

Taumelsucht 89.
Temperaturwechsel, rascher 67. 68.
Thomas Conure, St. 340. — Thomas-Sittich, St. 340.
Thür (Käfig-) 31.
Timneh 120; T.-Jako 120; T.-Papagei 120. — Timneh Papegaai 120. Timneh Parrot 120.
Tintenfischschale 47.
Tirica Parkiet 356. — Tirika 356; **Tirika-Schmalschnabelsittich 356**; Tirikasittich 356.
Tovi-Parkiet 353; Tovi Parrakeet 353. — **Tovi-Schmalschnabelsittich 353**; Tovisittich 353.
Trichoglossinae 238; Trichoglossus, *Vgrs.* 6. 238. 262.
Trinkgefäße 32. 33; Anbringen derselben am Ständer 35. — Trinkwasser 48.
Triton 207; **Triton-Kakadu 207.** — Triton Cockatoo 207; Triton Kakketoe 207.
Tuberkulose 79. 87.
Tuipara Parkiet 355; Tuipara Parrakeet 355. — **Tuipara-Schmalschnabelsittich 355**; Tuiparasittich 355.
Typhoïd, seuchenhaftes 82. — Typhus 82.

U.

Undulatus 281.
Unreinlichkeit 67.
Unterleibsentzündung 80.

V.

Vasa 121.
Vaza 121; V., Komoren- 126. — Vaza-Papagei, großer 121; V.-P., kleiner 125; V.-P., Komoren- 126. — Vaza, Grand 121; V., Petit 125. — Vaza Papegaai, Groote 121; V. P., Kleene 125. — Vaza Parrot, Barkly's 125; V. P., Greater 121; V. P., Lesser 125; V. P., Smaller 125.
Venezuela Amazone 129. 131. 132. 134.
Verdauungsschwäche 79.
Vergiftungen 81.
Verhängen mit einem Tuch 68.
Vernachlässigung 67; V. der Füße 74.
Versandt, im Binnenlande 23; V., im Großhandel 22; V.-Käfige 23. 24.
Verstopfung 82.
Vinzent-Amazone, St. 150.
Vögel, ‚akklimatisirte' 21.
Vogelhandel 11. — Vogelläuse 96; Vogelmilben 96.

W.

Wachsschnabel 184; W.-Lori 184.
Wärme, zu hohe 67. 68.
Wassersucht 84. — Wasser, Trink- 48; W., verunreinigtes 67.
Weißbürzel-Lori 260. — Weißflügel 361; W.-Sittich 361. — Weißhauben-Kakadu 208; Weißohr-Kakadu 230; Weißschnabelpapagei 191; Weißschwingensittich 361; Weißstirn-Amazone 159.
Wellenpapagei 381; **Wellensittich** 5. 6. 7. 29. 45. **381.**
Wigstaart Kakketoe 235.
Windgeschwulst 80.
Witkop Amazone Papegaai 158; Witkuif Kakketoe 208; Witstuit Loeri 260.
Witwe, junge 345.
Wohnungen (Käfige) **28.**
Wühlerkakadu 223; Wühlkakadu 223.
Würgen 85.
Wunden: Biß-, Brand-, Riß- und Schnittwunden 91.

Z.

Zähmung 14. **49.** 52 ff.
Zebra Grass Parakeet 381; Z. Parrakeet 381.
Ziegensittich 377.
Zon Parkiet 320.
Zugluft 67.
Zungenlösen 58.
Zwartbek Edelparkiet 313; Zwartkeel Edelparkiet 312; Zwartschouder Edelpapegaai 189; Zwartvlek Parkiet 349.
Zweige zum Benagen 42. 45.
Zwergarara 289; **Zwerg-Edelpapagei 193**; Zwergkakadus 7. 196. — Zwergpapagei, blaukörpiger 193; Z., rothachseliger 193. — Zwergpapageien 7.

Druck von G. Bernstein in Berlin.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS
WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO $1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

(BIOLOGY LIBRARY)

8/2 - Sinnott

JAN 2 1952

JAN 8 1952

APR 1 1955

MAR 25 1955

MAR 13 1959

JAN 5 1961

Dec 28 '60 L

LD 21-100m-8,'34

957955

QL696
P7R8

BIOLOGY
LIBRARY
G

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY